

Приложение 2

Листовка за пациента



ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 10.02.04г.

Информационна листовка

VAGOTHYL
ВАГОТИЛ
36% разтвор
50 g

Състав:

Лекарствено вещество	Policresulen	36 g
Помощни вещества	Пречистена вода до	100 g

Свойства и действие

Приложен локално върху болезнено изменената тъкан, ваготил предизвика коагулация и излющване на мъртвите клетки без да уврежда здравите тъкани. Проявява трихомонациден и бактерициден ефект срещу болестотворни бактерии във влагалището. Не действа на млечнокиселите бактерии.

Предизвиква местно свиване на кръвоносните съдове и ограничава кръвоточението.

Показания

Локално лечение на цервикално и вагинално възпаление, съпроведено с течение, колпити и цервицити, цервикална ерозия, трихомониази и кандидози. За спиране на кръвоточението след биопсия и премахване на цервикалните полипи. За подпомагане регенерацията на декубитални язви, причинени от песари, след електрокоагулация. Генитални кондиломи. Външни и вътрешни хемороиди с възпалителни симптоми, фисури и рагади, анална екзема, пруритус и постоперативни рани. След проктологична хирургия.

Противопоказания

Повишена чувствителност към продукта.

Нежелани лекарствени реакции

В редки случаи са възможни алергична реакция (зачервяване на влагалището и вулвата, сърбеж, кожни обриви).

В изключителни случаи в началото на лечението може да се появи местна реакция на дразнене.



Лекарствени и други взаимодействия

При едновременно прилагане с алкални продукти, протичащата с отделяне на топлина реакция, засилва химичното изгаряне на лигавиците.

Дозировка и начин на приложение

Само за локално приложение.

Ерозия на влагалището

След подсушаване в посока от здравите към болезнено изменените зони, се тампонира за 1-3 min. Излишното количество от продукта се отстранява със сух тампон. Процедурата да се повтаря 2-3 пъти седмично.

Кръвотечения

Тампониране за 2-3 min. до спиране на кръвоточението.

Влагалищни промивки, лечение язви и изгаряния

Използва се разтвор на 5-15 cm³ от концентратата в 1 dm³ топла вода.

Възможно е да се прилага и след разреждане с вода в съотношение 1:1 или 1:5.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

- Да не се прилага едновременно с други продукти с местно действие при лекуване на болезнени изменения
- Да се избягват полови контакти при лечение с ваготил
- Да не се употребява по време на менструация
- По време на лечение да не се ползва дразнещ сапун.
- Разтвори на ваготил могат да се съхраняват до следващо прилагане под 25 ° C, в защитено от светлина място в течение на 2 мес.

Бременност и кърмене

Бременност

Приложението върху маточната шийка и влагалището трябва да се извършва изключително внимателно и само при наличието на единозначни показания.

Да не се прилага върху маточната шийка в късен стадий на бременността .

Кърмене

Няма данни.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за влияние.

Срок на годност

3 години

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25 ° C.

Да се пази от светлина .

Да се съхранява на място, недостъпно за деца



Опаковка

Оранжев стъклен флакон, 50g, опакован в картонена кутия с всички необходими означения и информационна листовка.

Име и адрес на производителя и притежателя на регистрацията

Pharmaceutical Works Polfa Pabianice S.A.

95-200 Pabianice

5, Piłsudskiego Str.

Poland

Дата на последна редакция

Февруари, 2004

