

800
34-10.036



Витреолент Vitreolent®

Капки за очи, разтвор 10ml

Всеки ml съдържа:

Potassium iodide 3 mg

Sodium iodide 3 mg

Помощни вещества: α-Токоферол ацетат, Сорбитол, Хлороводородна киселина 1N,

Метилхидроксипропилцелулоза, Вода за инжекции

Хлорхексидин ацетат

Свойства и Действие

Както при системно, така и при локално приложение йодидите могат да активират метаболизма и понякога да възпрепятстват развитието на мътнини в стъкловидното тяло.

За сега не е установен ефектът на йода върху развитието на ранното старческо помътняване на очната леща. Понякога е възможно да намали развитието на мътнини и влошаването на зрителната острота.

Показания

Помътняване и кръвотечение в стъкловидното тяло от различни причини (възрастови промени, късогледство, хипертония, диабет, перифлебиг), помътняване на лещата като първа проява на старческа катаракта.

Дозировка/Указание за ползване

ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ:

Препоръчителната дозировка е 1 капка в конюнктивния сак на засегнатото око/очи 1-3 пъти дневно.

ЛИЦА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ:

Няма данни, че дозировката трябва да се променя.

ДЕЦА ПОД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ:

Безопасността на лекарствения продукт при деца не е изследвана. Следователно приложението при деца не се препоръчва.

Ограничения за ползване

Противопоказания:

- Известна свръхчувствителност към йод (йодизъм)
- Свръхчувствителност към съставките
- Функционални нарушения на щитовидната жлеза или лека форма на възловидна гуша.

Предупреждения

Хлорхексидинът може да се отлага върху меки контактни лещи. Тези лещи трябва да се свалят преди апликацията и трябва да има интервал от 15 минути преди повторното поставяне на лещите.

За да се намали системната резорбция пациента трябва леко да притисне с пръст слъзната торбичка в продължение на 1-2 минути след прилагане на капките за очи.

Бременност, кърмене.

Необходимо е пациентката да уведоми лекуващия лекар ако е бременна или кърми. Няма контролирани изследвания на животни или бременни жени. Затова лекарствения продукт може да се прилага само в тези случаи, когато лекуващия лекар е преценил, че потенциалният ефект ще надвиши риска за плода. Употребата на капки за очи Vitreolent при кърмещи жени не е изследвана.

Нежелани лекарствени реакции.

При поява на нежелани реакции, пациента трябва да уведоми лекуващия си лекар.

а) локални очни ефекти:

Слабо парене или боцкане може да се усети за кратък период след приложение на капките. Понякога засилена слъзна секреция.

б) системни ефекти:

Vitreolent съдържа йодиди. Може да предизвика повишена функция на щитовидната жлеза или подобни на акне ефекти у предразположени пациенти.

Лекарствени взаимодействия

Не са докладвани взаимодействия със системно прилагани лекарствени продукти. В случаи на съпътстваща терапия с други лекарства, трябва да има интервал от поне 5 минути между двете апликации.

Влияние върху способността за шофиране

Рядко може да се получи временно замъгляване на зрението. Пациентите със замъгляване на зрението след приложение на Vitreolent трябва да се въздържат от шофиране и работа с машини, докато напълно се проясни зрението.

Предозиране

Рискът от нежелани реакции, дължащи се на локално свръхдозиране или инцидентно перорално поглъщане, е много ограничен, което се дължи на относително ниското съдържание на йодиди в един флакон.

Внимание

Лекарствените продукти трябва да се държат на недостъпно за деца място.



Срок на годност

Затворете флакона веднага след употреба. Не ползвайте повече от един месец след първоначалното отваряне. Лекарственият продукт може да се използва само до датата означена с "EXP" на опаковката.

Опаковка

Флакон с гутатор 10 мл.

Да се съхранява под 25 °C

Дата на последна преработка

Ноември 2002

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Ophthalmics AG

8442 Hettlingen

Switzerland

