



## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

*Моля, прочетете внимателно преди употреба!*

### VIRU-MERZ® - ВИРУ-МЕРЦ

#### *Какво представлява Виру-Мерц?*

Гел за прилагане върху кожата в туба от 2 g.

Съдържа Tromantadine hydrochloride (тромантадин хидрохлорид) 1%

Помощни вещества: Хидрокситетилцелулоза, сорбитол 70%, лактоза, метил-4-хидроксибензоат, сорбинова киселина, пречистена вода.

#### *За какво се използва Виру-Мерц и как действа?*

Виру-Мерц се използва за лечение на началните прояви на херпес-симплекс инфекции на кожата и полулигавиците (напр. в случаи на мравучкане, боцкане, сърбеж, чувство на напрежение и болка, подуване преди стадия на образуване на мехурчета).

Тромантадин хидрохлорид специфично потиска активността на тип 1 и 2 херпес-симплекс вируси. Намесва се в ранните фази на вирусно размножаване чрез предотвратяване проникването и освобождаване от обвивката.

#### *Кога не трябва да използвате Виру-Мерц?*

Виру-Мерц не трябва да се прилага при реакции на свръхчувствителност, възникнали при предшестващо лечение с тромантадин, както и при свръхчувствителност към някое от помощните вещества.

Не трябва да се използва в случаи на херпес-симплекс след появата на мехурчета и особено, когато мехурчетата са се отворили.

#### *Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Виру-Мерц?*

Продуктът не трябва да се прилага при пациенти със свръхчувствителност към метил-4-хидроксибензоати (парабени) и други съставки на продукта.

Повечето кожни възпаления, възникнали след употреба на тромантадин, се разнасят без усложнения след прекратяване употребата на Виру-Мерц; ако е необходимо приложението на влажни превръзки ускорява затихване на възпалението. В тежки случаи, за кратък период може да се приложи локално продукт, съдържащ кортикостероид. В случаи на бактериална инфекция, кортикостероидите са противопоказани.

#### *Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?*

Липсват достатъчно данни за употребата на продукта по време на бременност.

Проучвания върху животни не показват ембриотоксичен/тератогенен ефект.

Не е известно дали веществото преминава в майчиното мляко, затова е препоръчително да се избягва употребата на продукта през този период.

#### *Въздействие върху способността за шофиране и работа с машини*

Няма въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.



*Каки други продукти оказват влияние върху ефекта на Виру-Мерц или могат да бъдат повлияни при съвместна употреба?*

Няма установени лекарствени взаимодействия.

**Как да използвате Виру-Мерц и колко често?**

Засегнатите места на кожата се намазват с достатъчно количество гел, за да се покрие цялата зона на херпеса, 3-5 пъти дневно или по-често, ако е необходимо. Леко се втрива.

Ако в продължение на 2 дни след началото на лечението не настъпи подобрене, употребата на Виру-Мерц трябва да се прекрати.

**Какви нежелани реакции може да предизвика Виру-Мерц?**

При лечение с Виру-Мерц могат да възникнат кожни реакции на свръхчувствителност (контактни алергии), дори когато продуктът се е понасял преди добре. Те се проявяват като видимо влошаване на сърбежа, усилено усещане на болка и напрегнатост, увеличено зачервяване на кожата и формиране на възловати образувания.

Честотата на доказания контактен дерматит (възпаление и зачервяване на кожата) при употреба на тромантадин, основана на многобройни проучвания, е определено по-малка от 1 %.

При съмнение за контактен дерматит в интерес на пациентите е след отзучаване на острите кожни симптоми да се проведе тест с тромантадин от специалист-алерголог. Трябва да се има предвид, че възпалението може да е в резултат на допълнителна бактериална инфекция, а не на реакция на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

**Специални условия на съхранение**

Няма специални условия на съхранение.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

**Срок на годност**

Срокът на годност е 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелзан върху опаковката!

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

60318 Frankfurt/Main, Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД, София

**Дата на последна редакция на листовката**

Март 2003

