

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.07.06г.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
GENTAMICIN H ACTAVIS
ГЕНТАМИЦИН H АКТАВИС

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Гентамицин H Актавис маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Гентамицин H Актавис маз
3. Как се прилага Гентамицин H Актавис маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Гентамицин H Актавис маз

Лекарствено вещество в 1 g маз: Gentamicin sulfate, еквивалентен на Gentamicin 1mg и Hydrocortisone acetate 10 mg

Помощни вещества: течен парафин, цетостеарилов алкохол, метил парахидроксibenзоат, пропилен парахидроксibenзоат, бял вазелин

Gentamicin H Actavis маз 15 g в двойно лакирани алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" №68

Разград-7200

Тел. 084615318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЕНТАМИЦИН Н АКТАВИС маз И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Гентамицин е широкоспектърен антибиотик с добре изразена ефективност при локално лечение на първични и вторични кожни инфекции. В продукта Гентамицин Н антибактериалният ефект на гентамицин е комбиниран с мощното противовъзпалително, протиексудативно и противоалергично действие на хидрокортизона.

Гентамицин Н Актавис маз се прилага за лечение на:

- Вторично инфектирани кортикочувствителни дерматози – контактна екзема, дисхидрозиформена екзема, микробна екзема, атопичен дерматит, булозни дерматози;
- Бактериални кожни инфекции, протичащи със силно изразена възпалителна компонента;
- При нараняване с различен произход и ухапване от насекоми.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ГЕНТАМИЦИН Н АКТАВИС:

Гентамицин Н Актавис маз не се прилага при:

- Свръхчувствителност към лекарственото и някое от помощните вещества;
- Специфични кожни заболявания като сифилис, туберкулоза, вирусни кожни заболявания-рубеола и варицела, бактериални и микотични заболявания, акне, розацея.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Лекарственият продукт е предназначен само за външно приложение.

При нанасяне не трябва да се допуска попадане в очите.

Гентамицин Н Актавис маз не трябва да се използва при банални инфекции, поради опасност от развитие на резистентни микроорганизми.

При проява на възпаление, сензибилизация или развитие на суперинфекции, лечението трябва да се прекрати и да се назначи подходяща терапия.

Продуктът не трябва да се прилага върху лице и клепачи поради риск от поява на телеангиектазии и пигментации, както и глаукома.

При кърмачета и деца може да има повишена резорбция и да се развият системни ефекти. Лечението в детската възраст не трябва да превишава две седмици при еднократна апликация на ден.

Приложение на Гентамицин Н Актавис маз и прием на храни и напитки

Продуктът е с локално приложение върху кожата.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Няма данни за увреждане на плода при бременни, но се препоръчва употребата на Гентамицин Н Актавис маз да се назначава само при строга преценка полза/риск.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с



По преценка на лекаря при кърмещи жени, поради потенциална опасност от нежелани лекарствени реакции при кърмачето, или се прекъсва кърменето или се прекъсва употребата на продукта.

Шофиране и работа с машини

Гентамицин Н Актавис маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма данни за лекарствени взаимодействия.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ГЕНТАМИЦИН Н АКТАВИС маз

Винаги прилагайте Гентамицин Н Актавис маз според инструкциите на лекуващия лекар!

Гентамицин Н Актавис маз се прилага външно върху кожата. Нанася се на тънък слой върху засегнатия участък 3-4 пъти дневно след предварително почистване и подсушаване. В зависимост от локализацията и ако е необходимо се поставя превръзка. При наличие на (корички) крусти е необходимо те предварително да бъдат отстранени.

Гентамицин Н Актавис маз се прилага при кожни заболявания с изразена сухота на кожата, което е характерно за атопичния дерматит.

Ако сте пропуснали да приложите Гентамицин Н Актавис маз:

Ако сте пропуснали да приложите поредната доза, приложете я час по-скоро.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Гентамицин Н Актавис маз може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Много рядко могат да се наблюдават зачервяване, упорит сърбеж и реакции на свръхчувствителност.

При продължителна употреба и върху обширни участъци са възможни системни ефекти. Възможни са и инфекциозни усложнения, акне, стрии, забавено заздравяване на рани. Възможна е атрофия на кожата на мястото на апликацията.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД
Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2
1000 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2005 г.

