


Листовка за пациента



DALACIN®

ДАЛАЦИН®

Вагинален крем

Clindamycin

Моля, прочетете внимателно настоящата листовка преди да започнете приемането на това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано специално за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да не е подходящо за тях дори ако имат същите оплаквания като Вас.

Името на Вашето лекарство е **Далацин®** вагинален крем 2%.

Притежател на разрешението за употреба:

Pharmacia Enterprises S.A., Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg

Производител:

Pharmacia&Upjohn, 7000 Portage Road, Kalamazoo, 49001 MI, USA

КАКВО СЪДЪРЖА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Далацин® вагинален крем 2% съдържа лекарственото вещество clindamycin phosphate (клиндамицин фосфат), еквивалентен на 2% или 2 mg/g clindamycin.

Той също съдържа бензилов алкохол, сорбитол стеарат, полисорбат 60, пропилен гликол, стеаринова киселина, цетостеарилов алкохол, цетил палмитат, течен парафин и вода.

Всяка туба съдържа 40 g крем, който е достатъчен за 3 до 7 дози.

КАК ДЕЙСТВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Clindamycin е антибиотик.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ДАЛАЦИН® ВАГИНАЛЕН КРЕМ

Това лекарство се използва за лечение на някои бактериални инфекции на влагалището.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ И ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ДАЛАЦИН® ВАГИНАЛЕН КРЕМ

Не трябва да използвате Далацин® вагинален крем:

- ♦ Ако сте имали алергична реакция към това лекарство или към друг продукт, съдържащ clindamycin или lincomycin (линкомицин);
- ♦ Ако имате алергия към някое от помощните вещества на това лекарство, описани в раздела "Какво съдържа Вашето лекарство" по-горе.

Алергията може да се изразява в подуване на лицето, кожен обрив, хрипелив глас, проблеми с дишането.



Съобщете на Вашия лекар:

- ♦ Ако вече използвате друго лекарство за лечение на Вашата вагинална инфекция;
- ♦ Ако сте бременна, има вероятност да сте бременна или кърмите;

Ефект върху презервативи и диафрагми: Далацин® вагинален крем съдържа компоненти на маслена основа. Някои от тях намаляват здравината на презервативите и диафрагмите и ги правят по-малко ефективни като бариерни методи за контрацепция или като предпазни средства срещу полово-предавани заболявания, вкл. СПИН. Не разчитайте на презервативи и диафрагми докато ползвате Далацин® вагинален крем.

Далацин® вагинален крем не се препоръчва на деца под 12 години.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДАЛАЦИН® ВАГИНАЛЕН КРЕМ

Прочетете внимателно листовката. Проверете срока на годност, отпечатан върху опаковката. Ако той е изтекъл или ще изтече по време на употреба на лекарството, не използвайте крема и кажете на Вашия фармацевт.

Далацин® вагинален крем трябва да се прилага интравагинално, веднъж дневно преди лягане в продължение на 7 последователни дни или както е предписал Вашият лекар, който може да препоръча по-кратък 3-дневен курс на лечение в зависимост от Вашите симптоми.

Отстранете капачката на тубата. Завийте един от пластмасовите апликатори за еднократна употреба, поставени в опаковката, на мястото на капачката. Стиснете леко тубата в долния край, за да напълните апликатора с крем. Когато буталото спре да се движи, апликаторът се е напълнил.

Отвийте апликатора и затворете тубата.

Легнете по гръб, хванете здраво апликатора и го поставете внимателно във влагалището, колкото е възможно по-навътре без да чувствате дискомфорт. Придържайки апликатора, бавно избутайте буталото, докато спре да се движи и е изтласкано цялото количество крем.

Внимателно извадете апликатора и го изхвърлете. За предпочитане е да го увиете в хартия преди да го изхвърлите в кофата за боклук. Не го изхвърляйте в тоалетната чиния.

Измийте добре ръцете си след завършване на процедурата.

Ако забравите да използвате лекарството

Ако забравите да използвате лекарството вечерта, не прилагайте две дози на следващия ден. Просто продължете с еднократно приложение всяка вечер, докато приложите предписания брой дози.

Шофиране и работа с машини

Няма известни ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Понякога това лекарство може да причини нежелани лекарствени реакции при някои хора. Ако при Вас се появи някое от изброените, спрете приложението на лекарството и съобщете на Вашия лекар:

Диария;

Дразнене или сърбеж във влагалището;

Кожен обрив.

Други нежелани реакции са замайване, главоболие, киселини, гадене, гърбачене, запек и коремна болка. Ако получите някоя от изброените или друга нежелана реакция, съобщете на Вашия лекар или фармацевт.



Понякога може да се почувствате по-добре само след няколко дневно лечение. Дори и да се почувствате по-добре, не спирайте използването на крема, докато не приключите пълния курс на лечение.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДАЛАЦИН® ВАГИНАЛЕН КРЕМ

Да се съхранява далеч от деца. Да се съхранява на сухо място при стайна температура (под 25°C) и да не се замразява.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Тази листовка не съдържа пълната информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Информацията в тази листовка се отнася само за Далацин® вагинален крем.

Дата на последна редакция на листовката:

