

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...08.09.03...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, внимателно прочетете тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство. Пазете тази листовка, в случай че Ви се наложи да я прочетете отново. Ако възникнат допълнителни въпроси, моля обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

Запомнете: Това лекарство е предписано само за Вас и не трябва да го предоставяте на други лица. То може да им навреди, дори ако имат същите оплаквания като Вашите.

Egirizin® Oral Drops Solution
Егиризин перорални капки, разтвор

Cetirizine

Производител и притежател на разрешението за употреба:

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.
Kereszturi ut 30-38.
1106 BUDAPEST, HUNGARY
Тел: (36-1) 265 5555
Факс: (36-1) 265 5529

1. Какво представлява Egirizin и за какво се използва

Cetirizine, лекарственото вещество на Egirizin, е антихистаминово лекарство. Освен лекарственото вещество пероралните капки съдържат: глицерол, пропилен гликол, захарин натрий, натриев ацетат, метил паракидроксибензоат, пропил паракидроксибензоат, ледена оцетна киселина, дестилирана вода.

Cetirizine се използва за облекчаване на алергични прояви, като сенна хрема или целогодишна хрема, сърбеж и зачеряване на очите. Може да се прилага и при кожни алергии, характеризиращи се с обрив, сърбеж или уртикария.

2. Преди да започнете да приемате Egirizin капки

Не приемайте Egirizin:

- ако сте имали алергична реакция след приемане на този лекарствен продукт
- ако кърмите
- ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност

Ако сте бременно или искате да забременеете, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате това лекарство. Макар да няма доказателства, че то уврежда плода, не е препоръчително да го приемате по време на бременност.

Не давайте това лекарство на деца под 2 годишна възраст.

При приемането на Egirizin

Ако получите алергична реакция при приемането на този лекарствен продукт за пръв път, спрете приемането на лекарството НЕЗАБАВНО и се консултирайте с Вашия лекар.

Непременно го информирайте за всички заболявания от които страдате в момента или сте имали в миналото. Ако имате бъбречно заболяване, той може да прецени да намали дозата на Egirizin. Непременно се посъветвайте с него за състоянието си преди да започнете лечението (виж т. 3).

Ако Вашият лекар възнамерява да направи т. нар. "Prick-тест", т.е. кожно-алергичен тест, той може да Ви каже да спрете лечението за поне три дни преди деня на теста, за да се избегнат фалшиво отрицателни резултати. Консултирайте се с лекаря ако сте имали някое от тези гореописаните в миналото.

Капките съдържат глицерол, който във високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Капките съдържат още парахидроксибензоати, за които еизвестно, че може да причинят кожни обриви и/или рядко – затруднено дишане.

Освен това капките съдържат пропилен гликол.

Информирайте лекуващия лекар ако се появят подобни оплаквания.

Приемане на Egirizin с храна и напитки

Консумацията на алкохол е абсолютно забранена по време на лечението с Egirizin.


Бременност и кърмене

Ако сте бременна, опитвате да забременеете или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате каквото и да е лекарство.

Макар да не е сигурно, че това лекарство може да причини увреждания на плода, не се препоръчва приемането му по време на бременност. Майки, които кърмят, не бива да вземат Egirizin.

Шофиране и работа с машини

Egirizin може да причини съниливост. В началото на лечението не шофирайте, защото безопасността Ви може да е застрашена. Също не работете с опасни инструменти и машини. По-късно може да се посъветвате с Вашия лекар дали е безопасно да продължите с тези активности.



Приемане на други лекарствени продукти

Дадената по-долу информация може да се отнася за лекарства, използвани преди време, а също и за такива, които ще се използват в бъдеще.

Съобщете на Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате или сте вземали наскоро, дори и такива, без рецептa.

Възможно е заедно с Egirizin да се налага да вземате някое от следните лекарства:

диазепам (за тревожни състояния), циметидин (за увеличена stomашна секреция и язва), азитромицин (антибиотик), псевдофедрин (носни капки), кетоконазол (антигъбично средство), еритромицин (антибиотик).

Обикновено е безопасно да се приемат гореизброените лекарства с Egirizin.

Ако вземате теофилин (средство, отпускащо бронхиалната гладка мускулатура при пациенти, страдащи от бронхиална астма), по-безопасно е ако вземате по-ниски дози теофилин докато приемате Egirizin.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни какво приемате.

3. Как да приемате Egirizin капки

Egirizin капки трябва да се приемат приблизително по едно и също време на деня. Тогава той ще прояви възможно най-добра си ефект и ще Ви бъде по-лесно да помните кога да приемате капките.

Ако не Ви е предписано друго, Egirizin капки трябва да се приемат както следва:

Възрастни и подрастващи над 12 години:

Обикновено началната доза за възрастни и подрастващи на възраст над 12 години е 10 mg (20 капки) веднъж дневно, за предпочитане вечер.

Деца между 6 и 12 години:

Обикновено се назначава дневна доза от 5 mg (10 капки) веднъж дневно, за предпочитане вечер ако това води до добър лечебен резултат.

Ако лечебният резултат не е задоволителен, дневната доза става или 2 x 5 mg (10 капки) сутрин и вечер, или 10 mg (20 капки) вечер.

Деца между 2 и 6 години:

В детскa възраст e препоръчително да се дава доза, в зависимост от телесното тегло:

Телесно тегло	Дневна доза
10 kg (средно тегло за дете на 2 години)	3 mg
15 kg	5 mg
20 kg (средно тегло за дете на 6 години)	6 mg

При пациенти с чернодробна недостатъчност се препоръчва доза от 5 mg веднъж дневно.

Пациенти с увредена бъбречна функция:

При тези пациенти се препоръчва дозирането да става според креатининовия клирънс:

Група	Креатининов клирънс (ml/min)	Доза и честота на приемане
Нормална	≥ 80	10 mg веднъж дневно
Лека	50-79	10 mg веднъж дневно
Умерена	30-49	5 mg веднъж дневно
Тежка	<30	5 mg веднъж на 2 дни
Диализни пациенти	<10	противопоказано

Пациенти в напреднала възраст:

При тези пациенти се препоръчва намаление на дозата.

Вашият лекар ще определи колко дълго да продължи лечението с Egirizin. Следвайте стриктно неговите инструкции.

Ако Ви се струва, че ефектът на Egirizin е много слаб, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приемали по-голяма доза Egirizin отколкото Ви е предписано или ако някой друг погълне от това лекарство по някаква причина, консултирайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте забравили да приемете Egirizin, не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатия прием.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции


Подобно на всички лекарствени продукти Egirizin може да предизвика нежелани реакции.

Могат да се проявят следните леки нежелани реакции: отпуснатост и сънливост, които зависят от големината на дозата, уморяемост, главоболие, замаяност, сухота в устата, гадене и стомашно-чревен дискомфорт, беспокойство (увеличена двигателна активност).

По-рядко може да се намалият броят на кръвните площици, да се появят ускорена сърдечна дейност, замъглено виждане, диария, отоци, наддаване на тегло, тревожност, обърканост, депресия, безсъние, сърбеж по кожата.

Ако някоя от гореописаните започне да Ви беспокои, информирайте Вашия лекар. Може да се наложи да разделите дневната доза в два приема. Това ще намали нежеланите реакции.

Рядко се развиват реакции на свръхчувствителност (алергични реакции), като ангиоедем и зачервяване. Ако се развият, спрете приемането на това лекарство и информирайте Вашия лекар.



Ако се развие някаква друга нежелана реакция, която не е описана в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на лекарствения продукт

Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място!

Съхранява се при температура под 25⁰C, в оригиналната опаковка. Да се пази от светлина.

Не употребявайте капките след датата на срока на годност, изписана на опаковката.

Последна ревизия на тази листовка: Ноември 2002.

