

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 21.01.03

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Zantac 75

Зантак 75

Филмирани таблетки, съдържащи 75mg ranitidine (ranitidine) под формата на хидрохлорид.

Моля, прочетете внимателно тази информация преди употреба.

Какво съдържа Zantac 75?

Ranitidine е лекарствено средство от групата на хистаминовите H₂-блокери.

Таблетките ZANTAC 75 са с розов цвят и петоъгълна форма. Всяка таблетка съдържа:

- активна съставка - ranitidine 75mg (под формата на хидрохлорид);
- помощни вещества - микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, метил хидроксипропилцелулоза, титанов диоксид, триацетин, синтетичен червен железен оксид.

Как действа Zantac 75?

Стомашният сок съдържа солна киселина, която подпомага храносмилането. Понякога тази киселина е в по-голямо количество. Излишъкът ѝ предизвиква оплаквания, известни като киселини и нарушения в храносмилането (диспепсия). Обичайните противокиселинни средства съдържат вещества, които само неутрализират киселините. Затова ефектът им е краткотраен и трябва да се приемат при всяко хранене, за да противодействат на стомашния дискомфорт.

За какво се използва ZANTAC 75?

Таблетките Zantac 75 действат по съвсем различен начин срещу излишъка от солна киселина и нарушеното храносмилане. Вместо да неутрализират киселината, те повлияват първопричината, като предотвратяват отделянето на прекомерно количество киселина. Една таблетка Zantac 75 осигурява бърз ефект (проявява се до около половин час) и продължително облекчение (до 12 часа).

Преди да започнете употребата на Zantac 75

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате таблетките:

- Ако сте алергични към ranitidine или към някоя от останалите съставки на таблетките Zantac 75;
- Ако Ви е известно, че страдате от пептична язва (стомашна или дуоденална);
- Ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите;
- Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми;
- Ако Ви е известно, че страдате от рядкото заболяване порфирия;
- Ако сте отслабнали внезапно без специална диета поради диспепсия (нарушено храносмилане).



- Ако сте в средна или напреднала възраст и се оплаквате от внезапна појава или бърза прогресия на вече изявени в миналото проблеми със стомаха;
- Ако страдате от друго заболяване, във връзка, с което приемате други лекарства, предписани от лекар или закупени от аптеката без рецептa.

Как да приемате Zantac 75?

Възрастни (включително и тези в напредната възраст) и деца над 16 години.

За предотвратяване на симптомите:

Вземете една таблетка Zantac 75 с вода 30 минути до 1 час преди консумация на храна и/или напитки, които биха могли да провокират подобни проблеми.

За лечение на симптомите:

Веднага след появата на оплаквания се приема една цяла таблетка Zantac 75 с малко вода.

При повечето пациенти приемът на една или две таблетки дневно води до облекчаване на симптомите. Въпреки това, за период от 24 часа може да се приемат до 4 таблетки.

Не приемайте повече от 4 таблетки на денонощие.

Zantac 75 не се препоръчва за деца под 16 години!

При ежедневен прием продължителността на лечебния курс не трябва да надвишава 2 седмици.

Какво трябва да се направи, ако сте приели повече от допустимите дози?

Ако случайно сте приели повече таблетки от препоръчаното, потърсете съвета на лекар или фармацевт!

Ако след започване на лечението оплакванията Ви се засилят или не се повлият в рамките на 2 седмици, потърсете консултация с Вашия лекар!

Нежелани лекарствени реакции

При повечето пациенти, приемащи Zantac 75, не се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

Както към всички други лекарства в редки случаи може да се прояви алергия и към Zantac 75. Ако скоро след като сте започнали да приемате таблетките се появят някои от следните реакции, СПРЕТЕ лекарството и незабавно уведомете лекара:

- внезапно хръстене или стягане и болки в гръденния кош;
- подпухване на клепачите, лицето, устните, устата или езика;
- неравномерен (на бучки) обрив по кожата някъде по тялото;
- необяснимо висока температура;
- чувство на премляване, особено когато ставате.

Спрете приема на лекарството и се посъветвайте с лекаря, ако страдате от чести инфекции или неочеквани наранявания.

Над 190 милиона души по света са лекувани с ranitidine. Нежеланите реакции са редки. Все пак, ако забележите някои от следните странични реакции, консултирайте се с лекар колкото е възможно по-скоро:

- обърканост;



- гадене и загуба на апетит, които са по-силни от нормалното, с или без жълтеница (жълт цвят на кожата и бялото на очите), тъй като това може да се дължи на хепатит (възпаление/инфекција на черния дроб);
- бавен или неритмичен пулс, замаяност или прималяване;
- замъглено виждане;
- кожни реакции, понякога тежки (червени или морави петна или обриви);
- косопад;
- импотентност;
- силна стомашна болка или промяна на типа на болката;
- диария;
- задух или умора;
- главоболие;
- замаяност;
- болки в ставите или мускулите;
- проблеми с бъбреците (симптомите могат да включват промени в количеството и цвета на урината, която отделяте, гадене, повръщане, обърканост, повишена температура и обрив);
- чувство на потиснатост;
- халюцинации;
- необичайни движения или потрепвания на мускулите;
- повишена чувствителност на гърдите и/или уголемяването им при мъжете.

Ако Ви вземат преби от кръв или урина или Ви правят други изследвания, уведомете лекаря, че приемате Zantac 75, тъй като това лекарство може да повлияе на резултатите от изследванията.

Ако имате други симптоми, които не разбираете, уведомете лекаря или фармацевта.

Как се съхраняват таблетките?

Както и всички други лекарствени средства, Zantac 75 трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Не приемайте таблетките след изтичане срока на годност, посочен върху блистера и картонената кутия.

Кой произвежда Вашето лекарство?

Zantac 75 се произвежда от Glaxo Wellcome S.A., Spain

Адресът на Търговско представителство GlaxoSmithKline Export Ltd. в България е:

София 1408, кв. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов", бл.10, тел. 980 29 21, факс 980 3682.

Допълнителна информация

Как мога да избегна появата на киселини и нарушен храносмилане (диспепсия)?

Различни фактори допринасят за появата на диспептични оплаквания и киселини:

- преяждане;
- неправилно хранене (приемане на големи количества храна; приемане на мазни храни);
- наднормено телесно тегло;
- заседнал начин на живот, с недостатъчно движение;
- тютюнопушене;



- повищена консумация на алкохол.

В тези случаи се препоръчва смяна на начина на живот с цел избягане на гореизброените фактори. Така и смущенията в храносмилането ще намалеят.

В тази листовка не е дадена пълната информация за Zantac 75. Ако след прочитането й възникнат някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Може да поискате да прочетете листовката отново. Моля, не я изхвърляйте, докато не свършите опаковката с лекарството.

Тази листовка се отнася само за таблетки Zantac 75.

Zantac 75 е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Zantac 75 е вписан в регистъра на разрешените лекарствени продукти при МЗ под № 970 0362.

Дата на частични промени в текста:

Дата: 25/10/2002

