

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

CORTIMYCIN®
КОРТИМИЦИН

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 05.10.06г.

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Кортимицин маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Кортимицин маз
3. Как се прилага Кортимицин маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Кортимицин маз

Лекарствени вещества в 100 g маз: Hydrocortisone acetate 2,5 g и Neomycin sulfate, екв. на 2,5 g Neomycin

Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, течен парафин, твърд парафин, ланолин, бял вазелин

Cortimycin маз 10 g в двойно лакирани алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" №68

Разград-7200

Тел. 084615318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРТИМИЦИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Кортимицин маз е комбиниран препарат за локално приложение с изразено антибактериално и противовъзпалително действие.

Кортимицин маз се прилага за локално лечение на:

- Алергодерматози - контактен дерматит, вторично инфектирани екземи, строфулус, дерматит от инсекти;
- пруритус ано-генитален;
- невродермит;
- атопичен дерматит;
- псориазис вулгарис;
- ихтиози;
- лихен рубер планус;
- инфектирани рани;
- слънчево изгаряне.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С КОРТИМИЦИН МАЗ

Кортимицин маз не се прилага при:

- наличие на свръхчувствителност към някое от активните или помощните вещества;
- туберкулоза на кожата,
- вирусни и паразитни кожни заболявания,
- кожен сифилис,
- гъбични инфекции,
- кожни реакции след ваксинации,
- периорален дерматит,
- акне,
- розацея.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Продуктът не трябва да се прилага продължително прилагане в големи количества и върху обширни площи от кожата поради възможност от резорбция и поява на системни ефекти.

Продуктът се прилага кратко време върху лице и клепачи поради риск от поява на телеангиектазии и пигментации, както и глаукома.

Не се препоръчва употребата му при кърмачета и малки деца, поради риск от повишена резорбция и поява на системни ефекти. Резорбцията е по-изразена при недоносени, отколкото при доносни деца. Лечението в детската възраст не трябва да превишава две седмици при еднократна апликация на ден.

При пациенти в напреднала възраст продуктът се прилага с повишено внимание поради възрастовите промени на кожата.



Препаратът съдържа т. нар. парабени, които могат да причинят забавен тип алергични реакции и по-рядко реакции от бърз тип - уртикарии и бронхоспазъм.

Приложение на Кортимицин маз и прием на храни и напитки

Кортимицин маз е продукт за локално приложение.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Да се избягва прилагането на продукта при бременни, особено в големи количества и върху обширни участъци за продължително време, поради опасност от системна резорбция.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Няма данни за преминаване на препарата в майчиното мляко, но не се препоръчва прилагането му в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Кортимицин маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Кортимицин маз е несъвместим със салицилова киселина, танин, тежки метали.

Данни за помощните вещества

Съдържанието на парабени (метил и пропил парахидроксибензоат) в Кортимицин крем може да причини уртикария, контактен дерматит и много рядко бронхоспазъм.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА КОРТИМИЦИН КРЕМ

Винаги приемайте Кортимицин маз според инструкциите на лекуващия лекар!

Дермалната маз е подходяща за приложение при дерматози, характеризирани се със сухота и залющване на кожата.

Кортимицин крем се прилага локално като се нанася 2-3 пъти дневно на тънък слой върху засегнатите кожни участъци, не повече от един месец.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!



Наблюдаваните при предозиране симптоми съвпадат с описаните по-горе нежелани лекарствени реакции, особено при по-продължително лечение и при приложение върху големи площи.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Кортимицин маз може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Локални нежелани реакции : атрофия на епидермиса и дермата, застоен еритем, стероидно акне, телеангиектазии, хипертрихоза, промени в пигментацията на кожата, пурпура , стрии.

Системни нежелани ефекти:Къшинг синдром,стероиден диабет,повишен белтъчен метаболизъм, нарушение в електролитния баланс.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 3 (три) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул."Княгиня Мария Луиза"№2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Март 2006 г.

