

20
10.12.2011.

Листовка за пациента

Mukolen

Муколен® обвити таблетки 50 mg

Епразинон

Състав

1 обвита таблетка съдържа активна съставка 50 mg eprazinone hydrochloride (епразинон хидрохлорид)

Помощни вещества: лактоза, захароза, оцветител ксантен (E 127), царевично нишесте, повидон, магнезиев стеарат, талк, акация, медицински восък.

Лекарствена форма: Обвити таблетки

Свойства и действие

Mukolen се използва за симптоматично лечение на кашлица. Той намалява вискозността на бронхиалния секрет, улеснявайки откашлянето и същевременно облекчава дразнещата кашлица.

Действието се проявява още в първата седмица на лечението и се засилва при продължаване на лечението.

Показания

Лечение на нарушена секреция от бронхите и по-специално при остри бронхиални заболявания – остър бронхит и обостряне на хронични заболявания на белите дробове.

Противопоказания

Mukolen е противопоказан:

- при пациенти, свръхчувствителни към епразинон или към някоя от помощните съставки;
- при пациенти с епилепсия или такива, които някога са имали гъбове;
- по време на бременност и кърмене

Предпазни мерки и предупреждения

Лекарството трябва да се използва предпазливо при неврологични симптоми например атаксия (некоординирани движения) или тремор (треперене на ръцете). Ако тези симптоми се засилят по време на лечението с Mukolen, употребата му трябва да се преустанови.

Да не се дава на деца под 6 год поради това, че безопасността му при при малки деца не е установена.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, уведомете лекуващия лекар преди да започнете да приемате Mukolen.

Въпреки че няма съобщения за вредни ефекти на Mukolen върху плода, риск не може да бъде изключен, ето защо бременните не трябва да го приемат.

Ако употребявате Mukolen, не трябва да кърмите.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Това лекарство може да предизвика световъртеж у някои пациенти. Високите дози могат да имат седативен ефект или да предизвикат сънливост. За това трябва да се внимава в началото на лечението при шофиране, работа с машини или изпълняване на задължения, изискващи пълно внимание.

Лекарствени и други взаимодействия

Mukolen може да засили действието на сънотворни средства. Едновременната употреба на Mukolen и лекарства, потискащи кашлицата или противоастматични лекарства, които едновременно потискат образуването на бронхиален секрет (например ипраториум) е безмислено.

Уведомете лекуващия лекар за всички лекарства, които приемате, включително и тези, които сте закупили без рецепта.

Дозировка и начин на приложение

Дозировката и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар.

Обичайната доза Mukolen за възрастни и деца над 12 години: по 1 до 2 обвити таблетки 3 пъти дневно. Оптимален отхрачващ ефект се постига при доза 3 пъти по 2 обвити таблетки дневно.

Обичайната доза Mukolen за деца от 6 до 12 години: 2 до 3 пъти дневно по 1 обвита таблетка.

Mukolen не се дава на деца под 6 години.

Предозиране

Предозирането може да предизвика забавяне на движенията, сънливост, некоординирани движения (атаксия) или треперене (тремор), конвулсии (гърчове) и кома. В случай на предозиране незабавно потърсете лекарска помощ. Лечението на предозирането е симптоматично.

Нежелани лекарствени реакции

Нежелани лекарствени реакции са редки и преходни. Най-чести са стомашно-чревните смущения (болки в стомаха, гадене, повръщане, диария, запек). По-рядко се срещат обриви, отпадналост, световъртеж, главоболие или ускорена сърдечна дейност.

Ако наблюдавате някакви нежелани реакции, включително и такива, неописани в тази листовка, уведомете вашия лекар.

Съхранение и срок на годност

Лекарството не трябва да се използва след срока на годност указан на опаковката.

Да се съхранява при температура под 25⁰С. Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.

Опаковка

по 20 обвити таблетки

Производител и притежател на разрешителното за употреба:

KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia

Дата на последна редакция

8 юли 1997 год.