

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 28.05.02

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
PANTOGEL®
ПАНТОГЕЛ

СЪСТАВ

Лекарствено вещество в един 1 g гел: Dexpantenol - 50 mg.
Помощни вещества: карбомер, триетаноламин, пропиленгликол, динатриев едетат, ментол, захарин натрий, метил паракидроксибензоат, пропил паракидроксибензоат, етанол, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Гел.

Алуминиеви или ламинатни туби по 40 g.

По една туба в картонена кутия.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма-Троян АД
5600 Троян, ул."Крайречна" № 1
Тел. (0670) 22 607
Факс: (0670) 24 139

ДЕЙСТВИЕ

Декспантенол като производно на пантотеновата киселина принадлежи към голямата група на витамин В. При попадането си в клетките Декспантенол бързо се метаболизира до пантотенова киселина. Тя е компонент на незаменимия коензим А, който играе централна роля в обмяната на всяка клетка. По този начин пантотеновата киселина се оказва особено важна за растежа и регенерацията на кожата и лигавиците. При недостиг в организма се появяват смущения в растежа, кожни заболявания, язви на лигавиците, потиска се образуването на антитела.

ПОКАЗАНИЯ

- иритативни дерматити (раздразнена кожа);
- повърхностни изгаряния;
- еритем след излагане на ултравиолетови лъчи;
- за подобряване възстановяването на бавно заздравяващи рани;
- за лечение на повърхностни наранявания на кожата на млечната жлеза, включително на гръдените зърна при кърмачки.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Противопоказания

Алергия към някоя от съставките на продукта.

Специални предпазни мерки при употреба

Няма

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са известни случаи на неблагоприятни лекарствени взаимодействия с други лекарства.

Приложение при бременност и в периода на кърмене

Няма риск от прилагането на Пантогел гел по време на бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Данни за помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа като помощни вещества парабени, поради което може да причини някои алергични реакции (контактен дерматит и рядко уртикария и бронхоспазъм).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Дозировка и начин на приложение

Прилага се локално върху кожата. Без лекарско предписание.

Пантогел гел се нанася чрез леко втрятане на тънък слой от 1 до 3 пъти дневно.

В периода на кърмене лекарството се намазва върху гръдените зърна след всяко кърмене, без опасност за кърмачето.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма данни за предозиране при употреба на Пантогел гел.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

Много рядко е възможна поява на алергични кожни реакции.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място при температура под 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

СРОК НА ГОДНОСТ

2 /две/ години от датата на производство.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ

Април 2002 г.