

RGD: 61549/E/2
12.03.2004

ПОСТИНОР-ДУО (POSTINOR-DUO) **таблетки**

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате лекарството.

- Моля, пазете листовката, възможно е да пожелаете да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, моля, запитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарството е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други лица. Може да им причини вреда, дори ако имат същите симптоми като Вас.

Какво представляват таблетките Постинор-Дуо и за какво се използват?

Таблетките Постинор-Дуо съдържат синтетичното активно вещество levonorgestrel, подобно на лутеалния хормон.

Други, помощни вещества: колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, картофено нишесте, талк, царевично нишесте, лактоза.

Постинор-Дуо е спешен контрацептив (противозачатъчно средство за използване в извънреден, спешен случай), което се приема през устата. Постинор-Дуо може да помогне за предотвратяване на бременност, ако е приет до 72 часа след полов акт без предпазни мерки или при неуспешно приложен противозачатъчен метод.

Кога могат да се използват таблетките Постинор-Дуо и доколко са ефективни?

Таблетките Постинор-Дуо могат да се използват на който и да било ден от менструалния цикъл.

Спешната контрацепция е противозачатъчен метод за извънреден случай и е подходяща само като мярка по спешност. Постинор-Дуо предотвратява около 84% от очакваните бременности, когато е приет до 72 часа (3 дни) след полов акт без предпазна мярка. Постинор-Дуо не предотвратява бременност във всеки случай, но таблетките са по-ефективни, когато са приети по-скоро след полов акт без предпазване (по-добре е по-рано да се вземат до 12 часа, отколкото със закъснение след третия ден).

Ако не можете със сигурност да определите времето на половия акт без предпазни мерки, или сте имали сексуален контакт без използване на противозачатъчен метод преди повече от 72 часа в същия менструален цикъл, е възможно да настъпи бременност. По тази причина използването на Постинор-Дуо след втория полов акт може да бъде неефективно за предотвратяване на бременност.

Постинор-Дуо не е така ефективен, както традиционния противозачатъчен метод за редовна употреба. Ако предполагате, че са необходими повторни курсове на спешна контрацепция, Вие трябва да помислите за използване на противозачатъчни таблетки за продължителна употреба.



Кога не трябва да се приемат таблетки Постинор-Дуо?

Постинор-Дуо не трябва да се приема при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

В случай, че след използване на Постинор-Дуо настъпи бременност, трябва да се има предвид възможността за ектопична (извънматочна) бременност. Това е особено важно, ако след приемане на Постинор-Дуо почувствате силна коремна болка или ако сте имали предшестваща ектопична бременност, операция на фалопиевата тръба, или възпалително тазово заболяване.

Употребата на Постинор-Дуо таблетки трябва да бъде добре обмислена при пациентки с тежко нарушение на чернодробната функция.

Тежки заболявания с понижена или смутена абсорбция (усвояване на активното вещество в червата), като болестта на Crohn, могат да намалят ефикасността на Постинор-Дуо.

Не се препоръчва повторно използване на таблетките в един менструален цикъл поради възможност от смущение на цикъла.

След като сте взели Постинор-Дуо, е важно да посетите Вашия лекар за обсъждане на подходящ за Вас противозачатъчен метод за редовна употреба.

Някои лекарства, които приемате същевременно, могат да усилят метаболизма на активната съставка на продукта, намалявайки неговата ефикасност. Такива са лекарствата за лечение на епилепсия и гъбични заболявания, антибиотици, както и билкови продукти, съдържащи жълт кантарион (*Hypericum perforatum*).

Ето защо трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевта за лекарствата, които приемате по лекарско предписание или без рецепта.

Бременност


Постинор-Дуо не трябва да се дава на бременни жени, той няма да прекъсне бременността. При неуспех на спешната контрацепция поради настъпила вече бременност, епидемиологични проучвания не показват проява на нежелани ефекти на прогестагените (активното вещество на продукта) върху плода.

Кърмене

Ако кърмите, уведомете Вашия лекар и се посъветвайте с него, преди да използвате лекарството.

Как се променя менструалния цикъл след приложение на таблетките Постинор-Дуо?

Макар че при повечето жени следващата менструация настъпва в очакваното време, при някои закъснява, или се появява по-рано от нормалния период. Ако менструалното кръвотечение е закъсняло с повече от 5 дни или се е появило навреме, но е необичайно, или съществува съмнение за бременност (чувство за неразположение, гадене, повръщане, напрежение в гърдите и др.), трябва да се консултирате с Вашия лекар.



Как да се приемат таблетките Постинор-Дуо?

Вземете двете таблетки едновременно, колкото е възможно по-скоро, за предпочитане до 12 часа и не по-късно от 72 часа (3 дни), след като сте имали полов акт без предпазни мерки.

В случай на поява на повръщане до три часа след приемане на таблетките, незабавно трябва да бъдат взети други две таблетки.

След прилагане на спешна контрацепция се препоръчва да се използва локален бариерен противозачатъчен метод (напр. презерватив) до настъпване на следващата менструация. Употребата на Постинор-Дуо не е противопоказание за продължаване редовния прием на хормонални противозачатъчни таблетки.

Постинор-Дуо не се препоръчва за употреба при деца.

Мерки, които трябва да се вземат в случай на предозиране

Дозировката, начина и продължителността на употреба на таблетките Постинор-Дуо трябва да бъдат по предписание на лекаря.

Предозирането може да предизвика гадене и вагинално кървене. В такъв случай незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Какви са възможните нежелани реакции на таблетките Постинор-Дуо и какво трябва да се направи, ако се появят?

Както всички лекарства, Постинор-Дуо може да има нежелани реакции.

Възможната честота на нежеланите реакции е, както следва:

- Повече от 10%: гадене, болка в долната част на корема, умора.
- Между 1% и 10%: главоболие, замаяване, напрежение в гърдите, повръщане, диария.

Как трябва да се съхраняват таблетките Постинор-Дуо?

Няма специални условия за съхранение.

Не използвайте таблетките след датата на изтичане срока на годност, отпечатана на опаковката.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Производител

Гедсон Рихтер АД
Будапеща - Унгария

Дата на последна редакция:

