

Листовка: информация за пациента

20090152/53

Мепрезор 20 mg стомашно-устойчиви таблетки

Мепрезор 20 mg gastro-resistant tablets

Мепрезор 40 mg стомашно-устойчиви таблетки

Мепрезор 40 mg gastro-resistant tablets

Езомепразол (Esomeprazole)

37302-3, 12-04-2017

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признатите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Мепрезор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Мепрезор
3. Как да приемате Мепрезор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мепрезор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мепрезор и за какво се използва

Мепрезор съдържа лекарство, наречено езомепразол. То е от групата лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа“. Тяхното действие се състои в намаляване количеството киселина, която се образува в стомаха Ви.

Мепрезор се използва за лечение на следните заболявания:

Възрастни

- „Гастроезофагеална рефлуксна болест“ (ГЕРБ). При нея киселината от стомаха отива към хранопровода (тъбата, която свързва гърлото със стомаха), което причинява болка, възпаление и чувство на парене зад гръдената кост.
- Язви на стомаха или горната част на червата, които са инфицирани с бактерии, наречени „*Helicobacter pylori*“. Ако страдате от такава язва, Вашият лекар може да предпише също антибиотици за лечение на инфекцията и заздравяване на язвата.
- Язви на стомаха, причинени от лекарства, наречени НСПВЛС (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства). Мепрезор може да бъде използван също за предотвратяване образуването на язви в стомаха, ако приемате НСПВЛС;
- Прекомерно количество киселина в стомаха, причинено от образование в панкреаса (синдром на Цъолингер-Елисон);
- Удължено лечение с Мепрезор след профилактика на повторно кървене на язва с Мепрезор за интравенозно приложение.

Юноши на възраст над 12 години

- „Гастроезофагеална рефлуксна болест“ (ГЕРБ). При нея киселината от стомаха отива към хранопровода (тъбата, която свързва гърлото със стомаха), което причинява болка, възпаление и чувство на парене зад гръдената кост.



- Язви на стомаха или горната част на червата, които са инфицирани с бактерии, наречени „*Helicobacter pylori*”. Ако страдате от такава язва, Вашият лекар може да предпише също антибиотики за лечение на инфекцията и заздравяване на язвата.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Мепрезор

Не приемайте Мепрезор

- ако сте алергични към езомепразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако сте алергични към сходни на това лекарства, имената на чийто активни вещества завършват на „-празол” (например, пантопразол, ланзопразол, рабепразол, омепразол);
- ако приемате лекарства, съдържащи активното вещество иелфинавир, лекарство за лечение на инфекции с ХИВ.

Не приемайте Мепрезор, ако някое от горепосочените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Мепрезор.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Мепрезор

- ако имате сериозни проблеми с черния дроб;
- ако имате сериозни проблеми с бъбреците;
- ако Ви предстои специфичен кръвен тест (хромогранин A)
- ако някога сте получавали кожна реакция след лечение с лекарство, подобно на Мепрезор, което намалява стомашната киселина.

Ако получите обрив по кожата, особено в участъци, изложени на слънце, информирайте Вашия лекар веднага когато Ви е възможно, тъй като може да се наложи да спрете лечението с Мепрезор. Не забравяйте също да споменете всички други неблагоприятни последствия, като болка в ставите.

Мепрезор може да прикрие симптомите на други заболявания. Поради това, ако **възникне някое от посочените по-долу преди да започнете приема на Мепрезор или докато го приемате, веднага се свържете с Вашия лекар:**

- Отслабнете много без видима причина и имате затруднение при прегълъщане;
- Имате болка в стомаха или нарушен храносмилане;
- Започнете да повръщате храна или кръв;
- Изхождате черни изпражнения (изпражнения с кръв).

Ако Ви е предписан Мепрезор за прием „при нужда”, трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви продължават или естеството им се промени.

Приемът на инхибитори на протонната помпа, като Мепрезор, особено за повече от една година, може леко да повиши риска от фрактура на тазобедрената става, китката или гръбначния стълб. Кажете на Вашия лекар, ако имате остеопороза или ако приемате кортикоステроиди (които могат да повишат риска от остеопороза).

Деца

Мепрезор не се препоръчва при деца под 12-годишна възраст поради липса на достатъчно данни.

Други лекарства и Мепрезор

Иформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или също може да приемате други лекарства. Причината за това е, че Мепрезор може да подмине действието на някои лекарства и някои лекарства могат да окажат влияние върху Мепрезор.



Не приемайте Мепрезор, ако приемате лекарство, съдържащо нелфинавир (за лечение на инфекция с ХИВ).

Следните лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни от Мепрезор:

- **атазанавир**, лекарство за лечение на инфекция с ХИВ
- **кетоконазол, итраконазол или вориконазол**, лекарства за лечение на гъбични инфекции
При необходимост лекарят ще коригира дозата на Мепрезор при пациенти, които провеждат продължително лечение и при пациенти с тежко увредена чернодробна функция.
- **ерлотиниб** (използва се за лечение на рак)
- лекарства, които се метаболизират от специфични ензими като
 - **диазепам**, лекарство, което успокоява и води до заспиване
 - **циталопрам, имипрамин, кломипрамин**, лекарства за лечение на депресия
 - **фенитоин**, лекарство за лечение на епилепсия и някои състояния на болка
При необходимост, Вашият лекар трябва да намали дозата на тези лекарства, особено при нередовен прием. Ако приемате фенитоин, Вашият лекар ще проследява нивата на фенитоина в кръвта, особено при започване или преустановяване на лечението с Мепрезор.
- **варфарин, фенипрокумон, аценокумарол**, лекарства прилагани за предотвратяване на нормалното съсирване на кръвта
Вашият лекар ще проследява нивата на кръвосъсирването, особено при започване или преустановяване на лечението с Мепрезор.
- **цилостазол** (използва се за лечение на интермитентно накуцване-болка в краката при ходене, която се причинява от недостатъчно кръвоснабдяване)
- **цизаприд**, лекарство прилагано при проблеми със стомаха и червата
- **метотрексат** (химиотерапевтично лекарство, което се използва във високи дози за лечение на рак) – ако приемате метотрексат, Вашият лекар може временно да прекрати лечението с Мепрезор.
- **рифампицин**, антибиотик (използван за лечение на туберкулоза)
- **жъlt кантарион**, билка за лечение на депресия
- **дигоксин**, лекарство за лечение на различни сърдечни състояния
- **клопидогрел**, използва се за превенция на атеротромботични събития (т.е. инфаркт или инсулт)
- **такролимус**, използва се за предотвратяване отхвърлянето на присаден орган.

Ако Вашият лекар Ви е предписал антибиотици **амоксицилин** или **кларитромицин**, както и Мепрезор за лечение на язви, причинени от инфекция с *Helicobacter pylori*, важно е да кажете на Вашия лекар ако приемате някакви други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

- **Бременност**

Вашият лекар ще прецени дали можете да приемате Мепрезор по време на бременността

- **Кърмене**

Не е известно дали Мепрезор преминава в кърмата, поради което не трябва да приемате Мепрезор, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма вероятност Мепрезор да повлияе на способността Ви за шофиране или работа с инструменти и машини. Въпреки това, нежелани реакции като замачност и замъглене може да възникнат нечесто или рядко (виж т.4). Ако това се отнася за Вас, не шофирайте и не работете с машини.



Мепрезор съдържа глюкоза и захароза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Мепрезор

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Мепрезор не се препоръчва при деца на възраст под 12 години;
- Ако приемате това лекарство продължително време, Вашият лекар ще поиска да наблюдава състоянието Ви (особено ако приемате лекарството повече от една година);
- Ако Вашият лекар Ви е казал да приемате това лекарство както и когато Ви е необходимо, кажете на лекаря си, ако признаците на заболяването Ви се променят.

Какво количество да приемате

- Вашият лекар ще Ви каже колко таблетки и колко време трябва да приемате. Това ще зависи от Вашето състояние, Вашата възраст и функцията на черния Ви дроб.
- Обичайните дози са посочени по-долу.

Възрастни

За лечение на парене зад гръдената кост, причинено от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ):

- Ако Вашият лекар е установил, че имате малко увреждане на хранопровода, обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 40 mg Мепрезор веднъж дневно в продължение на 4 седмици. Вашият лекар може да Ви каже да приемате същата доза още 4 седмици, ако хранопроводът Ви все още не е заздравял.
- След заздравяване на хранопровода обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор веднъж дневно.
- Ако нямаете увреждане на хранопровода, обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор всеки ден. След постигане на контрол върху състоянието Ви Вашият лекар ще Ви каже как да приемате лекарството си в случай на необходимост, но до максимална доза една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор на ден.
- Ако имате сериозни проблеми с черния дроб, Вашият лекар може да Ви предпише пониска доза.

За лечение на язва, причинена от инфекция с *Helicobacter pylori*, и за предотвратяване на повторна инфекция

- Обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор два пъти дневно в продължение на една седмица.
- Вашият лекар ще Ви каже да приемате също антибиотици, напр. амоксицилин и кларитромицин.

За лечение на язва на stomахa, причинена от НСПВЛС (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства):

- Обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор веднъж дневно в продължение на 4 до 8 седмици.

За профилактика на язва на stomахa, ако приемате НСПВЛС (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства):

- Обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор веднъж дневно.



За лечение на прекомерно количество киселина в стомаха поради образуване в панкреаса (синдром на Цъолингер-Елисон):

- Обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка Мепрезор 40 mg два пъти дневно.
- Вашият лекар ще съобрази дозата с Вашите нужди и ще прецени колко време трябва да приемате лекарството. Максималната доза е 80 mg два пъти дневно.

Удължено лечение след профилактика на повторно кървене на язва с Мепрезор за интравенозно приложение:

Обичайната доза е една таблетка от 40 mg Мепрезор веднъж дневно в продължение на 4 седмици.

Юноши (на или над 12 години)

За лечение на парене зад гръдената кост, причинено от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ):

- Ако Вашият лекар е установил, че имате малко увреждане на хранопровода, обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 40 mg Мепрезор веднъж дневно в продължение на 4 седмици. Вашият лекар може да Ви каже да приемате същата доза още 4 седмици, ако хранопроводът Ви все още не е заздравял.
- След заздравяване на хранопровода обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор веднъж дневно.
- Ако нямате увреждане на хранопровода, обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор всеки ден. След постигане на контрол върху състоянието, Вашият лекар ще Ви каже как да приемате лекарството си в случай на необходимост, но до максимална доза една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор на ден.
- Ако имате сериозни проблеми с черния дроб, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза.

За лечение на язва, причинена от инфекция с *Helicobacter pylori*, и за предотвратяване на повторна инфекция

- Обичайната доза е една стомашно-устойчива таблетка от 20 mg Мепрезор два пъти дневно в продължение на една седмица.
- Вашият лекар ще Ви каже да приемате също антибиотици, напр. амоксицилин и кларитромицин.


Прием на това лекарство

- Можете да приемате Вашите таблетки по всяко време на деня;
- Можете да приемате таблетките си в храна или на гладно;
- Погльщайте таблетките цели с вода. Не ги дъвчете и натрошавайте, защото таблетките съдържат обвити пелети, които не позволяват лекарството да се разгради от киселината в стомаха. Важно е пелетите да не бъдат наранявани.

Мепрезор 40 mg

Указания за разделяне на таблетката

Разделете таблетката както в показано на това изображение



Какво да направите, ако Ви е трудно да погльщате таблетките

- Ако Ви е трудно да погльщате таблетките:
 - Поставете ги в чаша негазирана вода. Не използвайте други течности.



- Разбърквайте докато таблетките се разтворят (разтворът няма да е бистър). След това изпийте сместа веднага или в рамките на 15 минути. Винаги разбърквайте сместа преди да я изпиете.
- За да се сигурни, че сте изпили цялото лекарство, изплакнете чашата много добре, като я напълните до половината с вода и я изпиете. Лекарството се съдържа в твърдите частици – не ги дъвчете и натрошавайте.
- Ако въобще не можете да прегълщате, таблетката може да се смеси с малко вода и да се напълни в спринцовка. След това през тръбичка може да се вкара директно в stomаха („стомашна тръба“).

Ако сте приели повече от необходимата доза Мепрезор

Ако сте приели повече от предписаното от Вашия лекар количество Мепрезор, веднага се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Мепрезор

- Ако сте забравили да приемете доза от лекарството, приемете я веднага щом си спомните. Ако обаче почти е наблизило времето на следващата доза, пропуснете забравената доза.
- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Мепрезор

Винаги приемайте предписаната доза толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар. Прекъсването или спирането на лечението без съвет от страна на Вашия лекар може да намали успеха от Вашето лечение.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции, спрете приема на това лекарство и веднага се свържете с лекар:

- Внезапно възникнали хрипове, подуване на устните, езика и гърлото или по тялото, обрив, прималяване или затруднено прегълщане (тежка алергична реакция) (редки: могат да засегнат до 1 на 1000 человека)
- Зачеряване на кожата с образуване на мехури или белене на кожата. Може да е придружено с тежка форма на образуване на мехури, кървене на устните, очите, устата, носа и половите органи или висока температура и болки по ставите. Това може да е „Еритема мултиформе“, „Синдром на Стивънс-Джонсън“ или „токсична епидермална некролиза“ (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 человека).
- Пожълтяване на кожата, потъмняване на урината и уморяемост, които може да са симптоми на проблеми с черния дроб (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 человека).
- Това лекарство може в много редки случаи да засегне белите кръвни клетки, което да доведе до имунна недостатъчност. Ако имате инфекция със симптоми като висока температура и тежко увредено общо състояние или висока температура със симптоми на местна инфекция като болка във врата, гърлото или устата или затруднено уриниране, консултирайте се с Вашия лекар колкото е възможно по-скоро, за да може чрез кръвни изследвания да се изключи вероятността за липса на бели кръвни клетки (агранулоцитоза). За Вас е важно да предадете тази информация за Вашето лекарство към този момент (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 человека).



- Тежки чернодробни проблеми, водещи до чернодробна недостатъчност и увреждане на мозъка, което може да доведе до обърканост или странно поведение, и/или усещане за замаяност (енцефалопатия) (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 человека).

Другите нежелани реакции включват:

Чести, могат да засегнат до 1 на 10 человека

- Главоболие
- Прояви от страна на стомаха или червата: диария, стомашни болки, запек, газове (флатуленция)
- Чувство, че Ви е лошо (гадене) или че сте болни (повръщане)

Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 человека

- Отоци по ръцете, глезните или краката
- Безсъние
- замаяност
- усещане за изтръпване и мравучкане
- съниливост
- умора
- сухота в устата
- промени в кръвните тестове, които показват как работи черния Ви дроб
- сърбеж
- кожен обрив
- обриви, като опарване от коприва
- фрактура на тазобедрената става, китката или гръбначния стълб (ако това лекарство се прилага в големи дози и за продължителен период)
- световъртеж (вертиго)

Редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 человека

- увреждания на кръвта като понижен брой на белите кръвни клетки или тромбоцитите (това може да причини слабост, насинявания или да улесни възникването на инфекции)
- понижени нива на натрий в кръвта (това може да предизвика слабост, неразположение (повръщане) и крампи)
- усещане за напрегнатост, обърканост или депресия
- промяна на вкуса
- замъглено зрение
- неочаквано хриптене или недостиг на въздух (спазъм на дихателните пътища)
- възпаление на устната лигавица
- инфекция, наречена „млечница“, която може да засегне червата и се причинява от гъбички
- косопад
- кожни обриви след излагане на слънце
- ставни или мускулни болки
- общо неразположение
- повишено потене

Много редки, могат да засегнат до 1 на 10 000 человека

- еднакво по степен намаляване на белите и червени кръвни клетки и тромбоцитите
- агресия
- да виждате, чувствате или чувате неща, които не са там (халюцинации)
- мускулна слабост
- тежки бъбречни проблеми
- уголемяване на гърдите при мъже

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

- Ако приемате това лекарство повече от три месеца, възможно е нивата на магнезий в кръвта да се понижат. Ниските нива на магнезий могат да се проявят като умора, неволни мускулни съкращения, дезориентация, гърчове, замаяност, учестен пулс.



получите някои от тези симптоми, незабавно информирайте Вашия лекар. Ниските нива на магнезий могат да доведат до ниски нива на калий и калций в кръвта. Вашия лекар може да реши да извърши редовни кръвни изследвания, за да проследява нивата на магнезий.

- Възпаление на червата (микроскопски колит), което причинява диария.
- Обрив, който може да бъде съпровождан с болка в ставите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мепрезор

Съхранявайте на място, далеч от погледа и досега на деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелаян върху картонената опаковка и блистера или бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Alu/alu блистери и aclar/alu блистери

Да се съхранява под 25 °C.

За HDPE бутилки:

Условия за съхранение преди отваряне на HDPE бутилката:

Да се съхранява под 30 °C.

Условия за съхранение след първото отваряне на HDPE бутилката:

Да се съхранява под 30 °C.

Срок на годност след първото отваряне на бутилката: 6 месеца.

Съхранявайте опаковката пълно затворена, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мепрезор

20 mg стомашно-устойчива таблетка

- Активното вещество е езомепразол. Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 20 mg езомепразол (като магнезиев дихидрат).
- Другите съставки са:

Сърцевина на таблетката: захароза, царевично нишесте, течна глюкоза, хидроксипропилцелулоза, повидон, талк, титанов диоксид (E171), съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат (1:1), глицерол моностеарат, пропиленгликол, стеаринова киселина, полисорбат 80, симетикон, микрокристална целулоза, макрогол 6000, кросповидон, конжиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Обвивка на таблетката: хипромелоза, макрогол 6000, титанов диоксид (E171), талк, царевично нишесте, жълт железен оксид (E172)



40 mg стомашно-устойчива таблетка

- Активното вещество е езомепразол. Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 40 mg езомепразол (като магнезиев дихидрат).
- Другите съставки са:

Сърцевина на таблетката: захароза, царевично нишесте, глюкоза течна, хидроксипропилцелулоза, повидон, талк, титанов диоксид (Е171), съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат (1:1), глицеролmonoстеарат, пропиленгликол, стеаринова киселина, полисорбат 80, симетикон, микрокристална целулоза, макрогол 6000, кросповидон, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Обвивка на таблетката: хипромелоза, макрогол 6000, титанов диоксид (Е171), талк, червен железен оксид (Е172)

Как изглежда Мепрезор и какво съдържа опаковката

Мепрезор 20 mg са бледо розови, овални филмирани таблетки.

Мепрезор 40 mg са розови, овални филмирани таблетки с делителна черта от двете страни.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Мепрезор е достъпен в опаковки от блистери със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 и 100 x 1 стомашно-устойчиви таблетки и в HDPE бутилки със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 и 250 стомашно-устойчиви таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

1000 Ljubljana

Словения

Производители

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Германия

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Германия

Място на производство:

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Германия

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57,

1526 Ljubljana

Словения

Lek S.A.

Ul. Podlipie 16,

95-010 Strykow



Полша

Място на производство:

Ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

Полша

S.C. Sandoz S.R.L

4 and 7A Livezeni Street,
540472, Targu Mures, Mures County

Румъния

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИО под следните имена:

Дания:	Esomeprazol Sandoz
Австрия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg – magensaftresistente Tabletten Esomeprazol Sandoz 40 mg – magensaftresistente Tabletten
България	Мепрезор 20 mg стомашно-устойчиви таблетки Мепрезор 40 mg стомашно-устойчиви таблетки
Чехия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg Esomeprazol Sandoz 40 mg
Естония:	NEXMEZOL 20mg NEXMEZOL 40mg
Испания:	Esomeprazol Sandoz 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG Esomeprazol Sandoz 40 mg comprimidos gastrorresistentes EFG
Финландия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotabletti
Унгария:	Esomeprazol Sandoz 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta Esomeprazol Sandoz 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta
Литва:	NEXMEZOL 20 mg NEXMEZOL 40 mg
Латвия:	NEXMEZOL 20 mg NEXMEZOL 40 mg
Норвегия:	Esomeprazol Sandoz
Полша:	Stomezul
Португалия:	Esomeprazol Sandoz
Румъния:	Esomeprazol Sandoz 20 mg comprimate gastrorezistente Esomeprazol Sandoz 40 mg comprimate gastrorezistente
Словения:	Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete

Дата на последно одобрение на листовката

ММ/ГГГГ

<

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Приложение през стомашна сонда – за лекари:

Ако пациентът не може да прегъльща, таблетките могат да бъдат разтворени в негазирана вода и да се приложат през стомашна сонда. Важно е внимателно да се провери дали избраните сонда и спринцовка си съответстват.

Приложение през стомашна сонда

1. Поставете таблетката в подходяща спринцовка и напълнете спринцовката с приблизително 25 ml вода и приблизително 5 ml въздух.



За някои сонди е необходимо разтваряне в 50 ml вода, за да се предотврати запушването на сондата от пелетите.

2. Веднага разклатете спринцовката за приблизително 2 минути, за да се разтвори таблетката.
3. Задръжте спринцовката с върха нагоре и проверете дали не е запущен.
4. Прикрепете спринцовката към сондата като междувременно задържате посочената по-горе позиция на спринцовката.
5. Разклатете спринцовката и я поставете с връх насочен надолу. Веднага инжектирайте 5-10 ml в сондата. Обърнете спринцовката след инжектирането и я разклатете. Задръжте върха на спринцовката насочен нагоре, тъй като това ще предотврати запушването.
6. Обърнете спринцовката с върха надолу и незабавно инжектирайте още 5-10 ml в тръбата. Повторете тази процедура докато спринцовката се изпразни.
7. Напълнете спринцовката с 25 ml вода и 5 ml въздух и при необходимост повторете стъпка 5, за да отмиете утайката, която е останала в спринцовката. При някои сонди е необходимо да се приложи 50 ml вода.

