

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**SERMION®**

**СЕРМИОН®**

**Nicergoline 10 mg**

Обвити таблетки

**Моля, прочетете внимателно тази листовка!**

Тази листовка съдържа информация за СЕРМИОН®.

Моля, прочетете я внимателно преди да започнете да приемате лекарството.

Ако имате въпроси или искате да научите повече, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка, може да пожелаете да я прочетете отново.

Името на това лекарство е СЕРМИОН®. Лекарственото вещество е nicergoline.

**Какво съдържа Вашето лекарство**

Всяка обвита таблетка съдържа 10 mg nicergoline.

*Помощни вещества:* Микрокристална целулоза, двуосновен калциев фосфат дихидрат, магнезиев стеарат, натриева кроскармелоза.

*Филмово покритие:* арабска гума, гума sandarac, колофон, талк, магнезиев карбонат, оцветител (E171), карнаубски восък, захароза.

Всяка опаковка съдържа 50 обвити таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба**

Pharmacia Enterprises S.A., Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg

**Производител**

Pharmacia Italia S.p.A., Via del Commercio Zona Industriale, Marino Del Tronto, Ascoli Piceno, Italy

**За какво служи Вашето лекарство**

СЕРМИОН® се използва при следните състояния:

- ♦ Остри и хронични мозъчни метаболитно-съдови нарушения (нарушения в храненето и кръвоснабдяването на мозъка) в резултат на артериосклероза (заболяване на кръвоносните съдове), тромбоза (запушване на кръвоносните съдове от кръвен съсирек) и емболизъм на мозъчните съдове (запушване на мозъчните съдове от откъснал се от друго място съсирек), преходни нарушения на мозъчното кръвообращение (транзиторни исхемични атаки);
- ♦ Остри и хронични периферни метаболитно-съдови нарушения (нарушения в храненето и кръвоснабдяването на крайниците (органични и функционални артериопатии на крайниците, болест на Raynaud, други синдроми, свързани с нарушен кръвоток);



- Главоболие;
- Добавъчна терапия при артериална хипертония.

#### **Преди да започнете да вземате Вашето лекарство**

Не трябва да вземате СЕРМИОН<sup>®</sup>, ако:

- сте алергични към някоя от съставките на лекарството;
- сте прекарвали наскоро миокарден инфаркт;
- имате остър кръвоизлив;
- имате тежка брадикардия (забавена сърдечна дейност);
- получавате замаяване или загуба на съзнание при изправяне от легнало положение.

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар, ако за Вас е вярно някое от по-гореизброените твърдения.

#### **Предпазни мерки при лечение със СЕРМИОН<sup>®</sup>**

Ако СЕРМИОН<sup>®</sup> се приема, както е препоръчал Вашия лекар, той не оказва влияние върху кръвното налягане. При хора с хипертония може да е причина, обаче, за постепенното понижаване на кръвното налягане.

Ако имате бъбречно заболяване, информирайте Вашия лекар. Той може да реши да намали дозата на лекарството.

Съобщете на Вашия лекар, ако имате повишени стойности на пикочната киселина или страдате от подагра. Той ще реши как да вземате лекарството.

#### **Бременност и кърмене**

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите. Той ще прецени дали да приемате лекарството и как да правите това.

Ако сте бременна или кърмите винаги се съветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете което и да е лекарство.

#### **Може ли СЕРМИОН<sup>®</sup> да се приема едновременно с други лекарства**

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които се използват за понижаване на кръвното налягане (калциеви антагонисти, бета блокери, АСЕ инхибитори, диуретици и др.), както и ако приемате някакви лекарства за лечение на подагра или за понижаване на нивата на пикочната киселина.


Препоръчително е да уведомите Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, независимо дали са изписани от лекар или са закупени без рецепта.

#### **В какви дози се прилага СЕРМИОН<sup>®</sup>**

Моля, спазвайте препоръките за приложението на СЕРМИОН<sup>®</sup>, които сте получили от Вашия лекар, защото в противен случай СЕРМИОН<sup>®</sup> може да не е достатъчно ефективен.

СЕРМИОН<sup>®</sup> се прилага в доза 5-10 mg три пъти дневно на равни интервали от време.

Дозировката, продължителността на лечението и начинът на приложение са в зависимост от клиничния случай. Понякога е за предпочитане лечението да започне парентерално и да продължи като перорална поддържаща терапия.



### *Пациенти с нарушена бъбречна функция*

Вашият лекар може да реши да намали дозата на СЕРМИОН<sup>®</sup>, ако имате бъбречно заболяване.

### **Как трябва да приемате СЕРМИОН<sup>®</sup>**

Желателно е да вземате лекарството на равни интервали от време три пъти на ден за предпочитане между храненията. СЕРМИОН<sup>®</sup> може да се използва за продължително лечение.

### **Какво трябва да направите, ако сте приели твърде много таблетки СЕРМИОН<sup>®</sup> (предозиране)**

Малко вероятно е при Вас да се появят някакви симптоми в случай, че приемете повече таблетки СЕРМИОН<sup>®</sup>, отколкото е предписал Вашия лекар. Въпреки това е препоръчително да се консултирате с лекар.

### **Какво трябва да направите, ако сте пропуснали да вземете таблетка СЕРМИОН<sup>®</sup>**

Не вземайте двойна доза от лекарството, а продължете приемането му както преди това.

### **Причинява ли СЕРМИОН<sup>®</sup> нежелани лекарствени реакции**

Общо взето, СЕРМИОН<sup>®</sup> се понася добре. Описани са само редки случаи на нежелани лекарствени реакции, които не са клинично тежки, например хипотония (понижаване на кръвното налягане), стомашни смущения като диспепсия (нарушено храносмилане), гадене, повръщане, световъртеж, замаяване, топли вълни, обриви по кожата, сънливост, безсъние.

Ако се появят нежелани лекарствени реакции, моля, информирайте Вашия лекар. Той ще вземе решение за по-нататъшното поведение. Ако забележите симптоми, които не са изброени тук, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **Може ли да шофирате или да работите с машини и на необезопасени места, докато приемате СЕРМИОН<sup>®</sup>**

Досега няма данни за негативно влияние на СЕРМИОН<sup>®</sup> върху способността за шофиране и работа с машини, или на необезопасени места.

### **Указания за съхранение**

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е предназначено за Вас. Не го давайте на други. Може да не е подходящо за тях.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Лекарството не трябва да се приема след изтичане на означения върху опаковката срок на годност.

**Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца!**

### **Допълнителна информация**

Тази листовка за пациента не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**Дата на последна редакция на текста**

