

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Фромилид 250 mg/5 ml гранули за перорална супензия
Fromilid 250 mg/5 ml granules for oral suspension

ФАРМАЦЕУТИЧЕСКА Агенция по лекарства	
Еднократна държавна регистрация на продукта - Приложение 1	
Ном. Рег. №	20090956
Серийни №	86/174/14-50722
Датата на издаване	
14-03-2018	

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

5 ml супензия (1 спринцовка за перорално приложение) съдържа 250 mg кларитромицин (*clarithromycin*) (1 ml от пероралната супензия съдържа 50 mg кларитромицин).

Помощни вещества с известно действие:

250mg/5ml гранули за перорална супензия съдържат 1,27 g захароза.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гранули за перорална супензия

Гранулите от 250 mg/5 ml, са бели до почти бели, дребни, безформени гранули.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

- инфекции на горните дихателни пътища (тонзило-фарингит, отитис медиа, остръ синузит)
- инфекции на долните дихателни пътища (остър бактериален бронхит, обостряне на хроничен бронхит, пневмония и атипична пневмония)
- инфекции на кожата и подкожните тъкани
- инфекции, причинени от микобактерии (*Mycobacterium avium complex*, *Mycobacterium kansassii*, *Mycobacterium marinum*, *Mycobacterium leprae*)
- профилактика по отношение на тези инфекции при пациенти, болни от СПИН
- за ерадикация на *Helicobacter pylori* при пациенти с дуоденална или стомашна язва (винаги в комбинация с други лекарствени средства).

Фромилид гранули за перорална супензия е предназначен за лечение при деца от 6 месеца до 12 годишна възраст.

Трябва да се имат предвид официалните препоръки за употреба на антибактериалните агенти.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и деца над 12 година възраст - обикновено по 250 mg на всеки 12 часа. За лечение на синузит, тежки инфекции, причинени от *Haemophilus influenzae* - по 500 mg на всеки 12 часа. За ерадикация на *Helicobacter pylori* - 250 mg до 500 mg два пъти дневно, обикновено в продължение на 7 дни, в комбинирано лечение с други лекарства.

За лечение и профилактика на разпространение на инфекции с *Mycobacterium avium complex* прилагат 500 mg на всеки 12 часа. Дозата може да бъде повишена. Максималната дневна доза е 2 g.



Педиатрична популация

Клинични изпитвания са проведени при употреба на педиатрична суспензия кларитромицин при деца на възраст между 6 месеца и 12 годишна възраст. Следователно при деца под 12 годишна възраст трябва да се използва педиатрична суспензия кларитромицин (гранули за перорална суспензия).

Деца под 12 година възраст - обичайната дозировка е 15 mg/kg дневно, разделени в два приема. Препоръчва се след приема на суспензиите да се поема някаква течност. Пероралната суспензия съдържа малки гранулки, които не трябва да се сдъвкат, защото са горчиви. Предвидена е орална спринцовка за дозиране. В една пълна спринцовка има 5 ml суспензия, съдържаща 250 mg кларитромицин. След всяка употреба спринцовката трябва да се изплаква с вода.

Дозата за деца се определя от телесното тегло. В таблицата са посочени указания за дозиране.

Телесно тегло на детето	Доза в ml за пероралната суспензия250 mg/5 ml (спринцовка)	Доза в mg
33 kg	5 ml два пъти дневно (1)	250 mg
24 kg	3,75 ml два пъти дневно ($\frac{3}{4}$)	187,5 mg
16 kg	2,5 ml два пъти дневно ($\frac{1}{2}$)	125 mg
8 kg	1,25 ml два пъти дневно ($\frac{1}{4}$)	62,5 mg

Обикновено лечението продължава 5 до 10 дни.

*За лечение и профилактика на инфекции, причинени от *Mycobacterium avium* complex при деца* се прилагат 15 mg/kg дневно в 2 приема. Максималната дневна доза при деца е 1 g. Лечението на инфекция с *Mycobacterium avium* complex е с голяма продължителност.

Пациенти с чернодробно увреждане

При леко или умерено чернодробно увреждане не се налага адаптиране на дозата, ако бъбренчата функция е нормална.

Пациенти с бъбреично увреждане

При пациенти с бъбреично увреждане с креатининов клирънс по-малък от 30 ml/min, дозата на кларитромицина трябва да бъде намалена на половина, т.е 250 mg веднъж дневно или 250 mg два пъти дневно при по-тежките инфекции. При тези пациенти лечението не трябва да продължава повече от 14 дни. Тъй като таблетката не може да бъде разделена, дозата не може да бъде по-малка от 500 mg дневно. Кларитромицин таблетки с изменено освобождаване не може да се използва при тези пациенти (вж. точка 4.3).

Начин на приложение

За перорално приложение.

Приготвяне на суспензиите

За приготвянето на 60 ml от суспензиите (250 mg/5ml), е необходимо 42 ml пречистена или преварена и охладена вода. Бутилката се разклаща предварително, за да се оситнят гранулите. Прибавете приблизително $\frac{1}{2}$ от необходимото количество вода. Веднага разплатете добре, за да се смеси цялото количество с водата, след което прибавете остатъка от водата. Разтворената суспензия трябва да достигне маркираното ниво на бутилката.

4.3 Противопоказания

Приложението на кларитромицин е противопоказано при пациенти, алергични към активното(ите) вещество(а) или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, или към други макролидни антибиотици.



Тъй като дозата не може да бъде по-малка от 500 mg дневно, кларитромицин таблетки с изменено освобождаване е противопоказан при пациенти с креатининов клирънс по-малко от 30 ml /min. Всички други форми могат да се използват при тази популация пациенти.

Едновременното приложение на кларитромицин и някое от следните лекарства е противопоказано: астемизол, цизаприл, пимозид, терфенадин, тъй като това може да доведе до удължаване на QT-интервала и сърдечни аритмии, включително камерна тахикардия, камерно мъждене и *torsades de pointes* (вж. точка 4.5).

Едновременното приложение с тикагрелор или ранолазин е противопоказано.

Едновременното приложение на кларитромицин и ерготамин или дихидроерготамин е противопоказано, тъй като това може да доведе до токсичност на ергоалкалоидите.

Кларитромицин не трябва да се прилага при пациенти с история на удължаване на QT интервала (вродено или документирано придобито удължаване на QT-интервала) или камерна сърдечна аритмия, включително *torsades de pointes* (вж. точки 4.4 и 4.5).

Кларитромицин не трябва да се използва едновременно с HMG-CoA редуктазни инхибитори (статини), които се метаболизират екстензивно от CYP3A4 ловастатин или симвастатин, поради повишен риск от миопатия, включително рабдомиолиза (вж. точка 4.5).

Кларитромицин не трябва да се дава на пациенти с хипокалиемия (рисък от удължаване на QT-интервала).

Кларитромицин не трябва да се използва при пациенти, които страдат от тежка чернодробна недостатъчност в комбинация с бъбречна недостатъчност.

Както и други мощни CYP3A4 инхибитори, кларитромицин не бива да се използва при пациенти, приемащи колхицин.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба


Лекарят не трябва да предписва кларитромицин на бременни жени без внимателна преценка на съотношението полза /рисък, особено през първите три месеца на бременността (вж. точка 4.6).

Препоръчва се повищено внимание при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.2).

Кларитромицин се отделя главно през черния дроб. Ето защо е необходимо повищено внимание при приложението на антибиотика при пациенти с нарушенa чернодробна функция. Повищено внимание е необходимо и при приложението на кларитромицин при пациенти с умерено до тежка бъбречна недостатъчност.

Има докладвани случаи на фатална чернодробна недостатъчност (вж. точка 4.8). Някои пациенти може да са имали предшестващо чернодробно заболяване или може да са приемали други хепатотоксични лекарствени продукти. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да спрат лечението и да се свържат със своя лекар, ако се появят признания и симптоми на чернодробно заболяване като анорексия, жълтеница, тъмна урина, сърбеж или болезнен корем.

Псевдомемброзен колит е съобщаван при почти всички антибактериални средства, включително макролиди и може да варира от леко до живото-застрашаващо състояние. *Clostridium difficile* - свързана диария (CDAD) е съобщаван при приложението на почти всички антибактериални средства, включително кларитромицин и може да варира от лека диария до фатален колит. Лечението с антибактериални средства нарушава нормалната флора на дебелото черво, което може да доведе до свръхрастеж на *C. difficile*. CDAD трябва да се има предвид при



всички пациенти с диария след приложението на антибиотици. Необходимо е внимателното снемане на медицинска анамнеза, тъй като случаи на CDAD са съобщавани около два месеца след приложението на антибиотичното лечение. Затова трябва да се обмисли прекратяване на лечението с кларитромицин, независимо от показанията.

Трябва да се проведат микробни тестове и да се започне адекватно лечение. Лекарствата, потискащи перисталтиката трябва да се избягват.

По време на пост-маркетинговия период са съобщавани случаи на колхицинова токсичност при едновременното приложение на кларитромицин и колхицин, особено при пациенти в старческа възраст и/или пациенти с бъбречна недостатъчност.

Има съобщения за смъртни случаи при такива пациенти (вж. точка 4.5). Едновременната употреба на кларитромицин и колхицин е противопоказана (вж. точка 4.3).

Препоръчва се повищено внимание по отношение на едновременното приложение на кларитромицин и триазолобензодиазепини като триазолам и мидазолам (вж. точка 4.5).

Препоръчва се повищено внимание по отношение на едновременното приложение на кларитромицин с други ототоксични лекарства, особено с аминогликозиди. Мониторинг на вестибуларния апарат и слуховата функция трябва да се извърши по време на и след лечението.

Удължаване на QT-интервала

Удължена сърдечна реполяризация и QT интервал, който се свързва с риск от развитие на сърдечна аритмия и Torsade de Pointes, са били наблюдавани при лечение с макролиди, включително кларитромицин (вж. точка 4.8). Тъй като следните ситуации могат да доведат до повишен риск от камерни аритмии (включително Torsade de Pointes), кларитромицин трябва да се използва с повищено внимание при следните пациенти:

- Пациенти с коронарна болест, тежка сърдечна недостатъчност, проводни нарушения или клинично значима брадикардия,
- Пациенти с електролитни нарушения като хипомагнезиемия. Кларитромицин не трябва да се прилага на пациенти с хипокалиемия (вж. точка 4.3).
- Пациенти, приемащи едновременно други лекарствени продукти, свързани с удължаване на QT интервала (вж. точка 4.5).
- Едновременно приложение на кларитромицин с астемизол, цизаприд, пимозид и терфенадин е противопоказано (вж. точка 4.3) камерно мъждене.
- Кларитромицин не трябва да се използва при пациенти с вродено или документирано придобито удължаване на QT или историята на камерна аритмия (вж. точка 4.3).

Пневмония: С оглед на появя на резистентност на *Streptococcus pneumoniae* към макролиди, е важно да се проведат тестове за чувствителност, когато се предписва кларитромицин за придобита в обществото пневмония. При придобита в болница пневмония, кларитромицин трябва да се използва в комбинация с допълнителни подходящи антибиотици.

Инфекции на кожата и подкожните тъкани с лека до умерена тежест: Тези инфекции най-често се причиняват от *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*, като и двата може да са резистентни на макролиди. Затова е важно да се проведат тестове за чувствителност. В случаите когато бета-лактамни антибиотици не могат да се използват (напр. при алергия), други антибиотици като напр. клиндамицин може да са лекарство на пръв избор. Съгласно съвременните ръководства, макролидите могат да се прилагат при кожни и инфекции на подкожните тъкани, причинени от *Corynebacterium minutissimum*, акне вулгарис и еризипел, в случаите когато не може да се приложи лечение с пеницилин.

В случай на остри реакции на свръхчувствителност като анафилаксия, Stevens-Johnson синдром и токсична епидермална некролиза, лечението с кларитромицин трябва да се прекрати незабавно и да започне незабавно подходящо лечение.



Кларитромицин трябва да се използва с внимание когато се прилага едновременно с лекарства, които индуцират цитохром CYP3A4 ензим (вж. точка 4.5).

HMG-CoA редуктазни инхибитори (станини): Едновременно приемане на кларитромицин с ловастатин и симвастатин е противопоказано (вж. точка 4.3). Необходимо е повишено внимание при предписването на кларитромицин и други станини. Съобщават се случаи на рабдомиолиза при пациенти, приемащи кларитромицин и станини. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признания и симптоми на миопатия. В случаи, когато едновременната употреба на кларитромицин и станини не може да бъде избегната е препоръчително предписването на най-ниската регистрирана доза на станините. Употребата на станини, които не са зависими от CYP3A метаболизъм (напр. флувастиatin) може да бъде обмислена (вж. точка 4.5).

Перорални хипогликемични лекарства/Инсулин: Едновременното приемане на кларитромицин и перорални хипогликемични лекарства (като сулфонилтуреи) и/или инсулин може да доведе до значима хипогликемия. Препоръчва се внимателно проследяване на нивата на глюкозата (вж. точка 4.5).

Перорални антикоагуланти: Съществува риск от сериозна хеморагия и значително повишаване на INR (отношение между протромбиновото време и времето на контролата) и на протромбиновото време, когато варфарин и кларитромицин се прилагат едновременно (вж. точка 4.5). INR и протромбиновото време трябва да се проследяват често в периода на едновременен прием на кларитромицин и перорални антикоагуланти.

Употребата на каквато и да било терапия, като напр. кларитромицин, за лечение на инфекция с *H. pylori* може да доведе до развитие на резистентни към лекарството микроорганизми.

Продължителното приложение на продукта може, както и при другите антибиотици, да доведе до колонизиране на повишен брой нечувствителни бактерии и гъбички. Ако се появят суперинфекци, трябва да се назначи подходящо лечение.

Необходимо е и повишено внимание по отношение на възможността за кърстосана резистентност между кларитромицин и други макролиди, както и с линкомицин и клиндамицин.

Приложението на кларитромицин при пациенти с порфирия трябва да се избягва.

Не е натрупан достатъчно опит относно ефективността и безопасността на употребата на кларитромицин при деца под 6 месечна възраст и деца, инфектирани с *Mycobacterium avium complex* под 20 месечна възраст.

Специални предупреждения за помощните вещества

Гранулите за перорална суспензия съдържат захароза. Пациентите с вродена фруктозна непоносимост, с глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтозен дефицит не трябва да приемат това лекарство.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Приложението на представените по-долу лекарствени продукти е строго противопоказано поради възможността от появата на тежки ефекти при взаимодействие:

Цизаприд, пимозид и терфенадин

Докладвани са повишени нива на цизаприд при пациенти, лекувани едновременно с кларитромицин и цизаприд. Това може да доведе до удължаване на QT-интервал и сърдечни аритмии, вкл. камерна тахикардия, камерна фибрилация и torsades de pointes.



Подобни ефекти са наблюдавани при пациенти, приемащи едновременно кларитромицин и пимозид (вж. точка 4.3).

Докладвано е, че макролидите повлияват метаболизма на терфенадин, което води до повишаване на плазмените му нива и се свързва със сърдечни аритмии като удължаване на QT - интервала, камерна тахикардия, камерна фибрилация и камерно мъждене и torsades de pointes (вж. точка 4.3). В клинично изпитване при 14 здрави доброволци, едновременното приложение на кларитромицин и терфенадин е довело до двукратно и трикратно повишаване на серумните нива на киселия метаболит на терфенадин и в удължаване на QT-интервала, който не е довел до каквито и да е клинично значими ефекти. Подобни ефекти са наблюдавани и при едновременно лечение с астемизол и други макролиди.

Ерготамин/дихидроерготамин

Пост-маркетинговите съобщения показват, че едновременното приложение на кларитромицин и ерготамин или дихидроерготамин е свързано с остра ерготинова токсичност, характеризираща се с вазоспазъм и исхемия на крайниците и други тъкани, включително и на централната нервна система. Едновременното приложение на кларитромицин с тези лекарствени продукти е противопоказано (вж. точка 4.3).

HMG-CoA Редуктазни инхибитори (статини)

Едновременната употреба на кларитромицин с ловастатин или симвастатин е противопоказана (вж. точка 4.3), тъй като тези статини се метаболизират екстензивно чрез CYP3A4 и едновременното лечение с кларитромицин повишава тяхната плазмена концентрация, което повишава риска от миопатия, включително рабдомиолиза. Случаи на рабдомиолиза са съобщавани при пациенти приемащи кларитромицин едновременно с тези статини. Ако лечението с кларитромицин не може да бъде избегнато, терапията с ловастатин или симвастатин трябва да бъде прекратена по време на курса на лечение.

Препоръчва се внимание при предписването на кларитромицин и статини. В случаи, когато едновременната употреба на кларитромицин и статини не може да бъде избегната се препоръчва предписването на най-ниската регистрирана доза на статина. Може да се обмисли употребата на статин, който не е зависим от CYP3A метаболизъм (напр. флувастиatin). Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признания и симптоми на миопатия.

Ефекти на другите лекарствени продукти върху кларитромицин

Лекарствата, които са индуктори на CYP3A (напр. рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, жълт кантарион) могат да индуцират метаболизма на кларитромицин. Това може да доведе до субтерапевтични нива на кларитромицин, водещи до понижаване на ефикасността му. Освен това, може да е необходимо мониториране на плазмените нива на индукторите на CYP3A, които може да са се повишили поради инхибиране на CYP3A, от кларитромицин (вж. също в съответната продуктова информация за приложението на инхибиторите на CYP3A4). Едновременното прилагане на рифабутин и кларитромицин може да доведе до повишаване на серумните нива на рифабутин и намаляване на серумните нива на кларитромицин като съществува и повишен риск от увеит.

За следните лекарства е известно или се подозира, че оказват влияние на циркулиращите концентрации на кларитромицин. Налага се коригиране на дозата на кларитромицин или може да се наложи разглеждане на алтернативни лечания.

Ефавиренц, невипарин, рифампицин, рифабутин и рифапентин

Мощни индуктори на цитохром P 450 системата като ефавиренц, невипарин, рифампицин, рифабутин и рифапентин могат да засилят метаболизма на кларитромицин и така да понижат плазмените му нива, като повишават тези на 14-OH-кларитромицин, също микробиологично активен метаболит. Тъй като микробиологичната активност на кларитромицин



кларитромицин е различна за различните бактерии, желаният ефект може да бъде влошен при едновременно прилагане на кларитромицин и ензимни индуктори.

Етравирин

Експозицията на кларитромицин е намалена чрез етравирин, въпреки това концентрацията на активния метаболит 14-OH-кларитромицин, е повишена. Тъй като активността на 14-OH-кларитромицин срещу *Mycobacterium avium complex* (MAC) е намалена, цялостната активност срещу този патоген може да бъде повлияна, поради което трябва да се обмисли алтернативно лечение с кларитромицин срещу MAC.

Флуконазол

Едновременното приложение на флуконазол 200 mg дневно и кларитромицин 500 mg два пъти дневно при 21 здрави доброволци е довело до повишаване на средните минимални равновесни концентрации (C_{min}) на кларитромицин и площта под кривата (AUC), съответно с 33% и 18%. Равновесните концентрации на активния метаболит 14-OH-кларитромицин не са променени значително при едновременното приложение с флуконазол. Не се налага адаптиране на дозата на кларитромицин.

Ритонавир

Фармакокинетично проучване е демонстрирало, че едновременно приемане на ритонавир 200 mg на всеки осем часа и кларитромицин 500 mg на всеки 12 часа е довело до значително потискане на метаболизма на кларитромицин. Максималната концентрация (C_{max}) на кларитромицин е повишена с 31%, C_{min} - с 182% и площта под кривата (AUC) - със 77% при едновременно приемане на ритонавир. Наблюдавано е пълно потискане на образуването на 14-OH-кларитромицин. Поради широкия терапевтичен прозорец на кларитромицин, при пациенти с нормална бъбречна функция не се налага намаляване на дозата. Въпреки това, при пациенти с бъбречно увреждане, трябва да се обмисли следното: при пациенти с креатининов клирънс от 30 до 60 ml/min дозата на кларитромицин трябва да се намали с 50%. При пациенти с КК < 30 ml/min дозата на кларитромицин трябва да се намали със 75%. Дози, по-високи от 1 g дневно не трябва да се прилагат заедно с ритонавир.

Подобни корекции на дозата трябва да се обмислят при пациенти с намалена бъбречна функция, когато ритонавир се използва като фармакокинетичен усилвател с други HIV протеазни инхибитори, включително атазанавир и саквинавир (вж. раздела по-долу, двупосочни лекарствени взаимодействия).

Ефекти на кларитромицин върху други лекарствени продукти

Взаимодействия, базирани на CYP3A

Едновременното приложение на кларитромицин, за който е известно, че инхибира CYP3A и лекарства, метаболизирани основно с помощта на CYP3A, може да доведе до повишаване концентрациите на тези лекарства, което да повиши или удължи, както терапевтичния, така и нежеланите ефекти на едновременно прилаганите с кларитромицин лекарства. Кларитромицин трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти на лечение с други лекарства, за които е известно, че са ензимни субстрати на CYP3A, особено ако те имат тесни граници на безопасност (напр. карбамазепин) и/или се метаболизират екстензивно от този ензим.

Може да се обмисли промяна на дозата, а когато е възможно и редовно проследяване на серумните концентрации на лекарствата, метаболизирани предимно от CYP3A, при пациентите приемащи едновременно кларитромицин.

Следните лекарства или класове се метаболизират от същите CYP3A изoenзими: азtreпазолам, карбамазепин, цилостазол, цизаприд, циклоспорин, дизопирамид, ерготаминови алкалоиди, ловастатин, метилпреднизолон, мидазолам, омепразол, перорални антикоагуланти (напр. варфарин, вж. точка 4.4), атипични антипсихотици (напр. кветиапин), пимозид, хинидин,



рифабутин, силденафил, симвастатин, такролимус, терфенадин, триазолам и винбластин. Лекарства, които взаимодействват чрез подобни механизми с други изоензими от цитохром P450 системата, са фенитоин, теофилин и валпроат.

Антиаритмици

Съществуват постмаркетингови съобщения за torsades de pointes, настъпващи при едновременно приложение на кларитромицин и хинидин или дизопирамид. При едновременно прилагане на кларитромицин с тези лекарства, електрокардиограмите трябва да се наблюдават за удължаване на QT-интервала. По време на лечението с кларитромицин трябва да се мониторират серумните нива на хинидин и дизопирамид.

Има пост-маркетингови съобщения за хипогликемия при едновременния прием на кларитромицин и дизопирамид. Поради това нивата на кръвната глюкоза трябва да се проследяват по време на едновременния прием на кларитромицин и дизопирамид.

Перорални хипогликемични агенти/Инсулин

С определени хипогликемични лекарства като натеглинид и репаглинид, може да се наблюдава инхибиция на ензима CYP3A, което може да причини хипогликемия при едновременната им употреба с кларитромицин. Необходимо е внимателно проследяване на нивата на глюкозата.

Омепразол

Кларитромицин (500 mg на всеки 8 часа) е приложен в комбинация с омепразол (40 mg дневно) на здрави възрастни лица. Равновесните плазмени концентрации на омепразол се увеличават (C_{max} , AUC_{0-24} и $t_{1/2}$ се увеличават с 30%, 89% и 34%, съответно) при едновременно прилагане на кларитромицин. Средната 24-часова стойност на pH е била от 5,2, когато омепразол е бил приложен самостоятелно и 5,7, когато омепразол е бил приложен с кларитромицин.

Силденафил, тадалафил и варденафил

Всеки един от тези фосфодиестеразни инхибитори се метаболизира поне от части от CYP3A, като CYP3A може да бъде инхибиран при едновременното приложение на кларитромицин. Едновременното приложение на кларитромицин със силденафил, тадалафил и варденафил, обикновено води до повишаване експозицията на фосфодиестеразния инхибитор. При едновременното приложение на силденафил, тадалафил и варденафил с кларитромицин трябва да се обмисли възможността за понижаване дозата на първите.

Теофилин, карbamазепин

Резултати от клинични проучвания показват, че съществува умерено, но значително ($p \leq 0.05$) повишаване нивата на циркулиращия теофилин или карbamазепин, когато едно от тези лекарства се прилага едновременно с кларитромицин. Може да се наложи понижаване на дозата.

Толтеродин

Метаболизът на толтеродин се осъществява предимно с помощта на 2D6 изоформата на цитохром P450 (CYP2D6). Въпреки това, при популацията с липса (недостиг) на CYP2D6, метаболизът се извършва с помощта на CYP3A. При тази група, инхибирането на CYP3A води до значително по-високи серумни концентрации на толтеродин. Може да е необходимо намаляване дозата на толтеродин в присъствието на CYP3A инхибитори, като кларитромицин при популацията на слаби метаболизатори на CYP2D6.

Триазолベンзодиазепини (напр. алпразолам, мидазолам, триазолам)

Когато мидазолам се прилага заедно с кларитромицин таблетки (500 mg два пъти дневно), AUC на мидазолам е повишено 2,7-пъти след интравенозно приложение на мидазолам и 1,7-пъти след перорално приложение. Едновременното приложение на перорален мидазолам с кларитромицин трябва да се избягва. При интравенозно приложение на мидазолам с кларитромицин, пациентите трябва да бъдат редовно наблюдавани с оглед евентуална промяна на дозата.



Същите предпазни мерки трябва да се приложат и по отношение на другите бензодиазепини, метаболизирани от CYP3A, включително триазолам и алпразолам. При бензодиазепините, чието елиминиране не е зависимо от CYP3A (темазепам, нитразепам, лоразепам) не се очаква взаимодействие с кларитромицин.

Има пост-маркетингови съобщения за лекарствени взаимодействия и ефекти върху централната нервна система (ЦНС) (напр. сомнолентност и обърканост) при едновременното приложение на кларитромицин и триазолам. Препоръчва се проследяване на пациентите по отношение на повишаване на формакологичните ефекти върху ЦНС.

ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аминогликозиди

Необходимо е внимание относно едновременното приложение на кларитромицин с други ототоксични лекарства, особено с аминогликозиди (вж. точка 4.4).

Колхицин

Колхицин е субстрат както на CYP3A, така и на ефлуксната транспортна система P-гликопротеин (Pgp). Известно е, че кларитромицин и останалите макролиди са инхибитори на CYP3A и Pgp. При едновременното приложение на кларитромицин и колхицин, инхибирането на Pgp и/или CYP3A от кларитромицин може да доведе до повишаване експозицията на колхицин. Пациентите трябва да бъдат проследявани за появата на клинични симптоми на колхицинова токсичност (вж. точки 4.3 и 4.4).

Дигоксин

Счита се, че дигоксин е субстрат на ефлуксната транспортна система P-гликопротеин (Pgp). Известно е, че кларитромицин инхибира Pgp. При едновременното приложение на кларитромицин и дигоксин, инхибирането на Pgp от кларитромицин може да доведе до повишаване експозицията на дигоксин. В постмаркетинговия период са съобщавани случаи на повишение на серумни концентрации на дигоксин при пациентите, приемащи кларитромицин и дигоксин. Някои от пациентите са показвали клинични признания на дигоксинова интоксикация, включително потенциално фатални аритмии. Серумните концентрации на дигоксин трябва да бъдат внимателно проследявани при пациентите, приемащи едновременно дигоксин и кларитромицин.

Зидовудин

Едновременно перорално приложение на кларитромицин таблетки и зидовудин при HIV - инфицирани възрастни пациенти може да доведе до намаляване на стационарните концентрации на зидовудин. Тъй като кларитромицин повлиява при усвояването на едновременно прилаган перорално с него зидовудин, това взаимодействие може да бъде до голяма степен избегнато когато съществува 4-часов интервал на прием между всяко лекарство. Това взаимодействие не се проявява при деца, заразени с HIV, приемащи кларитромицин суспензия със зидовудин или дидеоксиинозин. Това взаимодействие е малко вероятно, когато кларитромицин се прилага чрез интравенозна инфузия.

Фенитоин и валпроат

Има спонтанни или публикувани съобщения за взаимодействието на инхибитори на CYP3A, включително кларитромицин с лекарства, които не се метаболизират от CYP3A (напр. фенитоин и валпроат). Препоръчва се определяне на серумните нива на тези лекарства, когато се прилагат едновременно с кларитромицин. Има съобщения за повишаване на серумните нива.

Двупосочни фармакокинетични взаимодействия

Атазанавир

Кларитромицин и атазанавир са субстрати и инхибитори на CYP3A, което води до двупосочно взаимодействие. Едновременното приложение на кларитромицин (500 mg два пъти дневно)



атазанавир (400 mg веднъж дневно) води до двукратно повишение експозицията на кларитромицин и 70% понижение експозицията 14(ОН)-хидрокси-кларитромицин, при 28% повишение AUC на атазанавир. Поради широкия терапевтичен индекс (прозорец) на кларитромицин, не се налага понижаване на дозата при пациенти с нормална бъбречна функция. При пациентите с умерена бъбречна функция (креатининов клирънс 30 до 60 ml/min), дозата на кларитромицин трябва да бъде намалена с 50%. При пациентите с креатининов клирънс <30 ml/min, дозата на кларитромицин трябва да бъде намалена със 75% при използването на подходяща лекарствена форма на кларитромицин. Дози на кларитромицин, по-високи от 1000 mg дневно не трябва да се прилагат заедно с протеазни инхибитори.

Блокери на калциевите канали

Изиска се внимание при едновременния прием на кларитромицин и блокери на калциевите канали, метаболизиращи се от CYP3A4 (напр. верапамил, амлодипин, дилтиазем) поради риска от хипотензия. Плазмената концентрация на кларитромицин, както и на блокери на калциевите канали, може да се повиши поради това взаимодействие. При пациенти, приемащи едновременно кларитромицин и верапамил са наблюдавани хипотензия, брадикардия и млечна ацидоза.

Итраконазол

Кларитромицин и итраконазол са субстрати и инхибитори на CYP3A, което води до двупосочко взаимодействие. Кларитромицин може да повиши плазмените нива на итраконазол, а итраконазол може да повиши плазмените нива на кларитромицин. Пациентите, приемащи едновременно итраконазол и кларитромицин трябва да бъдат редовно проследявани за признания или симптоми на повишен или удължен фармакологичен ефект.

Саквинавир

Кларитромицин и саквинавир са субстрати и инхибитори на CYP3A, което е доказателство за двупосочни лекарствени взаимодействия. Едновременното приложение на кларитромицин (500 mg два пъти дневно) и саквинавир (меки желатинови капсули 1200 mg три пъти дневно) при 12 здрави доброволци е довело до стойности на равновесните концентрации (AUC) и максималните концентрации (C_{max}) на саквинавир, съответно 177% и 187% по-високи от тези при самостоятелното приложение на саквинавир. Стойностите на AUC и C_{max} на кларитромицин са били с около 40% по-високи в сравнение с тези при самостоятелното приложение на кларитромицин. Не се налага промяна на дозата при едновременното приложение на двете лекарства за ограничен период от време, установено по време на проучвания по отношение на дозата/лекарствената форма. Данните от проучванията върху лекарствените взаимодействия при приложението на меките желатинови капсули не са показателни по отношение на ефектите при приложението на саквинавир под формата на твърди желатинови капсули. Данните от проучванията върху лекарствените взаимодействия при приложението на неподсилен саквинавир не са показателни по отношение на наблюдаваните ефекти при лечението със саквинавир/ритонавир. При едновременното приложение с ритонавир, трябва да се имат предвид потенциалните ефекти на ритонавир върху кларитромицин.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Безопасността на кларитромицин за употреба по време на бременност не е установена. Въз основа на променливи резултати, получени от проучвания при мишки, плъхове, зайци и маймуни, възможността от нежелани реакции върху ембриофеталното развитие не може да се изключи. Затова използването по време на бременност не се препоръчва, без внимателна преценка на ползите от лечението спрямо риска.

Кърмене

Безопасността на кларитромицин по време на кърмене на новородени не е била оценена.



Кларитромицин се отделя в майчиното мляко.
Майките не трябва да кърмят по време на лечението.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за ефекта на кларитромицин върху способността за шофиране или работа с машини. Възможността от развитие на замайване, световъртеж, объркване и дезориентация, които могат да възникнат след прием на лекарства, трябва да бъде взета под внимание преди пациентите да шофират или използват машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

a. Обобщение на профила на безопасност

Много честите и честите нежелани реакции, свързани с лечението с кларитромицин както при възрастни, така и при педиатрична популация, са болки в корема, диария, гадене, повръщане и променен вкус. Тези нежелани реакции обикновено са леки по интензитет и са в съответствие с познатия профил на безопасност на макролидните антибиотици. (вж. раздел Б от точка 4.8). Няма значима разлика в честотата на тези нежелани реакции от страна на стомашно-чревния тракт, по време на клинични изпитвания между популацията пациенти с или без съществуващи микобактериални инфекции.

b. Таблично резюме на нежеланите реакции

Таблицата по-долу показва нежеланите реакции, съобщени при клинични проучвания и от пост-маркетинговия опит с кларитромицин таблетки с независимо освобождаване, гранули за перорална суспензия, прах за инжекционен разтвор, таблетки с удължено и таблетки с изменено освобождаване.

Реакциите, за които се счита, че са възможно свързани с кларитромицин са показани по системо-органен клас и честота, като е използвана следната конвенция:

- много чести ($\geq 1/10$),
- чести ($\geq 1/100$ до $<1/10$),
- нечести ($\geq 1/1\,000$ до $<1/100$),
- редки ($\geq 1/10\,000$ до $<1/1\,000$),
- много редки ($< 1/10\,000$)
- с неизвестна честота (нежелани лекарствени реакции от пост-маркетинговия опит; не може да бъде оценена от наличните данни).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност, когато сериозността може да бъде оценена.

	чести	нечести	С неизвестна честота
Инфекции и инфестации		Кандидоаза, гастроентерит ¹ , инфекции ² , вагинални инфекции	Псевдомемброзен колит, еризипел
Нарушения на кръвта и лимфната система		Левкопения, неутропения ³ , тромбоцитопения ² , еозинофилия ³	Агранулоцитоза, тромбоцитопения
Нарушения на имунната система		Свръхчувствителност	Анафилактична реакция, ангиоедем
Нарушения на метаболизма и храненето		Анорексия, понижен апетит	



Психични нарушения	Инсомния	Тревожност, нервност ² ,	Психично разстройство, състояние на обърканост, деперсонализация, депресия, дезориентация, халюцинации, необичайни сънища
Нарушения на нервната система	Загуба на вкуса, главоболие, нарушения на вкуса	Замаяност, сомнолентност ⁵ , трепор	Конвулсии, агеузия, паросмия, аносмия, парестезия
Нарушения на ухото и лабиринта		Вертиго, увреждане на слуха, шум в ушите	Глухота
Сърдечни нарушения		Електрокардиографско удължаване на QT ⁶ , палпитации	Torsade de pointes ⁶ , камерна тахикардия ⁶ , камерно мъждене
Съдови нарушения			Хеморагия ⁷
Респираторни, тораякали и медиастинални нарушения		Епистаксис ¹	
Стомашно-чревни нарушения	Диария ⁸ , повръщане, диспепсия, гадене, коремна болка	Гастроезофагиална рефлуксна болест ¹ , гастрит, прокталгия ¹ , стоматит, глосит, раздуване на корема ³ , констипация, сухота в устата, оригане, флатуленция,	Остър панкреатит промени в цвета на езика промени в цвета на зъбите
Хепато-билиарни нарушения	Абнормна чернодробна функция	Холестаза ³ , хепатит ³ , повишаване на аланин аминотрансферазата, повишаване на аспартат аминотрансферазата, повишаване на гама-глутамилтрансфераза ³	Чернодробна недостатъчност ⁹ , хепатоцелуларна жълтеница
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	Обрив, хиперхидроза	Сърбеж, уртикария, макуло-папулозен обрив ²	Stevens-Johnson синдром ⁴ , токсична епидермална некролиза ⁴ , Лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), акне
Нарушения на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан		Мускулни спазми ² , миалгия ¹	Рабдомиолиза ^{1,11} , миопатия
Нарушения на бъбреците и			Бъбречна недостатъчност, интерстициален нефрит



пикочните пътища			
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложението		Неразположение ³ , повищена температура ² , астения, болка в гърдите ³ , втрисане ³ , умора ³	
Изследвания		Повишаване на алкалнатаfosфатаза в кръвта ³ , повищаване на лактатдехидрогеназата в кръвта ³	Повищаване на International normalised ratio ⁷ , удължаване на протромбиновото време ⁷ , необичаен цвят на урината

¹ НЛР, съобщавани само при таблетките с удължено освобождаване

² НЛР, съобщавани само при гранулите за перорална суспензия

³ НЛР, съобщавани само при таблетките с незабавно освобождаване

^{4, 6, 8} вж. точка а)

^{5, 7, 10} Вж. точка в)

c. Описание на избрани нежелани реакции

В някои от съобщенията за рабдомиолиза, кларитромицин е приложен едновременно със статини, фибрати, колхицин или алопуринол (вж. точка 4.3 и 4.4).

Налице са пост-маркетингови съобщения за лекарствени взаимодействия и ефекти от страна на централната нервна система (ЦНС) (напр. сомнолентност и обърканост) при едновременната употреба на кларитромицин и триазолам. Необходимо е наблюдение на пациента за засилване на фармакологичните ефекти от ЦНС (вж. точка 4.5).

Има редки съобщения за наличие на кларитромицин таблетки с удължено освобождаване в изпражненията, много от които са настъпили при пациенти с анатомични (включително илеостома или колостомия) или функционални стомашно-чревни разстройства със съкратен път на преминаване през стомашно-чревния тракт. Има няколко съобщения за наличие на остатъци от таблетка при настъпила диария. Препоръчително е пациентите, които открият наличие на остатъци от таблетката в изпражненията и нямат подобрение в състоянието, да преминат към различна форма кларитромицин (например суспензия) или на друг антибиотик.

Специална популация: Нежелани реакции при имунокомпрометирани пациенти (вж. точка Д)

г. Педиатрична популация

Клиничните изпитвания са били проведени с помощта на кларитромицин педиатрична суспензия при деца от 6 месеца до 12 години на възраст. Ето защо, деца под 12-годишна възраст трябва да използват кларитромицин педиатрична суспензия. Няма достатъчно данни, за да се препоръча дозов режим за използване на IV форма на кларитромицин при пациенти на възраст по-малки от 18 години.

Честотата, вида и тежестта на нежеланите реакции при деца се очаква да бъдат същите, както при възрастните.

д. Други специални популации

Имуонокомпрометирани пациенти

При пациенти със СПИН и други имунокомпрометирани пациенти, лекувани със високи перорални дози кларитромицин за продължителен период за микобактериални инфекции, често е било трудно да се отличат нежеланите реакции, свързани с кларитромицин от симптомите на СПИН или интеркурентно заболяване.



При възрастни пациенти, най-често съобщаваните нежелани реакции от пациентите, лекувани с обща дневна доза от 1000 mg и 2000 mg кларитромицин са били: гадене, повръщане, променен вкус, коремна болка, диария, обрив, флатуленция, главоболие, запек, нарушения на слуха, повишаване на серумната глутаминова оксалацетат трансаминаза (SGOT) и серумната глутамат пируват трансаминаза (SGPT). Допълнителни реакции с ниска честота са задух, безсъние и сухота в устата. Случайте са сравними с тези на пациентите, лекувани с 1000 mg и 2000 mg, но обикновено са около 3 до 4 пъти по-често за тези пациенти, които получават обща дневна доза от 4000 mg на кларитромицин.

При тези имунокомпрометирани пациенти, оценките на лабораторните стойности са направени чрез анализ на стойностите извън сериозно абнормалните нива (т.е. крайно високи или ниски граници) за определен тест. Въз основа на тези критерии, при около 2% до 3% от тези пациенти, които са получавали 1000 mg или 2000 mg кларитромицин дневно, са налице сериозно абнормално повишени нива на SGOT и SGPT и абнормално нисък брой бели кръвни клетки и тромбоцити. По-нисък процент от пациентите в тези две дозови групи, са имали също повишени нива на urea в кръвта. Малко по-високо зачестяване на абнормни стойности за всички параметри са отбелязани при пациенти, които са получавали 4000 mg дневно, с изключение на белите кръвни клетки.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Симптоми

Получените съобщения показват, че приемът на големи количества кларитромицин може да доведе до появата на стомашно-чревни симптоми. При един пациент с анамнеза за биполярно разстройство, прием осем грама кларитромицин е наблюдавано последващо нарушение на менталните функции, параноидно поведение, хипокалиемия и хипоксемия.

Предприемане на мерки

Нежеланите реакции, придружаващи предозирането, трябва да се лекуват с помощта на стомашна промивка за елиминиране на неабсорбираното лекарство и поддържащи мерки. Както при останалите макролиди, не се очаква серумните нива на кларитромицин да се повлият значително при хемодиализа или перitoneална диализа.

В случай на предозиране кларитромицин I.V. (прах за разтвор за инжекции) трябва да се спре и да се предприемат всички необходими поддържащи мерки.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакологична група: антиинфекциозни за системна употреба, макролидни антибиотици, АТС код J01FA09.



Механизъм на действие

Кларитромицин е макролиден полусинтетичен дериват на еритромицина. Макролидите се свързват обратимо с Р-центъра на 50S рибозомната субединица и инхибират белъчния синтез. В резултат на това се прекъсва нормалното функциониране на бактериалната клатка, благодарение на твърде разнообразната структура на рибозомите в човешката клетка, свързването на макролидите с тези рибозоми е предотвратено и това вероятно е причината за ниската токсичност на макролидите при хората. Хлорамфеникол и линказамидите в същите бактерии се конкурират с макролидите за свързване на Р-място, което води до антагонистично действие.

Освен кларитромицин неговият метаболит 14- хидроксикларитромицин е също ефективен. Той е два пъти по ефективен от кларитромицин по отношение на *Haemophilus influenzae*.

Основното действие на макролидите е бактериостатично, но то зависи от количеството на макролида, броя на бактериите и фазата на жизнения цикъл, в момента, в който е въведен антибиотикът. Подобно на другите макролиди, кларитромицин може да действа и бактерицидно. Той оказва бактерициден ефект върху *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae* и *Moraxella catarrhalis*.

Съвременните изследвания с еритромицин са доказали, че най-добрият индикатор за прогнозиране ефективността на макролидите, е времето за достигане на концентрация, надвишаваща MIC.

Антибактериална ефективност

Кларитромицин действа бактериостатично и бактерицидно по отношение на голям брой грам-положителни и грам-отрицателни бактерии, които могат да бъдат аероби, анаероби или факултативни анаероби, други бактерии (микоплазми, уреаплазми, хламидии, легионели) и атипични микобактерии.

Таблица 1. Бактерии, чувствителни към кларитромицин

Аеробни грам-положителни бактерии	Аеробни, Грам-отрицателни бактерии	Анаеробни бактерии
<i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Haemophilus influenzae</i>	Грам-положителни бактерии
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Moraxella catarrhalis</i>	<i>Eubacterium</i> spp.
Methicillin-susceptible <i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Legionella pneumophila</i>	<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Streptococcus agalactiae</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Peptococcus</i> spp.
<i>Streptococcus viridans</i>	<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Peptostreptococcus</i> spp.
<i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Propionibacterium acnes</i>
<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Bordetella pertussis</i>	
<i>Bacillus</i> spp.	<i>Pasteurella multocida</i>	Грам-отрицателни бактерии
		<i>Bacteroides</i> spp.
		<i>Bacteroides fragilis</i>
		<i>Prevotella melaninogenica</i>
Други микроорганизми		
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	<i>Mycobacterium avium complex</i>	
<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Mycobacterium fortuitum</i>	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	<i>Mycobacterium chelonae</i>	
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	<i>Mycobacterium kansasii</i>	
<i>Borrelia burgdorferi</i>	<i>Mycobacterium xenopi</i>	
<i>Toxoplasma gondii</i>	<i>Mycobacterium leprae</i>	

При определяне чувствителността на бактериите спрямо кларитромицин е използван стандартизиран метод на базата на разреждане (NCCLS). Един микроорганизъм е чувствителен към кларитромицин, ако MIC е $<2 \mu\text{g}/\text{ml}$, а резистентен при $\text{MIC} < 8 \mu\text{g}/\text{ml}$. При стрептококки,



вклучително *Streptococcus pneumoniae*, границата на чувствителност е MIC е $<0,25 \mu\text{g}/\text{ml}$ и границата на резистентност е MIC $> 1,0 \mu\text{g}/\text{ml}$.

Haemophilus influenzae е чувствителен при $\text{MIC} < 8 \mu\text{g}/\text{ml}$ и резистентен при $\text{MIC} \geq 32 \mu\text{g}/\text{ml}$. През 2004 European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS), в която участват 28 държави публикува данни за резистентност на инвазивните щамове на *Streptococcus pneumoniae* за периода 1999-2002 год. Общата резистентност на рпнеумососи към пеницилини е 10%, към еритромицин 17% и 6% са били резистентни към пеницилин и еритромицин. Резистентността към пеницилин и еритромицин е била най-висока в страните от Южна Европа, по-специално Испания и Франция, където е била 25%.

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Кларитромицин е стабилен в присъствие на стомашна киселина. Бионаличността му е приблизително 55% от перорално приемата доза. Храната може да забави резорбцията, но не променя съществено бионаличността на кларитромицин. Около 20% от кларитромицин бързо се метаболизират до 14-хидрокси кларитромицин, със същия биологичен ефект, както при кларитромицин. При здрави доброволци са установени серумни концентрации, пропорционални на количеството приемата доза. Препаратът достига максимални серумни концентрации за по-малко от 3 часа. След единична перорална доза от 250 mg кларитромицин, средните концентрации са 0,62 $\mu\text{g}/\text{ml}$ до 0,84 $\mu\text{g}/\text{ml}$, а след единична доза от 500 mg, те са били от порядъка на 1,77 до 1,89 $\mu\text{g}/\text{ml}$. Съответните концентрации на 14-хидрокси метаболита са от 0,4 до 0,7 $\mu\text{g}/\text{ml}$ след прием на доза от 250 mg и от 0,67-0,8 $\mu\text{g}/\text{ml}$ след доза от 500 mg. Стойностите на площта под кривата на серумната концентрация във времето (AUC x време) са 4 $\mu\text{g}/\text{ml} \times \text{h}$ след прием на доза от 250 mg и 11 $\mu\text{g}/\text{ml} \times \text{h}$ след прием на доза от 500 mg.

След многократен прием на дози от 250 mg кларитромицин два пъти дневно, равновесна концентрация на кларитромицин се достига след петата доза, с максимална концентрация на кларитромицин 1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ и на 14-хидроксикларитромицин 0,6 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

Максималните равновесни концентрации при деца, приемащи кларитромицин под форма на орална суспензия в дози 7,5 mg/kg 2 пъти дневно на всеки 12 часа, са от порядъка на 3 $\mu\text{g}/\text{ml}$ до 7 $\mu\text{g}/\text{ml}$, а съответните концентрации на 14-хидроксиметаболита са от 1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ до 2 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

Разпределение

Макролидите са с ниска степен на йонизация и са мастино разтворими, което обуславя доброто им разпространение в телесните течности и тъкани. Обикновено концентрациите на кларитромицин в тъканите са около 10 пъти по-високи от серумните концентрации. Високи концентрации са установени в белите дробове (8,8 mg/kg), сливиците (1,6 mg/kg), лигавицата на носа, кожата, слюнката, алвеоларните клетки, храчките и средното ухо. Обемът на разпределение на кларитромицин при здрави доброволци след прием на единична доза от 250 mg и/или 500 mg е съответно 226 до 266 L или 2,5 l/kg. Обемът на разпределение на 14-хидрокси кларитромицин е 304 до 309 L. Кларитромицин се свързва в малка степен и обратимо със серумните протеини.

Метаболизъм и елиминиране

Кларитромицин се метаболизира в черния дроб. Установени са най-малко 7 метаболита. Най-важният е 14-хидроксикларитромицин. Кларитромицин се екскретира главно в урината под форма на метаболити или в непроменен вид и в много по-малък процент (4%) във фекалиите. Около 20% от доза 250 mg и 30% от доза 500 mg се елиминират непроменени в урината. 10% до 15% от приемата доза се екскретират в урината под форма на 14-хидроксикларитромицин. Времето на полуживот на кларитромицин в доза 250 mg/12h е 3-4 часа, в доза 500 mg/12h - 5-7 часа.

Влияние на възрастта върху фармакокинетиката



Деца и кърмачета: Резултатите от клиничните изпитвания са показвали, че фармакокинетиката на кларитромицин в доза 7,5 mg/kg телесно тегло, приета 2 пъти дневно, е подобна на фармакокинетиката при възрастни.

Пациенти в старческа възраст: Според отчетените резултати при пациенти в старческа възраст не се налага адаптиране на дозата, освен в случаите с тежко функционално бъбречно увреждане.

Влияние на заболяване върху фармакокинетиката: След прием на 200 mg кларитромицин, при пациенти с тежко бъбречно заболяване се наблюдава повишена максимална плазмена концентрация и AUC и понижено елиминиране на кларитромицин в сравнение със здрави доброволци. Общото елиминиране на кларитромицин при пациенти с тежко бъбречно увреждане се понижава от 26,5% до 3,3%, в сравнение със здрави възрастни. Тези резултати показват необходимостта от понижение на дозата или увеличение на интервала от време между приемите при пациенти с чернодробно увреждане, те не се различават от концентрациите при здрави хора, докато концентрациите на 14-хидрокси метаболита са по-ниски.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Предклиничните ефекти са били наблюдавани само при експозиция, многократно надвишаваща максималната експозиция при хора, което показва слаба значимост за клиничната практика. Проведените изследвания по отношение на остра токсичност са установили, че при лабораторни животни токсичността на кларитромицин е ниска. LD₅₀ след перорален прием е от 1,5 до >5g/kg, а след парентерално приложение от 0,7g/kg до > 5,0 g/kg.

Многократното прилагане на много високи дози показва, че кларитромицин оказва хепатотоксично и нефротоксично действие, а така също уврежда и стомашно-чревния тракт. Въпреки, че е установено влияние на кларитромицин върху ембриофеталното развитие, не са наблюдавани тератогенни ефекти. Няколко изпитвания *in vitro* и *in vivo* са установили, че той не притежава мутагенен потенциал. Не са известни литературни данни за канцерогенност. Някои лекарствени форми предизвикват локално дразнене. Кларитромицин не индуцира специфични антигени.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

карбомер
повидон
хипромелозен фталат
талк
пречистено рициново масло
ксантанова гума
аромат на портокал
захарин натрий
моноамониев глициризинат
неохеспиридинов дихидрохалкон
лимонена киселина, безводна
силициев диоксид, колоиден безводен
титанов диоксид (E171)
захароза
калиев сорбат

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност



2 години

Приготвената суспензия може да се използва в продължение на 14 дни при температура под 25°C, като се съхранява на защищено от светлина място.

6.4 Специални условия за съхранение

Да се съхранява под 30°C.

За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Бутилка, пластмасова запушалка, спринцовка за перорално приложение: гранули за разтваряне на 60 ml перорална суспензия 250 mg/5 ml, в кутия

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания за изхвърляне.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20090456

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешение: 12.10.2009г.

Дата на последно подновяване: 05.01.2015

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

