

БЪЛГАРСКА Агенция по лекарствата
Листовка - Приложение 2
Към Ред. № 2001265-
Разрешение № 30581, 18-02-2016
Одобрение №

Листовка: информация за потребителя

Ципрофлоксацин Екофарм 500 mg филмирани таблетки

Ciprofloxacin Ecopharm 500 mg film-coated tablets

Ципрофлоксацин (*Ciprofloxacin*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Ципрофлоксацин Екофарм и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ципрофлоксацин Екофарм
3. Как да приемате Ципрофлоксацин Екофарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ципрофлоксацин Екофарм
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ципрофлоксацин Екофарм и за какво се използва

Ципрофлоксацин Екофарм е антибиотик от групата на флуорохинолоните. Активната съставка е ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин Екофарм действа, като убива бактериите, които са причинили инфекциите. Действа само на определени видове бактерии.

Възрастни

Ципрофлоксацин Екофарм се използва при възрастни за лечение на следните бактериални инфекции:

- инфекции на дихателните пътища;
- продължителни или повтарящи се инфекции на ушите или синусите;
- инфекции на пикочните пътища;
- инфекции на гениталния тракт при мъже и жени;
- инфекции на стомашно-чревния тракт и коремни инфекции;
- инфекции на кожата и меките тъкани;
- инфекции на костите и ставите;
- профилактика на инфекции с *Neisseria meningitidis*;
- вдишване на антракси спори

Ципрофлоксацин Екофарм може да се използва при пациенти с нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения), които имат повишена температура, за която се подозира, че е причинена от бактериална инфекция.

Ако страдате от тежка инфекция или от такава, причинена от повече от един вид бактерии, може да Ви бъде дадено допълнително антибиотично лечение освен Ципрофлоксацин Екофарм.



Деца и юноши

Ципрофлоксацин Екофарм се използва при деца и юноши под медицинското наблюдение на специалист за лечение на следните бактериални инфекции:

- белодробни и бронхиални инфекции при деца и юноши, страдащи от кистозна фиброза;
- усложнени инфекции на пикочните пътища, включително инфекции, които са достигнали до бъбреците (пиелонефрит);
- вдишване на антраксни спори

Ципрофлоксацин Екофарм може да се използва също за лечение на други определени тежки инфекции при деца и юноши, когато Вашият лекар счита това за необходимо.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ципрофлоксацин Екофарм

Не приемайте Ципрофлоксацин Екофарм:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ципрофлоксацин или други хинолонови лекарства, или към някоя от останалите съставки на таблетките Ципрофлоксацин Екофарм (изброени в точка 6);
- ако приемате тизанидин (вижте точка 2. Други лекарства и Ципрофлоксацин Екофарм)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Ципрофлоксацин Екофарм, ако:

- никога сте имали проблеми с бъбреците, защото Вашето лечение може да се наложи да бъде коригирано;
- страдате от епилепсия или други неврологични заболявания;
- имате анамнеза за проблеми със сухожилията по време на предходно лечение с антибиотици като Ципрофлоксацин Екофарм;
- сте диабетик, защото може да сте изложен на рисък от хипогликемия след прием на Ципрофлоксацин Екофарм;
- имате миастения гравис (вид мускулна слабост), защото симптомите може да се обострят;
- имате сърдечни проблеми. Необходимо е повишено внимание при употребата на Ципрофлоксацин Екофарм, ако сте родени или имате фамилна анамнеза за удължен QT-интервал (наблюдаван на ЕКГ, електрокардиограма на сърдечната дейност), ако имате дисбаланс на солите в кръвта (особено ниско ниво на калий или магнезий), ако имате много забавен сърден ритъм (наречен "брадикардия"), ако имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), ако сте имали сърден удар (миокарден инфаркт), ако сте жена или сте в старческа възраст, ако приемате други лекарства, които водят до абнормни ЕКГ промени (вж. точка Други лекарства и Ципрофлоксацин Екофарм);
- е известно, че Вие или член на Вашето семейство има дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (Г6ФД), тъй като може да сте изложени на рисък от анемия след прием на Ципрофлоксацин Екофарм

За лечението на някои инфекции на genitalния тракт Вашият лекар може да Ви предпише друг антибиотик в допълнение към Ципрофлоксацин Екофарм. Ако няма подобреие на симптомите след 3 дни лечение, моля обрнете се към Вашия лекар.


Докато приемате Ципрофлоксацин Екофарм

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако при Вас се прояви някой от следните симптоми:



време на приема на Ципрофлоксацин Екофарм. Вашият лекар ще реши дали лечението с Ципрофлоксацин Екофарм трябва да бъде преустановено.

- Тежка, внезапна алергична реакция (анафилактична реакция/шок, ангиоедем). Още с приема на първата доза има малка вероятност при Вас да се развие тежка алергична реакция със следните симптоми: стягане в гърдите, усещане за замаяност, прилошаване или припадък, получаване на замайване при изправяне. Ако това Ви се случи, спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и незабавно се свържете с Вашия лекар.
- Болки и отоци по ставите и възпаление на сухожилията могат понякога да се проявят, особено ако сте в старческа възраст и сте на лечение с кортикоステроиди. Възпаление или разкъсвания на сухожилията могат да се проявят още в рамките на 48 часа от началото на лечението или до няколко месеца след преустановяване на терапията с Ципрофлоксацин Екофарм. При първите признания на болка или възпаление спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и оставете болезнената област в покой. Избягвайте ненужно натоварване, понеже това може да повиши риска от разкъсване на сухожилията.
- Ако страдате от епилепсия или други неврологични заболявания като церебрална исхемия или инсулт, е възможно да получите нежелани реакции, свързани с централната нервна система. Ако това се случи, спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и се свържете незабавно с Вашия лекар.
- Първия път, когато приемате Ципрофлоксацин Екофарм, е възможно да получите психични реакции. Ако страдате от депресия или психоза, възможно е Вашите симптоми да се влошат по време на лечението с Ципрофлоксацин Екофарм. В редки случаи депресията или психозата могат да прогресират до мисли за самоубийство, опити за самоубийство или извършване на самоубийство. При такава вероятност спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и се свържете незабавно с Вашия лекар.
- Може да се появят симптоми на невропатия като болка, парене, изтърпване, вкочаненост и/или слабост. Ако това се случи, спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и се свържете незабавно с Вашия лекар.
- Съобщава се за хипогликемия, най-често при диабетици, особено в старческа възраст. Ако това се случи, свържете се незабавно с Вашия лекар.
- Възможно е да се развие диария по време на прием на антибиотици, включително Ципрофлоксацин Екофарм, дори няколко седмици след като сте спрели приема им. Ако тя стане тежка или много продължителна или ако забележите, че изпражненията Ви съдържат кръв или слуз, веднага спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм, понеже това състояние може да е животозастрашаващо. Не приемайте лекарства, които спират или забавят перисталтиката и се свържете с Вашия лекар.
- Информирайте лекаря или лаборантите, че приемате Ципрофлоксацин Екофарм, ако ще Ви вземат пробы от кръв или урина.
- Ако страдате от проблеми с бъбреците, говорете с Вашия лекар, тъй като може да е необходимо дозата Ви да се коригира.
- Ципрофлоксацин Екофарм може да причини увреждане на черния дроб. Ако забележите симптоми като загуба на апетит, жълтеница (кожата добива жълтенников отенък), потъмняване на урината, сърбеж или болезненост на корема, спрете приема на Ципрофлоксацин Екофарм и се свържете незабавно с Вашия лекар.
- Ципрофлоксацин Екофарм може да намали броя на белите кръвни клетки и защитата на Вашия организъм може да отслабне. Ако имате инфекция със симптоми като повишена температура и сериозно влошаване на Вашето общо състояние, или повишена температура със симптоми на локална инфекция като възпалено гърло/фаринкс/уста или проблеми с пикочните пътища, Вие трябва веднага да посетите Вашия лекар. Изследването на кръвната картина ще провери възможното намаляване на броя на белите кръвни клетки (агранулоцитоза). Важно е да информирате Вашия лекар, че приемате лекарството.



- Когато приемате Ципрофлоксацин Екофарм, кожата Ви става по-чувствителна на слънчева светлина и на ултравиолетови лъчи. Избягвайте да се излагате на прекалено силно слънце или изкуствени източници на ултравиолетова светлина като солариуми.
- Ако зрението Ви се наруши или очите Ви бъдат засегнати по някакъв друг начин, незабавно се консултирайте със специалист по очни болести.

Други лекарства и Ципрофлоксацин Екофарм

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Не приемайте Ципрофлоксацин Екофарм заедно с тизанидин, понеже това може да доведе до нежелани реакции като ниско кръвно налягане и сънливост (вижте „Не приемайте Ципрофлоксацин Екофарм“).

Известно е, че следните лекарства взаимодействат с Ципрофлоксацин Екофарм в организма Ви. Ако приемате Ципрофлоксацин Екофарм едновременно с тези лекарства, е възможно той да промени лечебните им ефекти. Също така, той може да увеличи вероятността от проява на нежелани реакции.

Иформирайте Вашия лекар, ако приемате:

- антагонисти на витамин K (напр. варфарин, аценокумарол, фенпрокумон или флуиндион) или други перорални антикоагуланти (за разреждане на кръвта);
- пробенецид (за подагра);
- метотрексат (за някои видове рак, псориазис, ревматоиден артрит);
- теофилин (за дихателни проблеми);
- тизанидин (за мускулни спазми при мултиплена склероза);
- оланzapин (антисихотик);
- клозапин (антисихотик);
- ропинирол (за болест на Паркинсон);
- фенитоин (за епилепсия);
- метоклопрамид (за гадене и повръщане);
- циклоспорин (за кожни състояния, ревматоиден артрит или при органна трансплантация);
- други лекарства, които могат да променят Вашия сърден ритъм – лекарства, които принадлежат към групата на антиаритмичните средства (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, сotalол, дофетилид, ибутилид), трициклични антидепресанти, някои антимикробни средства (които принадлежат към групата на макролидите), някои антисихотици

Ципрофлоксацин Екофарм може да повиши нивата на следните лекарства в кръвта Ви:

- пентоксифилин (за нарушения на кръвообращението);
- кофеин;
- дулоксетин (за депресия, диабетно увреждане на нервите или инконтиненция);
- лидокаин (за сърдечни състояния или анестезия);
- силденафил (за нарушения на ерекцията);
- агомелатин;
- золпидем

Някои лекарства намаляват ефекта на Ципрофлоксацин Екофарм. Информирайте Вашия лекар, ако приемате или искате да приемате:

- антиацидни средства;



- омепразол;
- минерални добавки;
- сукралфат;
- фосфатсвързващ полимер (напр. севеламер или лантанов карбонат);
- лекарства или добавки, съдържащи калций, магнезий, алуминий или желязо

Ако тези продукти са важни за Вас, приемайте Ципрофлоксацин Екофарм около 2 часа преди или не по-рано от 4 часа след тях.

Ципрофлоксацин Екофарм с храна, напитки и алкохол

Ако приемате Ципрофлоксацин Екофарм по време на редовното хранене, не яжте и не пийте никакви млечни продукти (като прясно или кисело мляко) или напитки с добавка на калций когато приемате таблетките, понеже те могат да повлият абсорбцията на активната съставка.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

За предпочитане е да се избягва използването на Ципрофлоксацин Екофарм по време на бременност.

Да не се приема Ципрофлоксацин Екофарм по време на кърмене, защото ципрофлоксацин се ескретира в кърмата и може да увреди Вашето дете.

Шофиране и работа с машини

Ципрофлоксацин Екофарм може да понижи вниманието Ви. Някои неврологични нежелани реакции могат да се появят. Затова проверете как реагирате на Ципрофлоксацин Екофарм, преди да шофирате превозни средства или да работите с машини. При съмнение се консултирайте с Вашия лекар.

3. Как да приемате Ципрофлоксацин Екофарм

Винаги приемайте Ципрофлоксацин Екофарм точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще Ви обясни колко точно Ципрофлоксацин Екофарм трябва да приемате, колко често и за колко време. Това зависи от вида на инфекцията и тежестта ѝ.

Иформирайте Вашия лекар, ако страдате от бъбречни проблеми, понеже те могат да наложат корекция на дозата.

Обикновено лечението продължава от 5 до 21 дни, но може и да е по-дълго при тежки инфекции.

Поглъщайте таблетките с много течност. Не ги дъвчете, понеже вкусът им не е приятен.

Опитайте се да приемате таблетките по едно и също време всеки ден.

Можете да приемате таблетките при редовните приеми на храна или помежду им.

Калцият, който е нормална част от храната, няма да повлияе сериозно усвояването им. Не приемайте таблетките Ципрофлоксацин Екофарм с млечни продукти като прясно или кисело мляко или обогатени на калций плодови сокове (напр. обогатен на калций портокалов сок).

Не забравяйте да пиете много течности по време на приема на Ципрофлоксацин Екофарм.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ципрофлоксацин Екофарм



Ако сте приели повече от предписаната Ви доза, потърсете незабавно медицинска помощ. Ако е възможно, вземете таблетките или опаковката им с Вас, за да я покажете на лекаря.

Ако сте пропуснали да приемете Ципрофлоксацин Екофарм

Приемете нормалната доза веднага щом е възможно и след това продължете по предписаната схема. Ако обаче почти е станало време за приемане на следващата доза, не приемайте пропуснатата доза и продължете по схемата. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Непременно завършете целия курс на лечение.

Ако сте спрели приема на Ципрофлоксацин Екофарм

Важно е да завършите курса на лечение, дори ако след няколко дни вече сте се почувствали добре. Ако спрете приема на лекарството прекалено рано е възможно инфекцията Ви да не е напълно излекувана и симптомите ѝ да се появят отново или да се влошат. Възможно е да развиете резистентност към антибиотика.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ципрофлоксацин Екофарм може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции (между 1 и 10 на всеки 100 пациенти могат да ги получат):

- гадене, диария;
- болки в ставите при деца

Нечести нежелани реакции (между 1 и 10 на всеки 1000 пациенти могат да ги получат):

- гъбични суперинфекции;
- високи стойности на еозинофилите (вид бели кръвни клетки);
- загуба на апетит;
- свръхактивност или възбуда;
- главоболие, замаяност, проблеми със съня или нарушения на вкусовите усещания;
- повръщане, болки в stomаха, проблеми с храносмилането като stomашно разстройство (нарушено храносмилане/киселини) или чревни газове;
- повишено ниво на някои вещества в кръвта (трансаминази и/или билирубин);
- обрив, сърбеж или уртикария;
- болки в ставите при възрастни;
- увредена бъбречна функция;
- болки в мускулите и костите, неразположение (астения) или повищена температура;
- повишаване на алкалната фосфатаза в кръвта (определено вещество в кръвта)

Редки нежелани реакции (между 1 и 10 на всеки 10 000 пациенти могат да ги получат):

- възпаление на дебелото черво (колит), свързано с използването на антибиотик (в много редки случаи може да е фатално) (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);
- промени в кръвната картина (левкопения, левкоцитоза, неутропения, анемия), повишен или понижен брой на тромбоцитите (отговарят за кръвосъсирването);
- алергични реакции, оток (едем) или бързо отичане на кожата и лигавиците (ангиоедем);
- повищена кръвна захар (хипергликемия);
- понижена кръвна захар (хипогликемия) (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);



- объркане, дезориентация, реакция на беспокойство, странни сънища, депресия (потенциално водеща до мисли, опити или извършване на самоубийство) или халюцинации;
- иглички и изтръпване, необичайна чувствителност на сетивата към стимули, понижена чувствителност на кожата, треперене, гърчове (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки) или световъртеж;
- проблеми със зрението, включително двойно виждане;
- шум в ушите, загуба на слуха, увреждане на слуха;
- ускорен пулс (тахикардия);
- разширяване на кръвоносните съдове (вазодилатация), ниско кръвно налягане или пропадъци;
- задух, включително астматични симптоми;
- чернодробни нарушения, жълтеница (холестатичен иктер) или хепатит;
- чувствителност към светлина (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);
- болки в мускулите, възпаление на ставите, повишен мускулен тонус или крампи;
- бъбречна недостатъчност, кръв или кристали в урината (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки), възпаление на пикочните пътища;
- задръжка на течности или прекомерно потене;
- повишени стойности на ензима амилаза

Много редки нежелани реакции (по-малко от 1 на всеки 10 000 пациенти могат да ги получат):

- определен тип намаляване на броя на червените кръвни клетки (хемолитична анемия); опасно спадане на броя на вид бели кръвни клетки (агранулоцитоза); спадане на броя на червените и белите кръвни клетки и на тромбоцитите (панцитопения), което може да е фатално, потискане на костния мозък, което също може да бъде фатално (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);
- тежки алергични реакции (анафилактична реакция или анафилактичен шок, които могат да са фатални – серумна болест) (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);
- умствени разстройства (психотични реакции, потенциално водещи до мисли, опити или извършване на самоубийство) (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки);
- мигрена, нарушения на координацията, нестабилна походка (нарушение на походката), нарушение на обонянието (нарушения на обонятелния нерв), повищено налягане в мозъка (интракраниално налягане и мозъчен псевдотумор);
- промени в усещането за цветове;
- възпаление на стената на кръвоносните съдове (васкулит);
- панкреатит;
- загиване на чернодробни клетки (чернодробна некроза), което много рядко води до животозастрашаваща чернодробна недостатъчност;
- малки точковидни кръвоизливи под кожата (петехии); различни кожни обриви (например потенциално фаталния синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза);
- мускулна слабост, възпаление на сухожилията, разкъсване на сухожилията – особено на голямото сухожилие на задната страна на глезната (Ахилесово сухожилие) (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки); влошаване на симптомите на миастения гравис (вижте точка 2. Предупреждения и предпазни мерки)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- проблеми, свързани с нервната система като болка, парене, мравучкане, изтръпване и/или слабост на крайниците (периферна невропатия и полиневропатия);
- абнормно ускорен сърден ритъм, животозастрашаващ неправилен сърден ритъм, изменение на сърден ритъм (наричано „удължаване на QT-интервала” наблюдавано на ЕКГ, електрокардиограма на сърцето);
- гноен обрив;
- повлияване на кръвосъсирването (при пациенти, лекувани с антагонисти на витамин K);



- чувство на силна превъзбуда (мания) или чувство на задоволство и свръхактивност (хипомания);
- реакция на свръхчувствителност, наречена DRESS синдром (лекарствена реакция с еозинофилия и системна симптоматика)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно към: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ципрофлоксацин Екофарм

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 25°C, далеч от влага.

Не използвайте Ципрофлоксацин Екофарм след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте Ципрофлоксацин Екофарм, ако забележите видими белези за нарушенa цялост на таблетката – напукване, промяна на цвета и др., посъветвайте се с фармацевт преди да приемете лекарството.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ципрофлоксацин Екофарм

- Активното вещество е: ципрофлоксацин хидрохлорид, еквивалентен на 500 mg ципрофлоксацин.
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат, талк, силициев диоксид, колоиден безводен, натриев нишестен гликолат (тип A), хипромелоза, титанов диоксид (E171), полиетиленгликол 400.

Как изглежда Ципрофлоксацин Екофарм и какво съдържа опаковката

Бели до почти бели, продълговати, двойноизпъкнали таблетки, с вдълбнато релефно означение „500“ от едната страна и гладки от другата страна. Таблетките се доставят в блистерни ленти от PVC/PVDC/Al фолио. Блистер от 10 таблетки, кутия от 10, 20 и 100 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител



Притежател на разрешението за употреба:

Екофарм Груп АД,
бул. Черни връх 14, бл. 3
1421 София,
България
Тел.: +359 2 963 15 96
Факс: +359 2 963 15 61

Производител, отговорен за освобождаване на партидите и вносител:

Екофарм ЕООД,
бул. Черни връх 14, бл. 3
1421 София,
България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба Екофарм Груп АД.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Декември 2015

Препоръка/Медицинска информация

Антибиотиците се използват за лечение на бактериални инфекции. Те не са ефективни срещу вирусни инфекции. Ако Вашият лекар Ви е предписал антибиотици, Вие се нуждаете от тях само за настоящото заболяване. Някои бактерии могат да преживеят антибиотичното лечение и да продължат да се размножават. Този феномен се нарича резистентност и при появата му лечението с някои антибиотици става неефективно.

Неправилната употреба на антибиотици повишава резистентността. Ако не спазвате предписаните Ви дозировка, начин и продължителност на лечението, Вие подпомагате бактериите да развият резистентност и забавяте оздравяването си.

Мерки за запазване на ефективността на това лекарство:

1. Употребявайте антибиотици, само когато те са Ви предписани от лекар;
2. Придържайте се стриктно към предписанията;
3. Не използвайте отново един и същи антибиотик без лекарско предписание, дори ако става дума за същото заболяване;
4. Никога не давайте Вашия антибиотик на друг човек, тъй като най-вероятно той не е предназначен за неговото заболяване;
5. След приключване на лечението, върнете неизползваното лекарство на Вашия фармацевт. Той ще се погрижи за правилното му унищожаване.

