

TADENAN® 50 mg
ТАДЕНАН 50 mg
меки капсули



Екстракт от *Pygeum africanum*

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Преди да започнете приема на това лекарство, прочетете внимателно цялата листовка. Тя съдържа важна информация за вашето заболяване и лечението му. Ако имате въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към своя лекар или фармацевт за допълнителна информация. Това лекарство е предписано лично на вас. Не го предлагайте на други хора, дори ако симптомите има са същите като вашите, тъй като лекарството може да се окаже вредно за тях. Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ТАДЕНАН 50 mg, меки капсули.

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Екстракт от *Pygeum africanum* 50 mg

За една капсула

Помощни вещества: арахисово масло (фъстъчено масло) (150 mg), желатин (89 mg), глицерол (38 mg), титаниев диоксид (3,6 mg), водно-разтворим меден хлорофиллин (0,005 mg).

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Меки капсули.

4. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoires FOURNIER S.A., 42 Rue de Longvic-21300 Chenove, (Франция)

5. ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС

ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНА
ХИПЕРТРОФИЯ НА ПРОСТАТАТА

(G 04 CX01: пикочо-полова система и полови хормони)



6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Това лекарство се препоръчва за лечение на определени форми на нарушена микция (отделяне на урината), свързани с доброкачествена хиперплазия на простатата (увеличение на обема на простатната жлеза).

7. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

а) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

б) СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Необходимо е лекар – уролог да препоръча лечението след поставяне на диагнозата: доброкачествена хиперплазия на простатата. Ако симптомите продължават или състоянието се влоши се обърнете за консултация към лекар – уролог.

Употребата на това лекарство не освобождава пациентите от обичайните медицински прегледи на простатата. Лекарственият продукт не може да замести хирургичното лечение, когато то е показано.

Този лекарствен продукт съдържа фъстъчено масло, съществува риск от алергични реакции, уртикария, генерализирани алергични реакции).


Бременност и кърмене: Терапевтичните показания не се отнасят за жени.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

в) ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са известни.

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ РЕАКЦИИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРИЕМАТЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, КАКТО И ЗА ВСЕКИ НЕОБИЧАЕН СИМПТОМ, ВЪЗНИКНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.



г) **ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Не са познати такива ефекти.

д) **СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА С ОБЩОИЗВЕСТЕН ЕФЕКТ**

Арахисово масло.

8. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

а) **ДОЗИРОВКА**

Дозировката се определя индивидуално за всеки пациент.

Обикновено се приемат по една капсула сутрин и една вечер, за предпочитане преди хранене.

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА НА СВОЯ ЛЕКАР.

б) **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Перорално приложение.

в) **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Обикновено лечението продължава 6 седмици, но може да бъде удължено и до 8 седмици.

Лечението може да се възобнови при необходимост.

г) **ПРЕДОЗИРАНЕ**

Не е наблюдавано.


д) **МЕРКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРОПУСНЕТЕ ЕДНА ДОЗА**

Не се предприемат.

9. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И ПРОЯВИ НА ДИСКОМФОРТ

КАКТО ВСИЧКИ АКТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТАКА И ТОЗИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА У НЯКОИ ХОРА ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ТРЕВОЖНИ И НЕПРИЯТНИ ЕФЕКТИ

Понякога нарушения на храносмилателната система (гадене, запек, диария и алергични реакции).



УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ ИЛИ ДИСКОМФОРТ, НЕСПОМЕНАТИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

10. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Лекарството трябва да се съхранява при температура под 25°C и на недостъпно за деца място .

11. ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОПАКОВКАТА

Срок на годност: три години.

12. ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

27/08/2004

