

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Елицеа 5 mg филмирани таблетки
Елицеа 10 mg филмирани таблетки
Елицеа 20 mg филмирани таблетки
Есциталопрам

Elicea 5 mg film-coated tablets
Elicea 10 mg film-coated tablets
Elicea 20 mg film-coated tablets
Escitalopram

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Виж точка 4.

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Елицеа и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Елицеа
3. Как да приемате Елицеа
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Елицеа
6. Съдържание на опаковката и друга информация

ИЗПИСАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20050434/25/36
Разрешение №	33250-2 / 20-04-2018
Одобрение №/.....

1. Какво представлява Елицеа и за какво се използва

Елицеа съдържа есциталопрам и се използва за лечение на депресия (голям депресивен епизод) и тревожни разстройства (като паническо разстройство с или без агорафобия, социално тревожно разстройство, генерализирано тревожно разстройство и obsесивно-компулсивно разстройство).

Есциталопрам принадлежи към групата антидепресанти, наречени селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (СИОПС). Тези лекарства действат на серотониновата система в мозъка като увеличават нивата на серотонин. Разстройствата на серотониновата система се считат за важен фактор при развитие на депресия и свързани с нея заболявания.

Може да отнеме две седмици, преди да започнете да се чувствате по-добре. Продължавайте да приемате Елицеа, дори ако измине известно време, преди да почувствате подобрение в състоянието си.

Трябва да се консултирате с лекар, ако не се чувствате по-добре или ако се почувствате по-зле.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Елицеа

Не приемайте Елицеа

- Ако сте алергични към есциталопрам или към някое от помощните вещества на това лекарство (изброени в точка 6),



- Ако приемате други лекарства, които принадлежат към групата, наречена МАО инхибитори, включително сележилин (използван за лечение на болест на Parkinson), моклобемид (използван за лечение на депресия) и линезолид (антибиотик).
- ако сте родени с или сте имали епизод на нарушен сърдечен ритъм (наблюдавани при ЕКГ, преглед, при който се оценява как функционира сърцето),
- ако приемате лекарства за проблеми със сърдечния ритъм, или които могат да повлияят ритъма на сърцето (*виж раздел 2 "Други лекарства и Елицеа"*).

Предупреждения и предпазни мерки

Уведомете Вашият лекар или фармацевт, преди започнете да приемате Елицеа.

Моля, уведомете Вашия лекар, ако страдате от каквото и да е друго състояние или заболяване, тъй като Вашият лекар би могъл да го вземе под внимание.

По-специално информирайте Вашия лекар:

- Ако страдате от епилепсия. Вашият лекар ще спре лечението с Елицеа, ако се появят припадъци или се наблюдава повишаване на честотата на припадъците (вижте също точка 4 "Възможни нежелани реакции").
- Ако страдате от нарушена чернодробна или бъбречна функция. Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата Ви.
- Ако имате диабет. Лечението с Елицеа може да промени гликемичния контрол (контрола върху кръвната захар). Може да се наложи корекция на дозата на инсулин и/или пероралните хипогликемични средства.
- Ако имате намалено ниво на натрий в кръвта.
- Ако имате склонност към лесно кървене или получаване на синини.
- Ако сте подложени на електроконвулсивна терапия (лечение с електрошок).
- Ако имате коронарна болест на сърцето.
- Ако страдате или сте страдали от сърдечни проблеми или наскоро сте имали сърдечен пристъп.
- Ако имате забавен сърдечен ритъм при покой и / или знаете, че може би имате по-ниски стойности на соли, като резултат на продължителна тежка диария и повръщане или използване на диуретици (отводняващи таблетки).
- Ако почувствате ускорен или неравномерен сърдечен пулс, прилошаване, колапс или световъртеж при изправяне, което може да показва необичайно функциониране на сърдечния ритъм.
- Ако имате или сте имали проблеми с очите, като определени видове глаукома (повишено налягане в окото).

Моля, имайте предвид

Някои пациенти с манийно депресивно заболяване биха могли да навлязат в манийна фаза. Това се характеризира с необичайни и често променящи се идеи, неадекватно чувство за щастие и прекомерна физическа активност. Ако изпитате подобни усещания, свържете се с Вашия лекар.

Симптоми като безпокойство или трудност да се седи или стои на едно място също могат да се проявят през първите седмици от лечението. Съобщете на Вашия лекар незабавно, ако усетите тези симптоми.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство, понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при тези лекарства е необходимо време за да започнат да действат, обикновено две седмици, но понякога и повече.

Вие може да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:

- ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.



- ако сте млад възрастен. Информацията от клинични проучвания показва повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при млади хора на възраст под 25 години, с психични заболявания, които се лекуват с антидепресанти.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, **свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница.**

Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

Деца и юноши


Елицеа обикновено не трябва да се използва при деца и юноши на възраст под 18 години. Също така е необходимо да знаете, че при приемането на този клас лекарства от пациенти под 18 години, съществува повишен риск от нежелани реакции като опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (преобладаващо агресия, противопоставяне и гняв). Независимо от това, Вашият лекар би могъл да предпише Елицеа на пациенти под 18 годишна възраст тъй като той/тя може да прецени, че това е в техен интерес. Ако Вашият лекар е предписал Елицеа на пациент под 18 години и Вие бихте желали да обсъдите това, моля, срещнете се отново с него. Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако който и да е от симптомите, изброени по-горе, се появи или влоши, когато пациенти под 18 години приемат Елицеа. Също така не са описани дългосрочните ефекти по отношение на безопасността, касаещи растежа, съзряването, когнитивното и поведенческото развитие при прием на Елицеа в тази възрастова група.

Други лекарства и Елицеа

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемате други лекарства.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

- "неселективни инхибитори на моноаминоксидазата (MAO-инхибитори)" (използват се за лечение на депресия), съдържащи фенелзин, ипрониазид, изокарбосизид, ниаламид и транилципромин като активни вещества. Ако сте приемали някое от тези лекарства ще трябва да изчакате 14 дни, преди да започнете да приемате Елицеа. След прекратяване на приема на Елицеа трябва да изчакате 7 дни, преди да започнете да приемате което и да е от тези лекарства.
- "Обратими селективни MAO-A инхибитори", съдържащи моклобемид (използва се за лечение на депресия).
- "Необратими MAO-B инхибитори", съдържащи сележилин (използва се за лечение на болест на Parkinson). Това увеличава риска от нежелани лекарствени реакции.
- Антибиотика линезолид.
- Литий (използва се за лечение на манично-депресивна болест) и триптофан (използва се за лечение на депресия).
- Имипрамин и дезипрамин (двете се използват за лечение на депресия).
- Суматриптан и подобни лекарства (използват се за лечение на мигрена) и трамадол (използва се срещу силна болка). Те увеличават риска от нежелани лекарствени реакции.
- Циметидин, ланзопразол и омепразол (използват се за лечение на стомашна язва), флувоксамин (антидепресант) и тиклопидин (използва се за намаляване на риска от инсулт). Те могат да предизвикат повишаване на кръвните нива на есциталоопрам.
- Жълт кантариан (*Hypericum perforatum*) – растителен продукт, използван при депресия.
- Ацетилсалицилова киселина и нестероидни противовъзпалителни лекарства (лекарства, които се използват за облекчаване на болка или за разреждане на кръвта, така наречените антикоагуланти). Те могат да засилят склонността към кървене.
- Варфарин, дипиридамол и фенпрокумон (лекарства, използвани за разреждане на кръвта, така наречените антикоагуланти). Вашият лекар вероятно ще провери коагулационното време на кръвта Ви, когато започва или прекратява лечението с Елицеа, за да провери дали дозата антикоагулант, която приемате все още е адекватна.



- Мефлокин (използва се за лечение на малария), бупропион (използва се за лечение на депресия) и трамадол (използва се срещу силни болки), поради възможен риск от снижаване на гърчовия праг.
- Невролептици (лекарства за лечение на шизофрения, психози) и антидепресанти (трициклични антидепресанти и SSRIs) поради възможен риск от снижаване на гърчовия праг.
- Флекаинид, пропафенон и метопролол (използват се за лечение на сърдечно-съдови заболявания), клопирамин и нортриптилин (антидепресант) и антидепресанти и рисперидон, тиоридазин и халоперидол (антипсихотици). Може да се наложи дозата на Елицеа да се коригира.
- Лекарства, които да понижат кръвните нива на калий и магнезий, тъй като тези състояния повишават риска от живота-застрашаващи нарушения на сърдечния ритъм.

НЕ ПРИЕМАЙТЕ Елицеа, ако вземате лекарства за проблеми с ритъма на сърцето или лекарства, които могат да повлияят върху ритъма на сърцето, като антиаритмични лекарства клас IA и III, антипсихотици (например фенотиазинови производни, пимозид, халоперидол), трициклични антидепресанти, някои антимикробни агенти (напр. спарфлоксацин, моксифлоксацин, еритромицин IV, пентамидин, или сте на антимальарийно лечение), някои антихистамини (астемизол, мизоластин). Ако имате някакви допълнителни въпроси за това, трябва да говорите с Вашия лекар.

Елицеа с храни и алкохол

Елицеа може да се приема с или без храна (виж точка 3 “Как да приемате Елицеа”).

Както при много лекарства, съчетаването на Елицеа с алкохол не е препоръчително, макар да не се очаква есциталопрам да взаимодейства с алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, ако мислите че може да сте бременна или планирате да имате бебе, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на това лекарство.

Не приемайте Елицеа, ако сте бременна, освен ако не сте обсъдили с Вашия лекар рисковете и ползите, които произтичат от това.

Ако приемате Елицеа през последните 3 месеца от Вашата бременност, необходимо е да знаете, че следните нежелани реакции биха могли да се наблюдават у Вашето новородено: затруднено дишане, синкава кожа, припадъци, промени в телесната температура, затруднения при хране, повръщане, ниска кръвна захар, вдървени или отпуснати мускули, живи рефлексии, тремор, нервност, раздразнителност, летаргия, постоянен плач, сънливост и затруднено заспиване. Ако Вашето новородено бебе има някой от тези симптоми, моля свържете с Вашия лекар незабавно.

Уверете се, че акушерката / или лекарят Ви, знаят, че приемате Елицеа. Когато се приемат по време на бременност, особено в последните 3 месеца на бременността, лекарства като Елицеа могат да увеличат риска от сериозно заболяване при бебето, наречено белодробна хипертония на новороденото (БХН), при което бебето диша по-бързо и посинява. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането на бебето. Ако това се случва на Вашето бебе трябва да се свържете с Вашата акушерка и / или лекар незабавно.

Ако Елицеа се използва по време на бременност, тя никога не трябва да бъде прекъсвана внезапно.

Очаква се, че Елицеа ще се отдели в майчиното мляко.

Не приемайте Елицеа, ако кърмите, освен ако не сте обсъдили с Вашия лекар рисковете и ползите, произтичащи от това.



Циталопрам, лекарство като есциталопрам, е показал редуция на качеството на спермата при проучвания с животни. Теоретично, това може да повлияе фертилитета, но влиянието върху човешкия фертилитет все още не е наблюдавано.

Шофиране и работа с машини

Не се препоръчва да шофирате или да работите с машини, преди да установите как Ви действа Елицеа.

Елицеа съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Елицеа

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, потитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни

Депресия

Обичайната препоръчителна доза Елицеа е 10 mg, приемана веднъж дневно. Дозата може да се повиши от Вашия лекар до максимално 20 mg дневно.

Паническо разстройство

Началната доза Елицеа е 5 mg веднъж дневно през първата седмица, преди дозата да се повиши на 10 mg дневно. Вашият лекар може да увеличи максимално дозата до 20 mg дневно.

Социално тревожно разстройство

Обичайно препоръчваната доза на Елицеа е 10 mg, приемана като еднократна доза. В зависимост от това как реагирате на лечението с това лекарство, Вашият лекар може да намали дозата Ви до 5 mg или да я повиши максимално до 20 mg дневно.

Генерализирано тревожно разстройство

Обичайно препоръчваната доза на Елицеа е 10 mg, приемана веднъж дневно. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар максимално до 20 mg дневно.

Обсесивно-компулсивно разстройство

Обичайната препоръчвана доза на Елицеа е 10 mg еднократно дневно. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар максимално до 20 mg дневно.

Пациенти в старческа възраст (над 65 годишна възраст)

Препоръчваната начална доза на Елицеа е 5 mg еднократно дневно. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до 10 mg дневно.

Употреба при деца и юноши

Обикновено Елицеа не трябва да се дава на деца или юноши. За допълнителна информация, моля вижте точка 2 "Какво трябва да знаете, преди да приемете Елицеа".

Начин и метод на приложение


Може да приемате Елицеа с или без храна. Погълчайте таблетките с малко вода. Не ги дъвчете, тъй като имат горчив вкус.

Таблетки 10 mg и 20 mg: Таблетката може да се дели на две равни дози.

Продължителност на лечението

Могат да минат няколко седмици, преди да почувствате подобрене. Продължете да приемате Елицеа, дори и ако мине известно време, преди да почувствате подобрене в състоянието си.

Никога не променяйте дозата, преди да сте разговаряли за това с Вашия лекар.



Продължавайте да приемате Елицеа толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар. Ако прекъснете лечението твърде рано, симптомите могат да се появят отново. Препоръчва се лечението да продължи поне 6 месеца след като отново се почувствате добре.

Ако сте приели повече от необходимата доза Елицеа

Ако сте приели повече от предписаната Ви доза Елицеа, свържете се незабавно с Вашия лекар или най-близкия център за спешна медицинска помощ. Направете това дори, ако нямате признаци на дискомфорт. Някои от признаците на предозиране могат да бъдат замаяност, тремор, възбуда, конвулсии (гърчове) и кома, гадене, повръщане, промяна на сърдечния ритъм, намалено кръвно налягане и нарушаване на електролитно-соления баланс, Вземете с Вас опаковката Елицеа, за да я покажете на лекаря или в болницата.

Ако сте пропуснали да приемете Елицеа

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако пропуснете да вземете своята доза и се сетите за това, преди да легнете, незабавно я вземете. На другия ден продължете да приемате дозата си както обикновено. В случай, че се сетите за пропуснатата доза през нощта или на следващия ден, не приемйте дозата, а след това продължете както обикновено.

Ако сте спрели приема на Елицеа

Не спирайте приема на Елицеа докато Вашият лекар не Ви каже да го направите. Когато завършите курса на лечение, обикновено се препоръчва дозата на Елицеа да се намали постепенно в продължение на няколко седмици.

Когато спрете да приемате Елицеа, особено ако това стане внезапно, възможно е да почувствате симптоми на отнемане. Те са обичайни при спирането на лечението с Елицеа. Рискът от това е по-голям, когато Елицеа е бил употребяван за по-дълго време или в по-високи дози, или когато дозата бъде намалена твърде бързо. Повечето хора намират тези симптоми за леки и самозатихващи в рамките на две седмици. Въпреки това при някои пациенти те могат да са тежки по интензивност или по-продължителни (2-3 месеца или повече). Ако изпитате тежки симптоми на отнемане, когато прекратите приема на Елицеа, моля свържете се с Вашия лекар. Той или тя може да поиска от Вас да започнете отново да приемате Вашите таблетки и да ги спрете по-бавно.

Симптомите на отнемане включват: усещане за замаяност (нестабилност или загуба на равновесие), усещания за иглички, усещане за парене и (по-рядко) за удар от електрически ток, включително в главата, смущения на съня (прекомерно ярки сънища, кошмари, невъзможност да се спи), усещане за безпокойство, главоболие, повдигане (гадене), потене (включително нощно изпотяване), усещане за нервност и възбуда, тремор (треперене), усещане за обърканост и дезориентация, свръхемоционалност или раздразнителност, диария (редки изпражнения), визуални смущения, колебливо или ускорено сърцебиене (палпитации).


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции най-често отзвучават след няколко седмици лечение. Моля да имате предвид, че някои от реакциите могат да бъдат също така симптоми на Вашето заболяване и поради това да изчезнат, когато започнете да се подобрявате.

Ако развиете някой от следните симптоми, Ви трябва да се свържете с Вашия лекар или незабавно да отидете в болница:



Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека):

- Необичайно кървене, включително от стомашно-чревния тракт

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека):

- Подуване на кожата, езика, устните или лицето или имате затруднения при дишане или преглъщане (алергична реакция).
- Висока температура, кинетично неспокойствие (възбуда), обърканост, треперене и внезапни свивания на мускулите, това могат да бъдат признаци на рядкото състояние, наречено серотонинов синдром.

С неизвестна честота (не може да се предвиди от наличните данни):

- Трудности при уриниране
- Припадъци (пристъпи), виж също точка „Предпазни мерки и предупреждения“
- Пожълтяване на кожата и бялото на очите са признаци на увреждане на чернодробната функция/хепатит
- Учестен, неравномерен сърдечен ритъм, припадъци, които могат да бъдат симптоми на живота-застрашаващо състояние, известно като Torsades de Pointes
- Мисли за самонараняване или самоубийство, виж също точка "Предупреждения и предпазни мерки"

В допълнение към горното, има съобщения и за следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека):

- Повдигане (гадене)
- Главоболие


Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека):

- Запушен нос или секреция от носа (синусит)
- Намален или увеличен апетит
- Тревога, безпокойство, необичайни сънища, трудности при заспиване, чувство на сънливост, замаяност, прозяване, тремор, настръхване на кожата
- Диария, запек, повръщане, сухота в устата
- Увеличено потене
- Болка в мускулите и ставите (артралгия и миалгия)
- Сексуални смущения (забавена еякулация, проблеми с ерекцията, намалено сексуално желание, жените могат да изпитват трудности при достигане на оргазъм)
- Умора, треска
- Увеличено тегло

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека):

- Копривна треска (уртикария), обрив, сърбеж (пруритус)
- Скърцане със зъби, кинетично безпокойство (възбуда), нервност, панически пристъп, обърканост
- Смущения на съня, вкусови аномалии, припадъци (синкоп)
- Разширени зеници (мидриаза), визуални смущения, шум в ушите (тинитус)
- Загуба на коса
- Обилно вагинално кървене
- Нередовна менструация
- Намалено тегло
- Ускорен сърдечен ритъм
- Отоци по ръцете или краката
- Кървене от носа

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека):



- Агресия, деперсонализация, халюцинации
- Бавен сърдечен ритъм

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

- Намалени нива на натрий в кръвта (симптомите са чувство на гадене и дискомфорт с мускулна слабост или обърканост)
- Замайване при изправяне поради ниско кръвно налягане (ортостатична хипотензия)
- Абнормни стойности на чернодробния функционален тест (повишени стойности на чернодробните ензими в кръвта)
- Двигателни разстройства (несъзнателни движения на мускулите)
- Болезнени ерекции (приапизъм)
- Разстройства, свързани с кръвене, включително от кожата и лигавиците екхимоза)
- Внезапно подуване на кожата и лигавиците (ангиоедем)
- Увеличаване на количеството на екскретираната урина (неадекватна секреция на антидиуретичен хормон)
- Изтичане на мляко от гърдите на мъже и жени, които не кърмят
- Мания
- Промяна в ритъма на сърцето (наричана "удължен QT интервал", наблюдавана при ЕКГ, електрическа активност на сърцето)

В допълнение, известни са определен брой нежелани реакции, за които е известно, че възникват при лекарства, действащи по сходен на есциталопрам начин. Те са:

- Моторно безпокойство (невъзможност да се стои в покой без движение (акатизия))
- Загуба на апетит (анорексия)

Наблюдава се повишен риск от фрактури на костите при пациенти, приемащи този тип лекарства.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Елицеа

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност се отнася до последния ден от месеца.

Този лекарство не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация



Какво съдържа Елицеа

- Активното вещество е есциталопрам (*escitalopram*). Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg, 10 mg или 20 mg есциталопрам (като 6,39 mg, 12,78 mg или 25,56 mg есциталопрам оксалат (*escitalopram oxalate*)).
- Другите съставки са: лактоза монохидрат, кросповидон, повидон, микрокристална целулоза, прежелатинизирано царевично нишесте и магнезиев стеарат в ядрото на таблетката и хипромелоза, титанов диоксид (E171), лактоза монохидрат, макрогол 3000 и триацетин във филмовото покритие (виж точка 2).

Как изглежда Елицеа и какво съдържа опаковката

5 mg таблетки: бели, кръгли, двойно изпъкнали филмирани таблетки със скосени ръбове.

10 mg и 20 mg таблетки: бели, овални, двойно изпъкнали филмирани таблетки, с делителна черта от едната страна. Таблетката може да се дели на две равни части.

Елицеа филмирани таблетки се предлагат в кутии с по 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 и 200 таблетки в блистери и 250 таблетки в контейнер за таблетки (HDPE).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИП със следните имена:

Име на страна членка	Име на лекарствения продукт
Чехия CZ	Elicea
Словения SI	Elicea
Полша PL	Elicea
Словакия SK	Elicea
България BG	Елицеа
Унгария HU	Elicea
Латвия LV	Elicea
Литва LT	Elicea
Естония EE	Elicea
Австрия AT	Escitalopram Krka

Дата на последна актуализация на листовката:

