

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Азатрил 250 mg твърди капсули
Azatril 250 mg capsules, hard

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1
Към Рев. № 9900192
Разрешение № RG/ЛНЛ/ЛР-6692
Одобрение № 19-03-2019

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 250 mg азитромицин (*azithromycin*) (като дихидрат).

Помощни вещества с известно действие: лактоза и пшенично нишесте.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Твърди цилиндрични желатинови капсули с розов цвят

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Азатрил е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към антибиотика микроорганизми със следната локализация:

- горни дихателни пътища – като алтернатива на пеницилинова терапия при остри тонзилофарингити, синузити и отити на средното ухо;
- долни дихателни пътища – бактериални бронхити и пневмонии (лека и средно тежка форма), атипични пневмонии, ХОББ в стадий на екзацербация;
- кожа и меки тъкани – еризипел, импетиго и вторична пиодермия, *erythema chronicum migrans*;
- сексуално-трансмисивни заболявания – неусложнени уретрити и цервицити, причинени от *Chlamidia trachomatis*, гонококови уретрити и цервицити;
- язвена болест и хронични гастродуоденити, за ерадикация на *Helicobacter pylori*.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

- Инфекции на горните и долни дихателни пътища и инфекции на кожата и меките тъкани (с изключение на *erythema migrans*) – 500 mg еднократно дневно в продължение на 3 последователни дни;
- Пневмонии – 500 mg еднократно дневно в продължение на 3 последователни дни или 500 mg еднократно в първия ден на лечението и по 250 mg дневно от втори до пети ден включително;
- Erythema migrans - общ курсова доза 3 g; 1 g еднократно дневно в първия ден на лечението; от втори до пети ден включително се прилага еднократна дневна доза от 500 mg;
- Инфекции, предавани по полов път – еднократна дневна и курсова доза 1 g при негонококови уретрити и цервицити, причинени от *Chlamidia trachomatis*.



- предизвикани от *Haemophilus ducreyi*; при гонококови уретрити и цервицити – еднократна дневна и курсова доза – 2 g;
- **Язвена болест и хронични гастродуоденити за ерадикация на *Helicobacter pylori*** – 1 g еднократно дневно в продължение на 3 дни в комплексна терапия с амоксицилин 1 g два пъти дневно или метронидазол 500 mg два пъти дневно в продължение на 7 дни и омепразол 20 mg два пъти дневно или други блокери на протонната помпа, в съответната дозировка, в продължение на 7 дни.

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата при пациенти с леко до умерено изразено увреждане на бъбречната функция (GFR 10-80 ml/min). Необходимо е повишено внимание, когато азитромицин се прилага при пациенти с тежко увредена бъбречна функция (GFR <10 ml/min) (вж. точка 4.4).

Чернодробно увреждане

Поради това, че азитромицин се метаболизира в черния дроб и се екскретира в жълчката, той трябва да се прилага внимателно при пациенти, страдащи от тежки чернодробни заболявания. Не са провеждани проучвания относно приложението на азитромицин при такива пациенти.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст се използва същата доза, като при възрастни пациенти. Тъй като пациентите в старческа възраст могат да имат съпътстващи проаритмични състояния се препоръчва повишено внимание, поради рисък от развитие на сърдечна аритмия и torsades de pointes (вж. точка 4.4).

Начин на приложение

Перорално приложение

Азитромицин трябва да се прилага като еднократна дневна доза, перорално. Като повечето други антибиотици той трябва да се приема поне 1 час преди или 2 часа след хранене.

4.3 Противопоказания

Употребата на Азатрил е противопоказана при пациенти със свръхчувствителност към азитромицин, еритромицин, към други макролидни или кетолидни антибиотици или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Както с еритромицин и другите макролиди, така и след приложение на азитромицин в редки случаи са докладвани сериозни алергични реакции, включващи ангионевротичен едем и анафилаксия (рядко фатална), тежки кожни нежелани реакции (SCAR), включително остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP). Някои от тези реакции водят до рецидивиране на симптомите и изискват по-дълъг период на наблюдение и лечение.

Тъй като черният дроб е основният път за елиминиране на азитромицин, азитромицин трябва да се прилага внимателно при пациенти, страдащи от значими чернодробни заболявания. Съществуват съобщения за случаи на фулминантен хепатит с потенциален рисък от развитие на животозастрашаваща чернодробна недостатъчност след приложение на азитромицин (вж. точка 4.8). Възможно е някои от тези пациенти да са имали съществуващо чернодробно увреждане или да са приемали други хепатотоксични лекарствени продукти.

При признания и симптоми на чернодробна дисфункция, като бързо развиваща се астения, придружена от жълтеница, потъмняване на урината, склонност към кървене или чернодробна енцефалопатия, незабавно трябва да се проведат тестове/изследвания на чернодробната



функция. Ако се установи тежка чернодробна дисфункция, приложението на азитромицин трябва да се преустанови.

При пациенти, получаващи ерго-производни, по-бързо се проявява ерготизъм при едновременно приложение с някои макролидни антибиотици. Няма данни относно вероятността за взаимодействие между ерготаминови производни и азитромицин. Въпреки това, поради теоретичната възможност за ерготизъм, азитромицин и ерго-производни не трябва да се прилагат едновременно.

Както при всички антибиотици, е необходимо наблюдение за признания на суперинфекција с нечувствителни микроорганизми, включително гъбички.

Диария, свързана с *Clostridium difficile* (CDAD) е наблюдавана след прилагане на всички видове антибиотици, включително азитромицин и може да бъде умерено до тежко изразена, вкл. до фатални колити. Лечението с антибактериални продукти променя нормалната чревна флора и води до свръхрастеж на *Clostridium difficile*.

Clostridium difficile произвежда токсини A и B, които водят до развитие на CDAD. Щамове на *Clostridium difficile* със свръхпродукция на токсини могат да повишат заболеваемостта и смъртността, тъй като тези инфекции могат да бъдат рефрактерни на антимикробна терапия и да изискват колектомия. При всички пациенти, при които се наблюдава диария след употреба на антибиотици трябва да се има предвид CDAD. Изиска се внимателно събиране на анамнеза, тъй като в някои случаи CDAD се наблюдава след период, по-дълъг от два месеца след прекратяване на лечението с антибактериалния продукт.

При пациенти с тежко бъбречно нарушение ($GFR < 10 \text{ ml/min}$) се наблюдава 33% повишенна системна експозиция на азитромицин.

При лечение с други макролиди, както и с азитромицин са наблюдавани удължени сърдечна реполяризация и QT-интервал, свързани с риск от развитие на сърдечна аритмия и torsades de pointes (вж. точка 4.8). Тъй като тези ситуации могат да повишат риска от камерни аритмии (включително torsades de pointes), които водят до сърдечен арест азитромицин трябва да се прилага с внимание на пациенти със съществуващи проаритмични състояния (особено при жени и пациенти в старческа възраст), като например пациенти с:

- с вродено или установено удължаване на QT-интервала
- на едновременно лечение с други активни вещества, за които е известно, че удължават QT-интервала, като антиаритмици клас Ia (хинидин и прокаинамид) и клас III (дофетилид, амиодарон и сotalол), цизаприд и терфенадин; антипсихотици, като пимозид; антидепресанти, като циталопрам и флуорохинолони, като моксифлоксацин и левофлоксацин
- с електролитни нарушения, практически в случаите на хипокалиемия и хипомагнезиемия
- с клинично релевантна брадикардия, сърдечна аритмия или тежка сърдечна недостатъчност

При пациенти на терапия с азитромицин е наблюдавана нова поява на миастеничен синдром или обостряне на симптомите на миастения гравис (вж. точка 4.8).

При деца не е установена безопасността и ефикасността за профилактика и лечение на *Mycobacterium avium Complex* (MAC).

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.



Продуктът съдържа пшенично нишесте. Пшеничното нишесте в този лекарствен продукт съдържа само много малки количества глутен (счита се че не съдържа глутен) и е малко вероятно да предизвика проблеми при пациенти с цълиакия. Една капсула съдържа не повече от 5 микрограма глутен. Пациенти с алергия към пшеница (различна от цълиакия) не трябва да взимат този продукт.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Антиациди

При едновременно прилагане на антиациди и азитромицин във фармакокинетични проучвания, е установено че общата бионаличност не се повлиява, въпреки че максималните плазмени концентрации на азитромицин са понижени с приблизително 25%. При пациенти, които приемат азитромицин и антиациди, двата лекарствени продукта не трябва да се приемат едновременно. Едновременното приложение на азитромицин гранули с удължено освобождаване за перорална суспензия с еднократна доза ко-магалдрокс 20 ml (алуминиев хидроксид и магнезиев хидроксид) не оказва влияние върху скоростта и степента на абсорбция на азитромицин.

Цетиризин

При здрави доброволци при едновременното приложение на азитромицин в продължение на 5 дни заедно с 20 mg цетиризин в стационарно състояние не са наблюдавани фармакокинетични взаимодействия и статистически значимо удължаване на QT-интервала.

Диданозин (дидеоксиинозин)

При 6 HIV-позитивни пациента след едновременно приложение на азитромицин 1 200 mg дневно с диданозин 400 mg дневно не се наблюдава повлияване на фармакокинетиката на диданозин в стационарно състояние, сравнено с плацебо.

Дигоксин и колхицин (P-gp субстрати)

Съществуват съобщения, че едновременното приложение на макролидни антибиотици, включително азитромицин, със субстрати на P-гликопротеин, като дигоксин и колхицин, води до повишаване на серумните концентрации на P-гликопротеин субстрата. Ето защо, ако азитромицин и субстрати на P-gp, като дигоксин се прилагат едновременно, трябва да се има предвид възможността за повишени серумни концентрации на субстрата.

Зидовудин

Еднократни дози от 1 000 mg и многократни дози от 1 200 mg или 600 mg азитромицин оказват слаб ефект върху плазмената фармакокинетика или екскрецията с урината на зидовудин или на неговия глюкурониран метаболит. Приложението на азитромицин, обаче повишава концентрацията на фосфорилирания зидовудин, клинично активния метаболит, в периферните мононуклеарни кръвни клетки. Клиничното значение на тази находка е неясно, но е възможно това да е от полза за пациентите.

Азитромицин не взаимодейства значимо с цитохром P-450 чернодробната система. При него не се наблюдават фармакокинетични взаимодействия, характерни за еритромицин и други макролиди. При азитромицин не се наблюдава чернодробна цитохром P-450 индукция или инактивация чрез цитохром-метаболитния комплекс.

Ерготаминови деривати

Поради теоретична възможност за развитие на ерготизъм, едновременното приложение на азитромицин и ерготаминови деривати не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Проведени са фармакокинетични взаимодействия между азитромицин и следните лекарствени вещества, за които е известно, че подлежат на значим цитохром P-450 медиран метаболизъм:

Аторвастатин



При едновременно приложение на аторвастатин (10 mg дневно) и азитромицин (500 mg дневно) не се повлиява плазмената концентрация на аторвастатин (определен чрез HMG CoA – редуктазно инхибиране). Въпреки това са съобщавани постмаркетингови случаи на рабдомиолиза при пациенти, приемащи азитромицин едновременно със статини.

Карбамазепин

Във фармакокинетично изследване при здрави доброволци не са наблюдавани сигнификантни ефекти върху плазмените концентрации на карбамазепин или на неговия активен метаболит при пациенти, приемащи едновременно азитромицин.

Циметидин

Във фармакокинетично изследване, изследващо ефекта на еднократна доза циметидин, приложена 2 часа преди азитромицин не се наблюдава влияние върху фармакокинетиката на азитромицин.

Перорални антикоагуланти от кумаринов тип

В проучване за фармакокинетично взаимодействие азитромицин не води до промени на антикоагулантния ефект на еднократна доза варфарин 15 mg, приложена при здрави доброволци. През постмаркетинговия период са получени съобщения за засилена антикоагулация след едновременно приложение на азитромицин и антикоагуланти от кумаринов тип. Въпреки че не е установена причинно-следствена връзка, необходимо е да се има предвид по-често мониториране на протромбиновото време, когато азитромицин се прилага при пациенти, получаващи антикоагуланти от кумаринов тип.

Циклоспорин

Във фармакокинетично проучване при здрави доброволци, при които е приложена перорална доза от 500 mg дневно азитромицин в продължение на 3 дни, последвана от еднократна перорална доза циклоспорин 10 mg/kg, е установено, че получените C_{max} и AUC_{0-5} на циклоспорин са сигнификантно повишени. Следователно е необходимо внимание преди да се приеме съпътстващо приложение на тези лекарства. Ако е необходимо едновременното им приложение, стойностите на циклоспорин трябва да бъдат мониторирани и дозата трябва да се коригира съответно.

Ефавиренц

При едновременно приложение на азитромицин в еднократна доза от 600 mg и ефавиренц 400 mg дневно в продължение на 7 дни не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични взаимодействия.

Флуконазол

Едновременното приложение на еднократна доза от 1 200 mg азитромицин не оказва влияние върху фармакокинетиката на еднократна доза флуконазол 800 mg. Общата експозиция и полуживотът на азитромицин остават непроменени при едновременно приложение с флуконазол, въпреки че се наблюдава клинично несигнификантно понижаване на стойностите на C_{max} (18%) на азитромицин.

Индинаvir

Азитромицин, приложен в еднократна доза от 1 200 mg едновременно с индинавир в доза от 800 mg 3 пъти дневно в продължение на 5 дни не оказва влияние на фармакокинетиката на индинавир.

Метилпреднизолон

В проучване за фармакокинетично взаимодействие при здрави доброволци, азитромицин не оказва съществен ефект върху фармакокинетиката на метилпреднизолон.

Мидазолам



При здрави доброволци азитромицин, приложен в дневна доза от 500 mg в продължение на три дни не променя значимо клиничната фармакокинетика и фармакодинамиката на мидазолам, приложен еднократно в доза от 15 mg.

Нелфинавир

Едновременното приложение на азитромицин (1 200 mg) и нелфинавир в стационарно състояние (750 mg три пъти дневно) води до повишени концентрации на азитромицин. Не са наблюдавани клинично значими нежелани лекарствени реакции и не се изисква корекция на дозата.

Рифабутин

Едновременно приложение на азитромицин и рифабутин не повлиява серумните концентрации и на двете лекарства.

Наблюдавана е неутропения при лица, получаващи съществаща терапия с азитромицин и рифабутин. Въпреки, че неутропенията е асоциирана с приложението на рифабутин, не е установена причинно-следствена връзка с комбинацията с азитромицин (вж. точка 4.8).

Силденафил

При здрави мъже доброволци няма данни за повлияване на AUC и C_{max} на силденафил и основния му циркулиращ метаболит след прилагане на азитромицин (в дневна доза от 500 mg в продължение на 3 дни).

Терфенадин

От фармакокинетични проучвания няма данни за взаимодействие между азитромицин и терфенадин. Съобщавани са редки случаи, където вероятността за подобно взаимодействие не може да бъде напълно изключена; въпреки това няма специфични данни, че подобни взаимодействия могат да се наблюдават.

Теофилин

При здрави доброволци няма данни за клинично значими фармакокинетични взаимодействия между азитромицин и теофилин.

Триазолам

При 14 здрави доброволци едновременното прилагане на азитромицин 500 mg през първия ден и 250 mg през втория ден заедно с 0,125 mg триазолам на ден втори не са наблюдавани вариации на нито един от фармакокинетичните параметри на триазолам сравнено с триазолам и плацебо.

Триметоприм/сулфаметоксазол

Едновременното приложение на триметоприм/сулфаметоксазол DS (160 mg/800 mg) в продължение на 7 дни с азитромицин 1 200 mg на ден 7 не повлиява значимо максималната плазмена концентрация, общата експозиция или уринната екскреция нито на триметоприм, нито на сулфаметоксазол. Плазмените концентрации на азитромицин са като тези, наблюдавани в други проучвания.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма адекватни данни от употребата на азитромицин при бремennи жени. В проучвания за токсичност върху репродукцията, проведени върху животни е установено, че азитромицин преминава през плацентата, но не са наблюдавани тератогенни ефекти. Безопасността от употребата на активното вещество азитромицин по време на бременност не е установена, поради което по време на бременност азитромицин трябва да се употребява само, ако нейната надвишава риска.



Кърмене

Съобщава се, че азитромицин се секретира в майчиното мляко, но няма адекватни и добре контролирани проучвания при кърмачки, които характеризират фармакокинетиката на екскрецията на азитромицин в кърмата при хора.

Фертилит

В проучвания за фертилитет, проведени върху плъхове са наблюдавани по-малко бременностни след прилагане на азитромицин. Значението на тези данни при хора е неизвестно.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини


Няма доказателства, които да показват че азитромицин може да окаже влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

В таблицата по-долу са причислени нежеланите лекарствени реакции, установени по време на клинични проучвания и от постмаркетинговото наблюдение, подредени по системо-органи класове и по честота. Нежеланите лекарствени реакции от постмаркетинговото наблюдение са изписани в курсив. Честотата е групирана според следната конвенция: много чести ($\geq 1/10$); чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$); редки ($\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$); много редки ($< 1/10\,000$), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране по честота нежеланите лекарствени реакции са изброени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нежелани лекарствени реакции възможно или вероятно свързани с азитромицин, класифицирани въз основа на опита от клиничните проучвания и постмаркетинговото наблюдение

Системо-органи класове	Много чести	Чести	Нечести	Редки	С неизвестна честота
	> 1/10	$\geq 1/100$ до $< 1/10$	$\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$	$\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$	
Инфекции и инфекстации			Кандидоза, орална кандидоза, вагинални инфекции, пневмония, инфекции, причинени от гъбички, бактериални инфекции, фарингит, гастроентерит, респираторни нарушения, ринит		Псевдомемброзен колит (вж. точка 4.4)
Нарушения на кръвта и лимфната система			Левкопения, неутропения, еозинофилия		Тромбоцитопения, хемолитична анемия
Нарушения на имунната система			Ангиоедем, свръхчувствителност		Анафилактични реакции (вж. точка 4.4)
Нарушения на метаболизма и храненето			Анорексия		
Психични нарушения			Нервност, безсъние	Възбуда	
Нарушения на нервната		Главоболие	Замаяност, сънливост, парестезия, дисгезия		Адресия, безплокожество, демарум, амнезия, хипосстезия, сънкот, залеписъз.



Системо-органини класове	Mного чести	Чести	Нечести	Редки	С неизвестна честота
	> 1/10	$\geq 1/100$ до $< 1/10$	$\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$	$\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$	
система					<i>психомоторна съръхактивност, аносмия, агузия, паросмия, Миастения гравис (вж. точка 4.4)</i>
Нарушения на очите			Визуални нарушения		
Нарушения на ухото и лабиринта			Нарушения на ухoto, Вертиго		Увреждане на слуха, включително глухота и/или шум в ушите
Сърдечни нарушения			Палпитации		<i>Torsades de pointes (вж. точка 4.4), аритмия (вж. точка 4.4), еключително камерна тахикардия. Удължен QT интервал на електрокардиограмата (вж. точка 4.4)</i>
Съдови нарушения			Горещи вълни		Хипотония
Респираторни, гръден и медиастинални нарушения			Диспнея, Епистаксис		
Стомашно-чревни нарушения	Диария	Повръщане, болка в областта на корема, гадене	Запек, флатуленция, диспесия, гастрит, дисфагия, абдоминална дистензия, сухота в устата, еруктация, изязвяване в устата, повишено слюноотделение		Панкреатит, промяна в цвета на езика
Хепато-билиарни нарушения				Отклонения в чернодробната функция, холестатична жълтеница	Чернодробна недостатъчност (която в редки случаи води до смърт) (вж. точка 4.4), фулминантен хепатит, чернодробна некроза,
Нарушения на кожата и подкожната тъкан			Обрив, сърбеж, уртикария, дерматит, суха кожа, хиперхидроза	Реакции на фоточувствителност	Синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некроза, еритема майлърикс (Лекарства за Лекарства)



Системо-органини класове	Много чести	Чести	Нечести	Редки	С неизвестна честота
	> 1/10	$\geq 1/100$ до $< 1/10$	$\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$	$\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$	
					реакция с еозинофилия и системни симптоми), остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP)
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан			Остеоартрит, миалгия, болка в областта на гърба, болка във врата		Артракгия
Нарушения на бъбреците и никочните пътища			Дизурия, болка в бъбреците		Остра бъбречна недостатъчност, интерстициален нефрит
Нарушения на репродуктивната система и гърдата			Метрорагия, увреждане на тестисите		
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение			Умора, оток на лицето, болка в областта на гърдите, пиексия, периферен оток, оток, неразположение, астения		
Изследвания		Понижен брой лимфоцити, повишен брой еозинофили, понижени стойности на бикарбонати в кръвта, повишен брой базофили, повишен брой моноцити, повишен брой неутрофили	Повишени стойности на аспартат аминотрансферазата, повишени стойности на аланин аминотрансферазата, повишени стойности на билирубин в кръвта, повишени стойности на ureята в кръвта, повищени стойности на креатинин в кръвта, отклонения в стойностите на калий, повищени стойности на алкалната фосфатаза в кръвта, повищени стойности на хлор, повищена глюкоза, повишен брой тромбоцити, понижен хематокрит, повищени бикарбонати, отклонения в стойностите на натрий		
Наранявания и отравяния			Усложнения след процедурата		

Нежелани реакции, възможно или вероятно свързани с профилактика и лечение на инфекцията по лекарствата *Mycobacterium avium Complex* въз основа на опита от клиничните изпитвания и постмаркетинговото наблюдение. Тези нежелани реакции се различават от съобщените съвместно със формите за незабавно освобождаване или с удължено освобождаване по вид или по честота:



Системо-органини класове	Много чести $\geq 1/10$	Чести $\geq 1/100$ до $< 1/10$	Нечести $\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$
Нарушения на метаболизма и храненето		Анорексия	
Нарушения на нервната система		Замаяност, главоболие, парестезия, дисгеузия	Хипоестезия
Нарушения на очите		Визуални нарушения	
Нарушения на ухото и лабиринта		Глухота	Увреждане на слуха, шум в ушите
Сърдечни нарушения			Палпитации
Стомашно-чревни нарушения	Диария, болка в областта на корема, гадене, абдоминален дискомфорт, флатуленция, воднисти изпражнения		
Хепатобилиарни нарушения			Хепатит
Нарушения на кожата и подкожната тъкан		Обрив, сърбеж	Реакции на фоточувствителност, синдром на Стивънс-Джонсън
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан		Артракгия	
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение		Умора	Неразположение, астения

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

4.9 Предозиране

Нежеланите събития, наблюдавани при по-високи от препоръчителните дози, са подобни на тези при нормални дози. При предозиране е необходимо прилагане на общи симптоматични и поддържащи средства.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства



Фармакотерапевтична група: Макролиди, линкозамиди и стрептограмини, Макролиди, ATC код: J01FA10

Механизъм на действие

Азитромицин е макролиден антибиотик от групата на азалидите. Химически се получава чрез прибавяне на азотен атом в лактонния пръстен на еритромицин А. Неговото химично име е 9-deoxy-9a-аза-9a-метил-1-9a-хомоеритромицин А. Молекулната му маса е 749,0. Той потиска синтеза на протеини в бактериалната клетка чрез свързване с рибозомните 50S субединици и инхибиране на пептидната транслокация.

Механизъм на резистентност

Резистентността към азитромицин може да бъде вродена или придобита. Има три основни механизма на резистентност при бактериите: увреждане на таргетната зона, увреждане на антибиотичния транспорт и модифициране на антибиотика.

Пълна кръстосана резистентност съществува между *Streptococcus pneumoniae*, бета хемолитични стрептококки от група A, *Enterococcus faecalis* и *Staphylococcus aureus*, включително метицилин резистентен *S. aureus* (MRSA) към еритромицин, азитромицин, други макролиди и линкозамиди.

Граници на чувствителност

Границите на чувствителност към азитромицин за типичните бактериални патогени съгласно NCCLS са:

- Чувствителни (S) ≤ 2 mg/l; резистентни (R) ≥ 8 mg/l.
- *Haemophilus* spp.: чувствителни (S) ≤ 4 mg/l.
- *Streptococcus pneumoniae* and *Streptococcus pyogenes*: чувствителни (S) ≤ 0,5 mg/l; резистентни (R) ≥ 2 mg/l.

Чувствителност

Преобладаването на придобитата резистентност може да варира географски и във времето за определени щамове, поради което е желателно ползването на локалните данни, особено при третиране на тежки инфекции. При необходимост, трябва да се потърси експертен съвет, когато локалната преобладаваща резистентност е такава, че ползата от медикамента поне при няколко типа инфекции е дискутиабилна.

Таблица: Антибактериален спектър на азитромицин.

Обичайно чувствителни щамове
Gram положителни аероби
<i>Staphylococcus aureus</i> Methicillin-чувствителни
<i>Streptococcus pneumoniae</i> Penicillin-чувствителни
<i>Streptococcus pyogenes</i> (Group A)
Gram отрицателни аероби
<i>Haemophilus influenzae</i> <i>Haemophilus parainfluenzae</i>
<i>Legionella pneumophila</i>
<i>Moraxella catarrhalis</i>
<i>Pasteurella multocida</i>



Анаеробни микроорганизми
<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Fusobacterium spp.</i>
<i>Prevotella spp.</i>
<i>Porphyromonas spp.</i>
Други микроорганизми
<i>Chlamydia trachomatis</i>
Микроорганизми, при които придобитата резистентност може да е проблем
Gram положителни аероби
<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Penicillin-междинни
Penicillin-резистентни
Вродено резистентни организми
Gram положителни аероби
<i>Enterococcus faecalis</i>
Staphylococci MRSA, MRSE *
Анаеробни микроорганизми
<i>Bacteroides fragilis group</i>

* При метицилин резистентните стафилококки се наблюдава високо преобладаване на придобита резистентност към макролиди и са поставени тук, защото те рядко са чувствителни към азитромицин.

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Бионаличността след перорален прием е около 37%. Максимални плазмени концентрации се постигат 2-3 часа след приема на продукта.

Разпределение

Перорално приетият азитромицин се разпределя значително в цялото тяло в резултат на висока степен на тъканно проникване. Във фармакокинетични проучвания е установено, че измерените концентрации на азитромицин в тъканите са отчетливо по-високи (до 50 пъти) от тези измерени в плазмата, което показва значително тъканно свързване.

Свързването с плазмените протеини варира в зависимост от плазмената концентрация и се движи от 12% при 0,5 µg/ml до 52% при 0,05 µg/ml азитромицин/ml плазма. Средният обем на разпределение при равновесни концентрации (V_{ss}) е 31,1 l/kg.

В проучвания при животни са установени високи концентрации на азитромицин във фагоцитите. Установено е също, че по време на активната фагоцитоза, по-високи концентрации на азитромицин се освобождават от неактивните фагоцити. В животински модели това води до осигуряване на високи концентрации на азитромицин в инфицираната област.

Елиминиране

Терминалният плазмен полуживот напълно отразява елиминационния полуживот от тъканите 2-4 дни.



Около 12 % от интравенозно приложения азитромицин се екскретира с урината в рамките на 3 дни. Особено високи концентрации от непроменен азитромицин са открити в човешката жълчка. В жълчката са открити също така и десет метаболита, които са получени чрез N- и O-деметилиране, хидроксилиране на дезосаминовите и агликоновите пръстени и разцепване на кладинозния конюгат. Сравнението на течнохроматографските резултати и микробиологичните анализи показват, че метаболитите на азитромицин не са микробиологично активни.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Наблюдавана е фосфолипидоза (интрацелуларно натрупване на фосфолипиди в някои тъкани (напр. око, ганглии на задното коренче, черен дроб, жълчен мехур, бъбрец, далак и/или панкреас) при мишки, пълхове и кучета, на които са прилагани многократни дози азитромицин. Фосфолипидоза е била наблюдавана в подобен размер и в тъканите на новородени пълхове и кучета. Ефектът се е окказал обратим след прекратяване на лечението с азитромицин. Значението на тези находки за животните и хората е неизвестно.

Карциногенен потенциал

Не са провеждани дългосрочни проучвания при животни за оценка на карциногения потенциал, тъй като медикаментът е показан само за краткотрайно лечение и не е имало данни, показващи карциногенна активност.

Мутагенен потенциал

Не са установени данни за потенциал за генетични и хромозомни мутации при *in vivo* и *in vitro* тестови модели.

Репродуктивна токсичност

При проучвания с животни относно ембриотоксичните ефекти, не са установени тератогенни ефекти при мишки и пълхове. При пълхове, азитромицин в дози от 100 и 200 mg/kg тегло дневно е предизвикал леко забавяне във феталната осификация и в увеличаване на теглото на майките.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Лактоза, безводна
Пшенично нишесте
Магнезиев стеарат
Натриев лаурилсулфат
Състав на твърда желатинова капсула
Азорубин
Титанов диоксид
Желатин

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.



6.5 Вид и съдържание на опаковката

По 6 твърди капсули в блистер от PVC/алуминиево фолио; по един блистер в опаковка.
По 8 твърди капсули в блистер от PVC/алуминиево фолио; по един блистер в опаковка.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
Malta Life Sciences Park
Building 1, Level 4
Sir Temi Zammit Buildings
San Gwann SGN 3000, Малта

8. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Per. № 9900192

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 12.07.1999 г.
Дата на последно подновяване: 21.01.2010 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

12.2018

