

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Реновия® 10 mg филмирани таблетки

Renovia® 10 mg film-coated tablets

Здобрене №

Лерканидипинов хидрохлорид (*Lercanidipine hydrochloride*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Реновия® 10 mg и за какво се използва
2. Преди да приемете Реновия® 10 mg
3. Как да приемате Реновия® 10 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Реновия® 10 mg
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Реновия® 10 mg и за какво се използва

Реновия® 10 mg е лекарство от групата на калциевите антагонисти (дихидропиридиновата група). Реновия® 10 mg се прилага за лечение на високо кръвно налягане, т. нар. хипертония при възрастни пациенти над 18 години (не се препоръчва при деца под 18 години).

2. Преди да приемете Реновия® 10 mg**Не приемайте Реновия® 10 mg и информирайте Вашия лекар ако:**

- сте алергичен (свръхчувствителен) към лерканидипинов хидрохлорид или към някоя от другите съставки на Реновия® 10 mg;
- преди това сте имали алергична реакция към подобни лекарства (напр. амлодипин, никардипин, фелодипин, израдипин, нифедипин или лацидипин);
- страдате от определени сърдечни заболявания като:
 - нелекувана сърдечна недостатъчност;
 - нарушен приток на кръв от сърцето;
 - нестабилна ангина пекторис (гръден болка в покой или прогресивно засилваща се гръден болка);
 - прекаран сърдечен инфаркт преди по-малко от един месец;
- имате тежко чернодробно или бъбречно увреждане;
- приемате лекарства, инхибитори на CYP3A4 изoenзим:
 - противогъбични лекарства (като кетоконазол или итраконазол);
 - макролидни антибиотици (като еритромицин, тролеандомицин);
 - противовирусни средства (като ритонавир);
- приемате лекарството циклоспорин (прилага се след трансплантации с цел органна защита);
- приемате грейпфрут или сок от грейпфрут.

Не приемайте Реновия® 10 mg ако сте бременна или кърмите (за повече информация вижте раздел „Бременност и кърмене“)



Обърнете специално внимание при употреба на Реновия® 10 mg

- ако страдате от определени сърдечни заболявания, ако имате пейсейкър или ако страдате от ангина пекторис;
- ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците или ако сте на хемодиализа.

Прием на Реновия® 10 mg с други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако:

- приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива без лекарско предписание;
- приемате бета-блокери, напр. метопролол, диуретици (обезводняващи) или ACE инхибитори (лекарства за лечение на високо кръвно налягане);
- приемате циметидин (повече от 800 mg, лекарство за язви, нарушено храносмилане или киселини);
- приемате дигоксин (лекарство за лечение на сърдечни проблеми);
- приемате мидазолам (сънотворно);
- приемате рифампицин (лекарство за лечение на туберкулоза);
- приемате астемизол или терфенадин (лекарства, прилагани при алергии);
- приемате амиодарон или хинидин (лекарства, прилагани при участена сърдечна дейност);
- приемате фенитоин или карбамазепин (лекарства, прилагани при епилепсия). Вашият лекар ще проследява кръвното Ви налягане по-често от обикновено.

Прием на Реновия® 10 mg с храни и напитки

- Пациентите не трябва да приемат алкохол по време на лечението с Реновия® 10 mg, тъй като това може да усили ефекта на Реновия® 10 mg.
- Пациентите не трябва да приемат грейпфрут или сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Не трябва да приемате Реновия® 10 mg ако сте бременна или кърмите, или ако планирате бременност, или ако не вземате противозачатъчни мерки.

Ако приемате Реновия® 10 mg и предполагате, че сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар!

Шофиране и работа с машини

Необходимо е внимание при приемането на Реновия® 10 mg, тъй като е възможна появата на замаяност, слабост или умора.

Не шофирайте и не използвайте машини докато не установите как ви влияе Реновия® 10 mg.

Информация относно някоя от съставките на Реновия® 10 mg

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че страдате от непоносимост към някои захари, напр. непоносимост към лактоза, галактоземия и/или глюкоза/галактоза малабсорбционен синдром, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство, тъй като таблетките съдържат лактоза.

3. Как да приемате Реновия® 10 mg

Винаги приемайте Реновия® 10 mg точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни: обичайната доза е 10 mg (една филмирана таблетка) по едно и също време на деня, за предпочитане сутрин, поне 15 минути преди закуска, тъй като храната, обогатена с мазнини, значително увеличава плазмените нива на лекарството. Вашият лекар може да Ви посъветва да увеличите дневната доза до 20 mg, ако е необходимо.

За предпочитане е таблетките да се приемат без да се дъвчат с достатъчно количество вода.



Старческа възраст: не се налага коригиране на дозата. Особено внимание е необходимо в началото на лечението.

Пациенти с чернодробни и бъбречни увреждания: необходимо е специално внимание в началото на лечение при тези пациенти. Изиска се внимание при увеличаването на дозата на 20 mg.

Деца: това лекарство не трябва да се прилага при пациенти под 18 годишна възраст.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Реновия® 10 mg

Не надвишавайте предписаната доза.

Ако приемете доза, по-голяма от предписаната или в случай на предозиране, моля, незабавно потърсете лекарска помощ, като вземете таблетките или опаковката на лекарството със себе си.

Превишаването на предписаната доза може да доведе до прекомерно понижение на кръвното налягане, неравномерна или участена сърдечна дейност. Може да доведе и до загуба на съзнание.

Ако сте пропуснали да приемете Реновия® 10 mg

Ако забравите да приемете таблетката, пропуснете тази доза и после продължете както преди. Не приемайте двойна доза.

Ако сте спрели приема на Реновия® 10 mg

Ако спрете приема на Реновия® 10 mg, кръвното Ви налягане може отново да се увеличи. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Реновия® 10 mg може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да са сериозни:

Ако възникне някоя от тези нежелани реакции, незабавно уведомете Вашия лекар.

Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 пациента): ангина пекторис (гръден болка поради нарушено кръвоснабдяване на сърцето);

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10000 пациента): гръден болка, понижено кръвно налягане, загуба на съзнание и алергични реакции (симптоми като сърбеж, обрив, уртикария).

Ако страдате от ангина пекторис, лекарства, като Реновия® 10 mg, могат да доведат до повищена честота, продължителност и тежест на тези епизоди. Могат да се наблюдават изолирани случаи на сърдечни пристъпи.

Други възможни нежелани реакции:

Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 пациента): главоболие, замаяност, сърдечна честота, палпитации (сърцебиене), внезапно зачеряване на лицето, врата или горната част на гръденния кош, оток около глезните.



Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 пациента): сънливост, общо неразположение, повръщане, киселини, стомашна болка, диария, кожен обрив, мускулни болки, отделяне на голямо количество урина, умора.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10000 пациента): оток на венците, промени в чернодробната функция (отчита се по кръвните тестове), учестено уриниране.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Реновиа® 10 mg

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Реновиа® 10 mg след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпазва от светлина и влага. Оригиналната опаковка трябва да се съхранява на сухо място.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Реновиа® 10 mg

Активното вещество е лерканидипинов хидрохлорид (lercanidipine hydrochloride) 10 mg, еквивалентно на 9,4 mg лерканидипин.

Другите съставки са:

Сърцевина на таблетката: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон K30, магнезиев стеарат.

Филмирано покритие: хипромелоза, талк, титанов диоксид (E171), макрогол 6000, железен оксид (E172).

Как изглежда Реновиа® 10 mg и какво съдържа опаковката

Реновиа® 10 mg: жълта, кръгла, биконвексна филмирана таблетка, с делителна черта от едната страна.

Реновиа® 10 mg е в блистери, в опаковки по 7, 14, 28, 60 и 90 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Германия

Дата на последно одобрение на листовката
Октомври, 2010 г.

