

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Към Рег. № 20130359

Септофорт Стронг 5 mg/5 mg пресовани таблетки за смучене

Septofort Strong 5 mg/5 mg compressed lozenges

хлорхексидинов дихидрохлорид (chlorhexidine dihydrochloride) /бензокаин (benzocaine),

Разрешение № 25670, 22-04-2014

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 2 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Септофорт Стронг и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Септофорт Стронг
3. Как да приемате Септофорт Стронг
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Септофорт Стронг
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕПТОФОРТ СТРОНГ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Активните съставки на това лекарство съчетават антисептичното и дезинфекциращо действие на хлорхексидин с местните обезболяващи ефекти на бензокаин.

Това лекарство се използва за локално и временно облекчаване на проявите на леки инфекции на гърлото, съпроводени с болка без температура, като: дразнене на гърлото, загуба на гласа и малки, болезнени ранички в устната кухина.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СЕПТОФОРТ СТРОНГ**Не приемайте Септофорт Стронг:**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към хлорхексидин, бензокаин или към някоя от останалите съставки на това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

- Не трябва да се приемат по-високи дози от препоръчани в точка 3 (Как да приемате Септофорт Стронг).

Обърнете особено внимание и в следните случаи:

- ако не понасяте други местни анестетици, като производни на пара-аминобензоената киселина (ПАВА), парабени или парафенилендиамини (компонент на боя за коса);
- ако имате сериозно или голямо нараняване на устата;
- ако имате периодонтит (заболяване на венците), тъй като хлорхексидин може да увеличи количеството на зъбния камък.



Препоръчва се поддържане на добра устна хигиена, за да се намали натрупването на зъбен камък и възможното оцветяване на зъбите, причинено от хлорхексидин.

Други лекарства и Септофорт Стронг

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Въпреки, че не се посочва в препоръките за употреба, това лекарство не трябва да се приема с други лекарства за лечение на устната кухина без консултация с лекар или фармацевт.

Това е особено важно в следните случаи:

- други антисептици за устата или гърлото;
- холинестеразни инхибитори (лекарства за лечение на болест на Алцхаймер);
- сулфонамиди (използвани за лечение на инфекции).

Анионните съединения и суспендиращите средства, често срещани съставки на пастите за зъби, намаляват ефективността на хлорхексидин и по тази причина устата трябва да се изплаква добре след използване на паста за зъби.

Взаимодействие с диагностични тестове

Това лекарство може да взаимодейства с тестове за изследване функцията на задстомашната жлеза с използване на бентиромид. Не взимайте това лекарство най-малко три дни преди провеждане на изследването и информирайте Вашия лекар..

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или мислите че може да сте бременна преди да започнете да приемате това лекарство. Приемът на лекарства по време на бременност може да е опасно за ембриона или плода и трябва да бъде под контрола на Вашия лекар.

Употреба при лица над 65 годишна възраст:

Пациенти в старческа възраст и изтощени болни може да бъдат по-чувствителни към бензокаин.

Употреба при деца:

Това лекарство не трябва да се прилага при деца под 6 годишна възраст без консултация с лекар. Децата, както и пациентите в старческа възраст и изтощените болни може да бъдат по-чувствителни към бензокаин

Шофиране и работа с машини

Не са описани случаи на засягане способността за шофиране и работа с машини

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СЕПТОФОРТ СТРОНГ

Следвайте точно указанията за приложение на Септофорт Стронг, освен ако вашият лекар не Ви е посъветвал друго. Ако имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт ако смятате, че ефектът на Септофорт Стронг е твърде силен или твърде слаб.



Това лекарство е за орофарингеално приложение, така че таблетките за смучене трябва да се разтворят бавно в устата, без да се дъвчат или гълтат, тъй като ефектът е местен и действието ще се прояви само при директен контакт със засегнатата повърхност.

Обичайната дозировка е:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст:

Една таблетка за смучене на всеки 2 или 3 часа, като се остави да се разтвори бавно в устата.

Да не се приемат повече от 8 таблетки за смучене на 24 часа (1 денонощие).

Оставете таблетката за смучене да се разтвори бавно в устата, без да се дъвче или гълта.

Ако забележите, че симптомите се влошават или продължават повече от два дни след започване на лечението, или са съпроводени с висока температура, главоболие, гадене и повръщане, консултирайте с Вашия лекар възможно най-бързо.

Ако сте приели повече от необходимата доза Септофорт Стронг

Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно се консултирайте с Вашия лекар, фармацевт или се обадете в болница и посочете лекарството и количеството, които сте приели.

Признаците на предозиране се проявяват по следния начин: завален говор, сънливост и нестабилна походка, замъглено зрение или двойно виждане, замаяност, раздразнимост или гърчове, шум в ушите, повишено изпотяване. Възможно е понижаване на кръвното налягане.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Септофорт Стронг може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Може да се появи оцветяване на зъбите. Петната или пигментацията може да са по-изразени при лица със зъбен камък. Оцветяването на зъбите не е постоянно и може да се отстрани със средства за почистване на устната кухина. Може също да се появи оцветяване на пломбите и в този случай то може да е постоянно.

Възможна е и промяна във вкусовите усещания.

В някои случаи Септофорт Стронг може да предизвика дразнене на устата или на върха на езика, които обикновено са временни, както и алергични реакции към хлорхексидин или бензокаин.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СЕПТОФОРТ СТРОНГ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°C

Не използвайте Септофорт Стронг след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите опаковката и ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Септофорт Стронг

Всяка таблетка за смучене съдържа:

- Активните съставки са: хлорхексидинов дихидрохлорид 5 mg, бензокаин 5 mg
- Другите съставки са: манитол (E-421), микрокристална целулоза, повидон, магнезиев стеарат, натриев цикламат, захарин натрий, ментолов аромат и портокалов аромат.

Как изглежда Септофорт Стронг и какво съдържа опаковката

Таблетки за смучене с портокалов аромат, жъленикаво-бели, кръгли, скосени и с делителна черта на едната страна. Всяка опаковка съдържа 12 или 24 таблетки за смучене и листовка с информация за пациента.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Чешка Република

Дата на последно преразглеждане на листовката

Декември/2013

