

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**ВЕРМОКС 100 mg таблетки**  
Мебендазол (*mebendazole*)

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява ВЕРМОКС и за какво се използва
2. Преди да приемете ВЕРМОКС
3. Как да приемате ВЕРМОКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВЕРМОКС
6. Допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № <u>20020553</u>
Разрешение № <u>10148</u> / <u>02.07.2010</u>
Одобрение № ...../.....

## 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕРМОКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ВЕРМОКС е лекарство срещу глисти.

Той се използва за лечение на инвазии причинени от един или няколко от следните паразити:

- острици (*Enterobius vermicularis*);
- власоглав червей (*Trichuris trichiura*);
- голям кръгъл червей (*Ascaris lumbricoides*);
- анкилостома (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- *Strongyloides stercoralis*;
- тения (*Taenia spp.*).

## 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ВЕРМОКС

**Не приемайте ВЕРМОКС**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към мебендазол или към някоя от останалите съставки на ВЕРМОКС.

**Обърнете специално внимание при употребата на ВЕРМОКС**

Не давайте ВЕРМОКС на деца (под 2 години), ако лекарят не е предписал това.

**Прием на други лекарства**

Уведомете Вашия лекар, ако приемате циметидин (лекарство срещу киселини в стомаха). Ако това е така, може да се наложи адаптиране на дозата на ВЕРМОКС. Употребата на ВЕРМОКС (мебендазол) едновременно с метронидазол (лекарство против бактериални и протозойни инфекции) трябва да се избягва.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

**Прием на ВЕРМОКС с храни и напитки**

Приемайте таблетките с малко количество течност.

Не трябва да приемате ВЕРМОКС по време на хранене.

Не трябва да се консумира алкохол по време на лечението с ВЕРМОКС.

**Бременност и кърмене**

Ако сте или смятате, че сте бременна, или ако кърмите, трябва да уведомите Вашия лекар, който ще реши дали може да приемате ВЕРМОКС.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Няма проблеми, тъй като ВЕРМОКС не повлиява вниманието и способностите за шофиране.

### **Важна информация относно някои от съставките на ВЕРМОКС**

Този лекарствен продукт съдържа малки количества оранжево жълто S (E 110), което може да причини алергични реакции.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВЕРМОКС**

ВЕРМОКС се предлага под формата на таблетки, които се приемат през устата. Приемайте таблетките с малко количество течност.

Не трябва да приемате ВЕРМОКС по време на хранене. Не е необходимо да спазвате специална диета или да приемате слабителни средства. Не трябва да се консумира алкохол по време на лечението с ВЕРМОКС.

Количеството ВЕРМОКС, което трябва да приемете зависи от вида на чревните паразити. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

В зависимост от вида на паразитната инвазия трябва да се прецени необходимостта всички членове от семейството да се подложат на лечение.

Деца над 2-годишна възраст и възрастните приемат еднаква доза ВЕРМОКС, освен в случаите на инвазии, причинени от стронгилоиди и тении.

#### Инвазии с острици:

Вземете 1 таблетка. След 2 и 4 седмици вземете 1 таблетка. Това е необходимо за да се преодолее напълно инвазията. Първоначалният прием може да унищожи паразитите, но не и яйцата им. Тези яйца могат да причинят повторна инвазия.

#### Инвазии с голям кръгъл червей, власоглав червей, кукест червей или няколко вида паразити:

Вземете 1 таблетка два пъти дневно, сутрин и вечер, за три последователни дни.

#### Тениаза и стронгилоидаза:

Възрастни: вземете по 2 таблетки сутрин и вечер в продължение на 3 последователни дни.

Деца над 2 години: взимат по 1 таблетка сутрин и вечер в продължение на 3 последователни дни.

Винаги приемайте ВЕРМОКС точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза ВЕРМОКС**

VERMOX не е предназначен за дълготрайна употреба. Ако VERMOX се приема в големи количества всеки ден продължително време, може да се появят нарушения на кръвта, бъбреците и черния дроб. Възможно е да получите стомашни спазми, гадене, повръщане и диария, ако сте приели по-голямо количество ВЕРМОКС. В такъв случай, Ви трябва да се консултирате с лекар, който може да Ви препоръча да вземете малко активен въглен; той ще абсорбира останалия в стомаха Ви ВЕРМОКС.

Информация за лекаря в случай на предозиране:

- Няма специфичен антидот.
- Ако се сметне за подходящо, може да се даде активен въглен.
- До първия час от приема може да се извърши стомашна промивка.

**Ако сте пропуснали да приемете ВЕРМОКС**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка ВЕРМОКС.

**Ако сте спрели приема на ВЕРМОКС**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, ВЕРМОКС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Повреме на лечението с ВЕРМОКС могат да възникнат и се съобщават следните нежелани реакции :

- коремни болки и оплаквания, газове, и диария
- обрив по кожата
- обриви
- косопад, който в някои случаи може да е постоянен
- кръвни и чернодробни нарушения
- Могат да възникнат проблеми с бъбреците, при продължителна употреба на ВЕРМОКС в дози много по-високи от препоръчаните (по-високи от нормално предписваните)

Ако се появят някои от следните симптоми, **незабавно се свържете с Вашия лекар:**

- тежко нарушение на кожата, изразяващо се в обрив, мехури по кожата и възпаления в устата, очите или аногениталната област, придружени с треска;
- реакция, която се появява малко след прилагане на лекарството и се характеризира с обрив по кожата, сърбеж, задух и/или подуване на лицето;
- тежка реакция на свръхчувствителност, която се появява скоро след прилагане на лекарството, която може да се характеризира с копривна треска, сърбеж, зачервяване, припадък и затруднено дишане, освен останалите възможни симптоми;
- съобщава се за конвулсии (пристъпи), включително и при новородени. VERMOX се дава на деца под 2 години, само ако е изрично предписан от Вашия лекар;

Не се колебайте да съобщавате тези или други нежелани ефекти на Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВЕРМОКС**

Да се съхранява под 30 °С (това е нормалната стайна температура).

Това лекарство може да се съхранява само за ограничен период от време. Не използвайте ВЕРМОКС след датата, отбелязана на опаковката (месец и година), дори ако е съхраняван правилно. Съветваме Ви да връщате старите лекарства на Вашия фармацевт.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ВЕРМОКС след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.  
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте ВЕРМОКС, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.  
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ВЕРМОКС**

- Активното вещество е: мебендазол  
Една таблетка съдържа 100 mg мебендазол (на всяка таблетка има надпис Me/100)
- Другите съставки са:  
микрокристална целулоза  
натриев нищестен гликолат  
талк  
царевично нишесте  
захарин натрий  
магнезиев стеарат  
памучно масло, хидрогенирано  
портокалова есенция  
силициев диоксид, колоиден, безводен  
натриев лаурилсулфат  
оранжево жълто S (E110)

**Как изглежда ВЕРМОКС и какво съдържа опаковката**  
Светло-оранжеви, кръгли таблетки с надпис Me/100.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Johnson & Johnson D.O.O.  
Šmartinska cesta 53  
1000 Ljubljana  
Словения

### **Производител**

JANSSEN-CILAG S.P.A.  
Via C. Janssen 04010  
Borgo San Michel LATINA,  
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

### **България**

Представителство на Johnson & Johnson, D.O.O.  
ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София, сграда 4  
София 1715  
Тел.: 02 489 94 00

**Дата на последна редакция на листовката**  
12/2009