



Листовка: информация за потребителя

Елоком 0,1 % разтвор за кожа
мометазонов фуроат

Elocom 0,1 % cutaneous solution
mometasone furoate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация .

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Елоком и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Елоком
3. Как да използвате Елоком
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Елоком
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Елоком и за какво се използва

Елоком разтвор за кожа е лекарство от групата на локалните кортикостероиди и се определя като „мошен кортикостероид“. Тези лекарства се прилагат върху повърхността на кожата, за да намалят зачервяването и сърбежа, причинени от някои кожни проблеми.

Елоком разтвор за кожа се прилага при възрастни и деца за намаляване на зачервяването и сърбежа, причинени от някои кожни състояния, които засягат окосмената част от кожата на главата, като псориазис и себореен дерматит.

Псориазисът е кожно заболяване, при което се образуват сърбящи, лющещи се, розови плаки по лактите, коленете, скалпа и други части на тялото. Дерматитът е състояние, причинено от реакцията на кожата към външни агенти, напр. детергенти, причиняващи зачервяване и сърбеж на кожата.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Елоком

Не използвайте Елоком

- ако сте алергични към мометазонов фуроат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), или към други подобни лекарства;
- ако са налице и други кожни проблеми, засягащи скалпа, тъй като може да се влошат, особено ако това са
 - варицела
 - херпес зостер



- брадавици
- други кожни инфекции
- разязвена кожа
- рани
- атрофия на кожата (изтъняване на кожата).

Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Елоком разтвор за кожа.

Ако кожата на скалпа Ви се възпали или стане чувствителна след употреба на Елоком трябва да прекратите употребата му и да уведомите Вашия лекар.

Ако считате, че сте получили инфекция на скалпа, докато използвате Елоком, трябва да кажете на Вашия лекар, тъй като той може да Ви предпише друго лекарство.

Нежеланите реакции, които може да се появят при употреба на перорални или инжекционни кортикостероиди, може да възникнат също и при кортикостероиди за прилагане върху кожата, особено при кърмачета и деца.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

Други лекарства и Елоком

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Елоком разтвор за кожа съдържа пропиленгликол

Елоком разтвор за кожа съдържа пропиленгликол, който може да причини дразнене на кожата.

3. Как да използвате Елоком

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Елоком не се препоръчва при деца на възраст под 2 години.

Обикновено при възрастни и деца се препоръчва прилагането на няколко капки Елоком разтвор за кожа веднъж дневно върху засегнатата окосмена част на кожата на главата и леко се масажира до пълното попиване на разтвора.

Винаги следвайте тези инструкции, когато употребявате Елоком:

- Това лекарство трябва да се прилага само върху окосмената част на главата (скалпа). Не го използвайте за други части от Вашето тяло.
- Не прилагайте разтвора върху скалпа на Вашето дете повече от 5 дни.
- Консултирайте се с Вашия лекар преди да покриете лекуваната зона с бинт или пластир. Лекуваните участъци по лицето или при деца не трябва да се покриват с бинт или пластир.



- Не трябва да прилагате големи количества от разтвора върху голяма повърхност от тялото за продължителен период от време (напр. всеки ден в продължение на седмици или месеци).
- Не го прилагайте във или около очите, включително клепачите.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Елоком

Ако Вие (или някой друг) случайно погълнете разтвор през устата, това не би трябвало да причини никакви проблеми. Ако все пак се тревожите, обърнете се за съвет към Вашия лекар.

Ако използвате разтвора по-често от необходимото или върху големи площи от тялото, това може да повлияе някои от хормоните Ви. При деца това може да засегне растежа и развитието.

Ако не сте употребявали разтвора както Ви е било предписано и сте го използвали твърде често и/или за продължително време, трябва да кажете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Елоком

Ако забравите да приложите Елоком, направете го колкото е възможно по-скоро, след което се върнете към нормалната схема на приложение.

Ако сте спрели употребата на Елоком

Ако сте използвали Елоком за дълъг период и Вашите кожни проблеми са се подобрили, не бива да прекратявате внезапно употребата на разтвора. Ако го направите, Вие може да забележите, че Вашата кожа се зачервява и може да усетите парене и затопляне. За да избегнете това, Вие трябва да говорите с Вашия лекар и той ще намали постепенно честотата на приложение на разтвора докато прекратите лечението изцяло.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои пациенти може да установят следните нежелани лекарствени реакции след употреба на Елоком:

- алергични кожни реакции
- бактериални и вторични кожни инфекции
- акне
- възпаление и/или инфекция на космените фоликули
- изтъняване на кожата
- червени белези, свързани с лишей по кожата
- обезцветяване на кожата
- парене
- щипене
- сърбеж
- мравучкане
- засилено окосмяване
- омекотяване на кожата и стрии
- замъглено зрение.

Други нежелани реакции, които може да възникнат при локално приложение на кортикостероиди са сухота на кожата, възпаление на кожата, дерматит, дерматит около устата и малки разширени кръвоносни съдове.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Елоком

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Елоком разтвор за кожа

- Активното вещество е: мометазонов фураат 1 mg/g (0,1 %).
- Другите съставки са: изопропилов алкохол, пропиленгликол, хидроксипропилцелулоза, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, фосфорна киселина и пречистена вода.

Как изглежда Елоком и какво съдържа опаковката

Елоком разтвор за кожа се предлага в бели пластмасови бутилки от 20 и 30 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Мерк Шарп и Доум България ЕООД
бул. „Никола Вапцаров“ №55, ЕКСПО 2000, ет.1
Източно крило, Сектори В1 и В2
район Лозенец
гр. София 1407, България
тел. 02/819 3737
факс: 02/862 5196
имейл: info-msdbg@merck.com

Производител:

Schering-Plough N.V.,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката

