

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Деслоратадин ВП 0,5 mg/ml перорален разтвор  
Desloratadine VP 0,5 mg/ml oral solution  
Деслоратадин/Desloratadine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Деслоратадин ВП за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Деслоратадин ВП
3. Как да използвате Деслоратадин ВП
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Деслоратадин ВП
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Приложение 2	
Към Ред. № .....	2018/148
Разрешение № .....	ВБ/МА/МР-41714
11-06-2018	
Одобрение № .....	

### 1. Какво представлява Деслоратадин ВП и за какво се използва

Активното вещество в Деслоратадин ВП перорален разтвор е деслоратадин. Представлява противоалергично лекарство, което не причинява сънливост. То помага за контролиране на алергичните реакции и овладяване на техните прояви.

### Деслоратадин ВП се прилага при:

- Алергичен ринит (възпаление на лигавицата на носа, причинено от алергия – например сенна хрема или алергия към домашен прах) за облекчаване на кихането и сърбежа, секрецията от носа, сърбежа на небцето, зачерявянето или наслъзяването на очите;
- Уртикария (състояние на кожата, протичащо със сърбеж, обриви и зачерявания, причинено от алергия)

Деслоратадин има продължително действие, което продължава цял ден, като по този начин това лекарство ще Ви помага да възстановите нормалната си ежедневна дейност и съня си.

Това лекарство е предназначено за деца на възраст от 1 до 11 години, подрастващи и юноши (12 години и повече) и възрастни, вкл. стари хора.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Деслоратадин ВП

#### Не приемайте Деслоратадин ВП:

- Ако сте алергични към деслоратадин, към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б) или към лоратадин.

#### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Деслоратадин ВП, ако:

- имате нарушена бъбречна функция



### **Други лекарства и Деслоратадин ВП**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Не са известни взаимодействия на деслоратадин с други лекарства.

### **Деслоратадин ВП с храни, напитки и алкохол**

Това лекарство може да се приема с или без храна. Не се препоръчва прием на алкохол по време на лечение с деслоратадин.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

В препоръчваните дози Деслоратадин ВП не се очаква да предизвика съниливост или понижение на вниманието. Все пак, макар и много рядко, някои хора имат усещане за съниливост, която може да се отрази върху способността им за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация относно някои от съставките на Деслоратадин ВП**

Това лекарство съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с лекаря си, преди да приемете това лекарство.

## **3. Как да използвате Деслоратадин ВП**

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

*Препоръчителната доза за възрастни и юноши (12 години и повече) е: 10 ml перорален разтвор еднократно дневно.*

### **Употреба при деца**

*Препоръчителната доза е:*

Деца от 1 до 5 години – 2,5 ml перорален разтвор еднократно дневно.

Деца от 6 до 11 години – 5 ml перорален разтвор еднократно дневно.

### **Начин и продължителност на приложение**

Това лекарство може да се приема с или без храна.

След като погълнете дозата от разтвора, трябва да изпиете малко вода.

Продължителността на приложение ще определи Вашият лекар в зависимост от вида на алергичния ринит, от който страдате.

Ако страдате от интермитентен алергичен ринит (имате симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици), Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразно хода на Вашето заболяване.

Ако страдате от персистиращ алергичен ринит (имате симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично или в продължение на повече от 4 седмици), Вашият лекар може да Ви препоръча по-продължително лечение.

При пациентите с уртикария може да се наложи различна продължителност на лечение, поради което е необходимо стриктно да спазвате указанията на лекаря си.



### **Ако сте приели повече от необходимата доза Деслоратадин ВП**

Това лекарство трябва да бъде приемано по начин, който е определен от лекаря Ви. Не се очакват сериозни проблеми при случайно предозиране.

Ако сте приели доза, по-висока от назначената Ви, свържете с Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако сте пропуснали да приемете Деслоратадин ВП**

Ако сте пропуснали да приемете дозата навреме, приемете я при първа възможност, след което продължете лечението по предписаната Ви схема. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При повечето деца и възрастни нежеланите реакции са практически същите като при прием на плацебо (разтвор или таблетка, несъдържащи лекарство).

Все пак при деца под 2 години в сравнение с плацебо по-честите нежелани реакции са диария, повишена температура и безсъние, докато при възрастни това са отпадналост, сухота в устата и главоболие.

След пускането на деслоратадин на пазара много рядко е съобщавано за тежки алергични реакции (затруднено дишане, хриптене, сърбеж, копривна треска и отоци). За случаи на сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, болки в корема, гадене, повръщане, разстроен стомах, диария, виене на свят, съниливост, безсъние, болки в мускулите, халюцинации, гърчове, беспокойство със засилени движения, чернодробно възпаление и отклонения в чернодробните изследвания е съобщавано също много рядко.

### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ №8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като, съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **5. Как да съхранявате Деслоратадин ВП**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Срок на годност след първо отваряне на бутилката - 3 месеца.

Не използвайте това лекарство, ако забележите промени във външния му вид.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Деслоратадин ВП

- Активното вещество е деслоратадин (desloratadin) 0,5 mg/ml.
- Другите съставки (помощни вещества) са: сорбитол, течен (некристализиращ)(E420), пропиленгликол (E1520), сукралоза (E955), хипромелоза 2910 (464), натриев цитрат (E331), лимонена киселина, безводна (E330), аромат тути-фрути (смес на ароматни вещества и пропиленгликол), динатриев едетат, пречистена вода.

### Как изглежда Деслоратадин ВП и какво съдържа опаковката

Деслоратадин ВП перорален разтвор представлява бистър, безцветен разтвор с плодов аромат.

120 ml перорален разтвор в тъмни стъклени бутилки.

Една бутилка с мерителна чашка, поставена върху капачката, поставени в картонена кутия

### Притежател на разрешението за употреба и производител

ВЕТПРОМ АД,  
2400 гр.Радомир, България,  
ул. Отец Паисий № 26  
тел.: 024519300  
[office@vpharma.bg](mailto:office@vpharma.bg)

Дата на последно преразглеждане на листовката 04/2018

