

Листовка: информация за потребителя
Фервефлу за възрастни без захар 500 mg/25 mg/200 mg прах за
перорален разтвор
Парацетамол/Фенираминов малеат/Аскорбинова киселина

Ferveflu adults sugar-free 500 mg /25 mg/200 mg powder for oral solution
Paracetamol/Pheniramine maleate/Ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно, както е описано в тази листовка, или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 до 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **Фервефлу за възрастни без захар** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате **Фервефлу за възрастни без захар**
3. Как да използвате **Фервефлу за възрастни без захар**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **Фервефлу за възрастни без захар**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фервефлу за възрастни без захар и за какво се използва

Това лекарство съдържа парацетамол.

Лекарството е комбинация от антипиретик/аналгетик, антиалергично средство и аскорбинова киселина.

Фервефлу за възрастни без захар се използва за лечение на простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години.

Ако симптомите на повишена температура продължат повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни и/или се влошат, или се появи друг симптом след приемане на лекарството, ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Фервефлу за възрастни без захар

Не приемайте Фервефлу за възрастни без захар:

- ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки (изброени в т.б.).

Това лекарство не трябва да се използва в следните случаи:

- сериозно чернодробно заболяване;
- някои форма на глаукома;
- заболявания на простатата и пикочните пътища;
- при деца под 15 години.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20120220
Разрешение № ВС УМА (МР) 7-46405	
Одобрение № 05-07-2019	

Предупреждения и предпазни мерки:

Консултирайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт, в случай на предоздравене или случайно приемане на свръх висока доза.

Фервефлу за възрастни без захар съдържа парацетамол. Други лекарства също съдържат тази субстанция. Не комбинирайте с такива лекарства, за да не наложите



препоръчваната дневна доза (виж Как да приемате Фервефлу за възрастни без захар).

Температурата трябва да спадне бързо.

Не приемайте по-висока доза от посочената в тази листовка и в случай на предозиране веднага се консултирайте с лекар.

Не използвайте това лекарство за продължително лечение, ако не е предписано от лекар, особено ако симптомите на повишена температура продължава повече от 3 дни, а другите симптоми - повече от 5 дни и/или се влошат, или се появят друг симптом след приемане на лекарството.

- Информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай на бъбречно заболяване, бременност и кърмене;
- Информирайте Вашия лекар или фармацевт когато едновременно с Фервефлу за възрастни без захар вземате и друго лекарство;
- По време на лечението не трябва да се приема алкохол или седативни средства.

Деца

Фервефлу за възрастни без захар не трябва да се използва при деца под 15 годишна възраст.

Други лекарства и Фервефлу за възрастни без захар

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

За да избегнете вредните ефекти от предозиране, НЕ КОМБИНИРАЙТЕ с други лекарства съдържащи антихистамини или парацетамол БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.

Когато се съмнявате, не се колебайте да се обадите на Вашия лекар или фармацевт.

Фервефлу за възрастни без захар с храни, напитки и алкохол

По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Като предпазна мярка, това лекарство не е препоръчително по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има рисък от сънливост.

Този ефект се усилва при едновременно приемане на алкохол или лекарства съдържащи алкохол.

3. Как да приемате Фервефлу за възрастни без захар

Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за възрастни и деца над 15 години е:

По 1 саше, два или три пъти на ден.

Интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа.

Съдържанието на 1 саше се разтваря в чаша гореща или студена вода и се изпива.

Перорално приложение.

При грипоподобни състояния се препоръчва Фервефлу за възрастни без захар да се приема с



гореща вода вечер.

В случай на остра бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между два приема трябва да бъде поне 8 часа.

Не използвайте това лекарство за продължително лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължават повече от 5 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фервефлу за възрастни без захар

В случай на случайно или преднамерено предозиране информирайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Фервефлу за възрастни без захар може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани според честотата на тяхната поява и се разделят на:

- Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души;
- Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души;
- Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души;
- Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души;
- Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души;
- С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Възможни са следните нежелани реакции, които са много редки или с неизвестна честота:

- Настъпване на остръ пристъп на глаукома при хора, които имат такова предразположение;
- Нарушения при уриниране (значително намаляване на урината, затруднено уриниране);
- Сухота в устата, нарушения на акомодацията (способността на окото да се нагласява за виждане на различни разстояния), запек;
- Нарушения на паметта или концентрацията, объркване, световъртеж (по-често при пациенти в напреднала възраст);
- Липса на координация в движенията, треперене;
- Сънливост, занижено внимание – по-ясно изразено в началото на лечението;
- Съобщава се за редки случаи на кожен обрив, зачеряване на кожата, или алергична реакция под формата на внезапен оток на лицето или шията, или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Лечението трябва незабавно да се спре, да се потърси лекарска помощ и да не се приемат повече лекарства съдържащи парацетамол или фенирамин;
- Съобщава се за няколко редки случая на промяна в резултатите на лабораторните изследвания, например много ниски нива на някои бели кръвни телца или тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците. В такъв случай се консултирайте с лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян груев 8

Тел.: +359 28903417

Уебсайт: www.bda.bg



5. Как да съхранявате Фервефлу за възрастни без захар

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху опаковката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фервефлу за възрастни без захар

Активните вещества са:

Парацетамол (Paracetamol) 500 mg

Фенираминов maleat (Pheniramine maleate) 25 mg

Аскорбинова киселина (Ascorbic acid) 200 mg

Другите съставки са: манитол, натриев цикламат Е952, захарин натрий Е954, аромат лимон, лимонена киселина безводна, силициев диоксид колоиден, безводен.

Как изглежда Фервефлу за възрастни без захар и какво съдържа опаковката

Прах за перорален разтвор в саше.

Съдържимото на сашето е почти бяла смес от прах и сухи агломерати

Всяка кутия съдържа – 8, 10, 15, 20 сашета и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

АДИФАРМ ЕАД

бул. Симеоновско шосе № 130

София 1700, България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Юни 2019 г.

