

**Листовка: информация за пациента**

**Пилокарпин Вижън 20 mg/ml капки за очи, разтвор**  
Пилокарпинов хидрохлорид

**Pilocarpin Vision 20 mg/ml eye drops, solution**  
Pilocarpine hydrochloride

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Пилокарпин Вижън и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пилокарпин Вижън
3. Как да използвате Пилокарпин Вижън
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Пилокарпин Вижън
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Пилокарпин Вижън и за какво се използва**

Името на Вашето лекарство е Пилокарпин Вижън, който е предназначен за приложение в окото. Като активно вещество съдържа пилокарпинов хидрохлорид, който принадлежи към група лекарства, известни като миотици. Тези лекарства оказват влияние върху мускулите на окото, което води до свиване на зеницата.

Това лекарство се използва:

- При някои форми на глаукома (повишено очно налягане);
- За отстраняване на ефекта на лекарства, които разширяват зеницата.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пилокарпин Вижън****Не използвайте Пилокарпин Вижън, ако:**

- сте алергични към пилокарпин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- страдате от очни нарушения с повишено вътреочно налягане, като тесногълна глаукома или вторична глаукома;
- страдате от възпаление на оцветената част на окото (остър ирит или преден увеит);
- носите меки контактни лещи.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Пилокарпин Вижън.

Пилокарпин Вижън трябва да се използва с повишено внимание или след консултация с лекар ако имате:



- Сърдечни заболявания;
- Астма;
- Болест на Паркинсон;
- Проблеми с отделянето на урина;
- Високо кръвно налягане;
- Стомашна язва;
- Носите контактни лещи.

Трябва да знаете, че Вашият лекар може да сметне за необходимо да проверява състоянието на очите Ви преди и по време на терапията, особено ако имате или сте имали проблеми с очите. Ако не Ви е провеждан очен преглед наскоро, кажете на Вашия лекар.

#### Употреба при деца

При деца под 18-годишна възраст лечението трябва да започне с най-ниската налична концентрация и най-ниската възможна доза, която оказва ефект.

#### **Други лекарства и Пилокарпин Вижън**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ако Ви се налага оперативно лечение информирайте Вашия лекар, че използвате Пилокарпин Вижън, тъй като той може да засили ефекта на някои от лекарствата използвани за обща анестезия.

Ако използвате други лекарства за очно приложение заедно с Пилокарпин Вижън, интервалът между отделните приложения трябва да бъде не по-малък от 5 минути.

От особено важно значение е да уведомите Вашия лекар ако приемате:

- Антихистамини (лекарства за лечение на алергии);
- Антихолинестеразни лекарства, като неостигмин (използват се за лечение на заболявания като миастения гравис);
- Лекарства за разширяване на зеницата (като атропин и фенилефрин);
- Лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (антихолинергични лекарства);
- Антидепресанти, включително трициклични антидепресанти (амитриптилин) и моноаминооксидазни инхибитори (MAO), използвани за лечение на тежка депресия;
- Фенотиазини (лекарства за лечение на тежки психични разстройства), например хлорпромазин;
- Лекарства за лечение на високо кръвно налягане (адренергични блокери).

#### **Пилокарпин Вижън с храна, напитки и алкохол**

Препоръчва се да не приемате алкохол по време на лечението с Пилокарпин Вижън.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### Бременност

Поради възможност за системна абсорбция, това лекарство може да увреди Вашия плод. Пилокарпин Вижън трябва да се използва по време на бременност само ако това е крайно наложително.

#### Кърмене

Поради възможност за системна абсорбция, това лекарство може да увреди Вашето дете. При кърмещи жени, Пилокарпин Вижън трябва да се използва само ако това е крайно наложително.

#### **Шофиране и работа с машини**



Пилокарпин Вижън може да причини затруднение при приспособяване на зрението към тъмнина. Поради това, не трябва да шофирате и да работите с машини в условия на слабо осветление, докато прилагате този продукт.

Очните капки, непосредствено след приложението могат да причинят замъгляване на зрението. Ако това се случи, не трябва да шофирате и да работите с машини докато зрението Ви не се възстанови напълно.

### **Пилокарпин Вижън съдържа бензалкониев хлорид**

Бензалкониевият хлорид може да причини дразнене на очите. Избягвайте контакт с меки контактни лещи. Отстранете контактните лещи преди прилагане и изчакайте поне 15 минути, преди да ги поставите обратно. Известно е, че бензалкониевият хлорид обезцветява меките контактни лещи.

### **3. Как да използвате Пилокарпин Вижън**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Винаги завършвайте пълния курс на лечение и не го прекъсвайте защото се чувствате по-добре.

Препоръчаната доза е:

#### Възрастни и лица над 65 години:

1-2 капки от разтвора се накапват в засегнатото око от 2 до 4 пъти дневно. В някои случаи (например остра глаукома) може да се наложи лекарството да се прилага до 6 пъти дневно.

#### Деца:

Лечението при деца под 18-годишна възраст трябва да започне с най-ниската налична концентрация и най-ниската възможна доза, която оказва ефект. В зависимост от отговора към лечението и поносимостта към него, Вашият лекар може да увеличи дозата до максималната препоръчителна доза за възрастни.

Важно е да се спазва хигиена при поставяне на капките. Не позволявайте върха на бутилката да се допира до окото, клепачите и околните повърхности, тъй като може да се замърси и това да доведе до развитието на очна инфекция със сериозни последици за окото, дори до загуба на зрение. Винаги мийте ръцете си преди използване на бутилката!

#### Инструкции за употреба:

1. Преди да използвате флакона за първи път, уверете се, че предпазната лента между капачката и флакона, не е разкъсана. Измийте ръцете си и отвъртете капачката.
2. Наклонете глава назад и дръпнете долния клепач надолу. Така се оформя „джоб“ между клепача и окото. Капката ще попадне точно на това място.



3. Дръжте флакона насочен надолу. Приближете върха му близо до окото. Използвайте огледало, ако ще Ви улесни.



4. Внимавайте да не докосвате окото, клепачите или други повърхности с върха на флакона. Внимателно натиснете основата на флакона, за да изпусне една капка от разтвора. Необходим е само лек натиск по дъното.
5. След като поставите лекарството, затворете клепача и натиснете с пръст окото в ъгълчето при носа за 3 минути. Това ще попречи на Пилокарпин Вижън да премине в носа или да изтече.
6. Затворете добре флакона веднага след употреба.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Използвайте този флакон само за Вашите очи!

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Пилокарпин Вижън**

Възможно е да настъпи предозиране, ако приложите по-висока доза. Изплакнете окото/очите с хладка вода и се консултирайте с Вашия лекар възможно най-скоро.

В случай на тежко предозиране или при неволно поглъщане на съдържанието на флакона незабавно потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт, тъй като може да възникнат сериозни нежелани реакции (особено при деца).

#### **Ако сте пропуснали да приемете Пилокарпин Вижън**

Ако сте пропуснали доза, поставете капките веднага щом се сетите, освен ако не е дошло време за следващата доза, а след това продължете да ги използвате както преди. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате тази, която сте пропуснали.

#### **Ако сте спрели употребата на Пилокарпин Вижън**

Вие трябва да използвате Пилокарпин Вижън толкова дълго, колкото е назначено от лекаря. Това лечение помага на вашето състояние, дори и да не забелязвате разлика в начина, по който се чувствате. Ако е необходимо да спрете лечението, Вашият лекар ще Ви посъветва как да направите това. Не спирайте внезапно лечението. Това може да доведе до рязко повишаване на вътреочното налягане. Винаги завършвайте пълния курс на лечение и не го прекъсвайте защото се чувствате по-добре.

Ако имате въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на всеки 10 души):

- Сърбеж, смъдене и усещане за парене в окото;
- Зачервяване на кожата, поява на обрив със сърбеж (уртикария);
- Подуване, зачервяване и възпаление на клепача;
- Подуване на предната част на окото (конюнктивата);
- Временно замъгляване на зрението;
- Временно влошаване на зрителната острота на далечно разстояние;
- Влошаване на зрителната острота при слабо осветление;
- Уголемяване на кръвоносните съдове в окото;
- Главоболие и болки в очите (особено при млади пациенти в началото на лечението);
- Кървене в предната част на окото;
- Отлепване на ретината.



Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на всеки 1 000 души):

- Прилошаване;
- Повръщане, (гадене, повдигане);
- Диария;
- Повишена секреция на слюнка;
- Повишено отделяне на сълзи;
- Треперене;
- Хрипове и затруднено дишане;
- Промени в кръвното налягане и в сърдечния ритъм.

При продължителна употреба е възможно изменение на лещата на окото, което може да доведе до промени в зрението.

Вие може да не забележите появата на някои от нежеланите реакции. Вашият лекар ще установи дали има наличие на такива по време на контролните прегледи.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ №8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Пилокарпин Вижън**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  
Да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Съхранявайте бутилката плътно затворена.  
Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след съкращението „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите промени в цвета на разтвора или поява на утайка (видими твърди вещества).

След първото отваряне на опаковката можете да използване това лекарство в продължение на 28 дни.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

Какво съдържа Пилокарпин Вижън:

- Активното вещество в 1 ml разтвор е 20 mg пилокарпинов хидрохлорид.



- Другите съставки са: бензалкониев хлорид, хипромелоза, борна киселина, натриев цитрат, натриев хидроксид и/или хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

Как изглежда Пилокарпин Вижън и какво съдържа опаковката:  
Бистър разтвор, свободен от видими частици.

Бяла пластмасова бутилка от 10 ml с апликатор-капкомер, затворена с капачка на винт със защитен пръстен.

1 (една) бутилка заедно с листовка за пациента се опакова в картонена кутия.

**Притежател на разрешението за употреба**

Антибиотик-Разград АД  
бул. "Априлско въстание", № 68, офис 201  
7200 Разград, България

**Производител**

Балканфарма-Разград АД  
бул. "Априлско въстание", № 68  
7200 Разград, България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Антибиотик-Разград АД  
бул. "Априлско въстание", № 68, офис 201  
7200 Разград, България  
тел. 084 613 427  
e-mail: [office@antibiotic.bg](mailto:office@antibiotic.bg)

**Дата на последно преразглеждане на листовката – 01.2019**

