

Листовка: информация за пациента

ЕРДОМЕД 225 mg прах за перорален разтвор  
ERDOMED 225 mg powder for oral solution

20. 01. 2021

ердостеин (erdosteine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Ердомед и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ердомед
3. Как да приемате Ердомед
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ердомед
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1 Какво представлява Ердомед и за какво се използва

Ердомед е муколитик и се прилага за втечняване на секретите при остри и хронични заболявания на респираторната система.

Намалява вискозитета на бронхиалните секрети, което улеснява отхрачването.

Показан е за лечение:

на остри заболявания на дихателната система, съпроводени със свръхотделяне на секрет, като: бронхит, ринит, синусит, ларинго-фарингит;

при обостряне на симптомите при хроничен бронхит и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), в допълнение към антибиотична терапия.

#### 2 Какво трябва да знаете преди да приемете Ердомед

##### Не приемайте Ердомед

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от чернодробна цироза или от недостатъчност на ензима цистатионин синтетаза;
- ако страдате от вродена болест на метаболизма на аминокиселините и по-специално, ако е необходимо да следвате диета без метионин;
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 25 ml/min).

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ердомед.

##### Деца и юноши

Не давайте Ердомед 225 mg на деца под 12 годишна възраст.



### **Други лекарства и Ердомед**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ердомед не трябва да се използва едновременно с лекарства подтискащи кашлицата, тъй като това може да предизвика събиране на секрет в бронхиалното дърво.

Ердомед може да се прилага едновременно с антибиотици и бронходилататори.

### **Ердомед с храна и напитки**

Ердомед може да се приема преди, по време на и след хранене.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ердомед не трябва да се използва в периода на бременност и кърмене.

### **Шофиране и работа с машини**

Ердомед няма или има пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### **Ердомед съдържа захароза и натрий**

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на саше, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

## **3 Как да приемате Ердомед**

Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **Възрастни**

Препоръчителната доза е по 1 саше 2-3 пъти дневно.

Максималната дневна доза е 900 mg, разпределена в 2-3 приема.

### **Деца над 12 години**

По 1 саше два пъти дневно.

Разтворете съдържанието на сашето в около 120 ml течност със стайна температура (вода, чай) и го изпийте.

Разбъркайте, ако е необходимо, докато се получи леко мътна суспензия. Приемете през устата веднага след разтваряне.

Терапевтичният ефект става значителен след третия ден от лечението.

Средната продължителност на лечението за получаване на пълен ефект е 7 дена.

При хронични заболявания Ердомед може да се прилага продължително време.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Ердомед**

При дози надвишаващи терапевтичните (1200 mg/ден) се съобщава за потене, световъртеж и зачервяване на лицето.

### **Ако сте пропуснали да приемете Ердомед**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4 Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко могат да се появят главоболие, чувство за студ, затруднено дишане. Също така се съобщава за промяна във вкуса, гадене, повръщане, диария, стомашни болки. Възможни дерматологични нежелани реакции, проявяващи се много рядко, са уртикария, зачервяване, екзема.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5 Как да съхранявате Ердомед**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6 Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Ердомед прах за перорален разтвор**

- Активно вещество: 225 mg ердостеин (erdosteine)
- Други съставки: захароза, натриев нишестен гликолат, силициев диоксид колоиден, хидратиран, сукралоза, портокалова есенция (царевичен малтодекстрин, алфа токоферол (E307)), ябълчена киселина, безводна.

##### **Как изглежда Ердомед и какво съдържа опаковката**

ЕРДОМЕД 225 mg прах за перорален разтвор е фин, насипен бял прах с характерен приятен аромат и вкус.

ЕРДОМЕД 225 mg се предлага в картонени кутии, съдържащи 20 сашета и приложена листовка за пациента.

##### **Притежател на разрешението за употреба**

Анджелини Фарма България ЕООД  
Бул. „Асен Йорданов“ 10



София 1592, България  
Тел.: + 359 2 975 13 95  
Факс: + 359 2 971 57 45

### **Производител**

ANGELINI PHARMA Česká republika s.r.o  
Páteřní 1216/7, 635 00 Brno  
Чешка Република

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A  
Via Grignano, 43  
24041 Brembate (BG)  
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

**Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2020**

