

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Акимба 1000 mg прах за перорален разтвор

Akimba 1000 mg powder for oral solution

### 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активно вещество в едно саше: Инозин ацедобен димепранол (*Inosine Acedoben Dimepranol*)  
1000 mg.

Помощни вещества с известно действие:

Всяко саше съдържа 2,32 g манитол.

Всяко саше съдържа 8 mg аспартам.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за перорален разтвор.

Бял до почти бял прах с аромат на ягода.

### 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

#### 4.1. Терапевтични показания

Акимба е показан :

- Като имуномодулатор при потиснат или увреден клетъчен имунитет или за лечение на вирусни инфекции като:
  - херпес симплекс и херпес зостер;
  - вирусни хепатити;
  - инфекциозни заболявания (рубеола, варицела, морбили, заушка, грип);
  - вирусни инфекции на дихателните пътища;
  - цитомегаловирусна инфекция;
  - инфекциозна мононуклеоза;
  - афтозен стоматит;
  - подостър склерозиращ паненцефалит.
- В комплексната терапия на папилома вирусни инфекции (кондиломата акумината).

#### 4.2. Дозировка и начин на приложение

##### Дозировка

Дневната доза се определя в зависимост от чистото телесно тегло (без мастната тъкан) на пациента и тежестта на заболяването. Приема се в няколко равни приема, а общата продължителност на лечението при остро протичащи инфекции е 5 -14 дни.

##### Възрастни и лица в старческа възраст

Обичайната дневна доза е 50 mg/kg т.т., приета в няколко равни приема.

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1
Към Рег. № <u>20160213</u>
Разрешение № <u>ВВ/КА/РР-55243</u>
Одобрение № <u>12.07.2021</u>



Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g.

*Педиатрична популация*

Деца над 1 година - обичайната дневна доза е 50 mg/kg т.т., приета в няколко равни приема.

Продължителност на лечението

*Остри заболявания*

Обичайната продължителност на лечението е 5 -14 дни. То трябва да продължи 1 – 2 дни след отзвучаване на клиничната симптоматика или по-дълго според преценката на лекаря.

*Вирусни заболявания с удължено протичане*

Лечението трябва да продължи 1 – 2 седмици след отзвучаване на клиничната симптоматика или по-дълго в зависимост от преценката на лекаря.

*Рекурентни заболявания*

- Начална фаза – необходимо е да се следват препоръките, отнасящи се към продължителността на лечение при остри заболявания.
- Поддържащо лечение – дневната доза може да бъде намалена до 500 – 1000 mg.
- При поява на рецидив лечението започва с препоръчаната дневна доза при остри заболявания, която е необходимо да се прилага 1 – 2 дни след отзвучаване на клиничните прояви. При нужда курсът на лечение се повтаря неколkokратно в съответствие с оценката на клиничното състояние.

*Хронични заболявания*

Препоръчаната дневна доза е 50 mg/kg т.т., която се прилага както следва:

Протичане на заболяването	Продължителност на приема	Продължителност на прекъсването
Асимптоматично	30 дни	60 дни
Леко изразени клинични симптоми	60 дни	30 дни
Тежко изразени клинични симптоми	90 дни	30 дни

Тази схема на лечение може да бъде повторена при необходимост, като пациента трябва да бъде проследяван съгласно указанията за рекурентни заболявания.

Специални показания

*Кондиломата акумината или ендоцервикално-свързани инфекции с човешки папилома вирус (HPV)*

Продуктът се прилага в дневна доза 3 g в продължение на 14 – 28 дни, самостоятелно или в комплексна терапия с конвенционалните локални или хирургични процедури, в съответствие със следната времева схема:

- Ниско-рискови пациенти (имунокомпетентни лица или пациенти с нисък риск за рецидив) – продуктът се прилага в продължение на 14 – 28 дни, което обикновено води до постигане на максимално съотношение изчистване/рецидив на лезиите за 2 или повече месеца след преустановяване на лечението, без прилагане на други лекарствени средства;
- Високо-рискови пациенти\* (лица с имуен дефицит или пациенти с висок риск за рецидив) – продуктът се прилага 5 дни седмично, в 2 последователни седмици на месец, в продължение на 3 месеца, което обикновено води до максимално съотношение изчистване/рецидив на лезиите до края на 3<sup>ти</sup> месец от лечението.

Посочената схема на лечение при необходимост може да бъде повтаряна, а проследяването на пациента се извършва в съответствие с препоръките, посочени при рекурентни заболявания.

\* Профилите на пациентите с висок риск или цервикална дисплазия или с генитални брадавици включва:



- имунодепресия дължаща се на:
  - анамнеза за хронични или рекурентни или други сексуално-предавани болести;
  - противоракова химиотерапия;
  - ежедневна злоупотреба с алкохол.
- Продължителна (повече от 2 години) употреба на перорални контрацептиви
- Концентрация на фолат (сол/естер на фолиева киселина) в еритроцитите 600 pmol/l
- Неконтролиран захарен диабет
- Продължително тютюнопушене
- Атопия
- Чести вагинални сексуални контакти ( $\geq 2 - 6$  седмично) или анален сексуален контакт
- Многобройни сексуални партньори или промяна на постоянен партньор
- Генитални брадавици в продължение на  $> 2$  години или  $> 3$  неуспешни лечения, по анамнестични данни
- Отсъствие на анамнестични данни за брадавици по кожата в детството

*Субакутен склерозиращ паненцефалит (SSPE)*

Дневната доза е 100 mg/kg т.т., като максималната дневна доза не трябва да превишава 3 - 4 g. Продуктът трябва да се прилага продължително при регулярно проследяване на клиничното състояние и оценка на необходимостта от удължаване на лечението.

Начин на приложение

Съдържимото на едно саше се разтваря в чаша с малко количество вода (100 ml) и се разбърква добре до получаване на хомогенен разтвор.

**4.3. Противопоказания**

- Свръхчувствителност към инозин ацедобен димепранол или към някое от помощните вещества, изброени в т. 6.1.
- Подагра в остра форма.
- Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта.

**4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба**

В хода на лечението е възможно преходно повишение на изходните нива на пикочната киселина в кръвта и урината, които обичайно остават в референтни граници. Това повишение се отнася особено за мъжете и застаряващата популация от двата пола и се дължи на катаболния метаболизъм при човека на инозиновия компонент до пикочна киселина. Повишението на нивата на пикочната киселина не е свързано с индукция на ензимната активност или в елиминационната функция на бъбреците. Пред вид това, продуктът може да се прилага с повишено внимание при пациенти с подагра, която не е в активна фаза в периода на лечение, хиперурикемия, уролитиаза или при пациенти с нарушения на бъбречната функция при редовно мониториране на стойностите на пикочната киселина.


В хода на лечението не може да бъде изключена поява на остри реакции на свръхчувствителност като уртикария, ангиоедем, анафилаксия, което изисква незабавно прекратяване приема на продукта.

Продължителното лечение може да доведе до нефролитиаза.

В хода на продължително лечение е необходимо проследяване на стойностите на пикочната киселина в кръвта и/или урината, кръвната картина и на показателите на чернодробната и бъбречна функция.

Това лекарство съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия.

**4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**



Повишено внимание е необходимо при едновременно приложение със следните лекарствени продукти:

- инхибитори на ксантинооксидазата (алопуринол) или урикозурични средства;
- тиазидни диуретици (хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид);
- бримкови диуретици (фуросемид, етакринова киселина и др.).

Продуктът не трябва да се прилага едновременно с имunosупресивни средства поради възможни взаимодействия на фармакокинетично ниво, които могат да повлияят терапевтичния ефект. След приключване на имunosупресивната терапия е възможно приложението на инозин ацедобен димепранол.

Инозин ацедобен димепранол усилва действието на азидотимидин (AZT) при едновременно приложение в резултат на увеличено формиране на AZT нуклеотиди вследствие на повишена бионаличност на AZT и повишена вътреклетъчна фосфорилация в кръвните моноцити.

#### 4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

##### Фертилитет

Няма данни относно действието на инозин ацедобен димепранол върху фертилитета при хора.

##### Бременност

Липсват данни от контролирани клинични изпитвания относно ефектите на инозин ацедобен димепранол върху бременността и феталното развитие при хора, поради което продуктът може да се прилага по време на бременността единствено по лекарско предписание след преценка, че потенциална полза за майката надвишава евентуалния риск за плода и новороденото.

##### Кърмене

Инозин ацедобен димепранол се екскретира с майчиното мляко, поради което продуктът може да се прилага по време на кърмене единствено по лекарско предписание след преценка, че потенциална полза за майката надвишава евентуалния риск за кърмачето.

#### 4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Акимба не повлиява или повлиява в пренебрежима степен способността за шофиране и работа с машини.

#### 4.8. Нежелани лекарствени реакции

Единствената постоянно наблюдавана нежелани лекарствена реакция, свързана с приложението на инозин ацедобен димепранол при възрастни и в педиатричната популация е преходното повишение на стойностите на пикочната киселина в кръвта и урината. Обикновено тези стойности остават в референтните граници и стойностите им се нормализират няколко дни след прекратяване на лечението.

Следната терминология е била използвана при класифицирането на нежеланите реакции по отношение на тяхната честота: много чести ( $\geq 1/10$ ), чести ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечести ( $\geq 1/1,000$  до  $< 1/100$ ), редки ( $\geq 1/10,000$  до  $< 1/1,000$ ), много редки ( $< 1/10,000$ ), с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни).

MedDRA SOC/честота	Нежелана лекарствена реакция
Стомашно-чревни нарушения Чести	Повръщане, гадене, дискомфорт на епигастриума
Нечести	Диария, констипация



С неизвестна честота	Болка в горната коремна област
<b>Изследвания</b> Много чести	Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината
Чести	Повишени стойности на кръвната урея, трансаминазите и алкалната фосфатаза
<b>Нарушения на кожата и подкожната тъкан</b> Чести	Обрив, пруритус
С неизвестна честота	Еритем
<b>Нарушения на нервната система</b> Чести	Главоболие, вертиго
Нечести	Сомнолентност, инсомния
С неизвестна честота	Замаяност
<b>Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан</b> Чести	Артралгия
<b>Психични нарушения</b> Нечести	Нервност
<b>Нарушения на бъбреците и пикочните пътища</b> Нечести	Полиурия
<b>Нарушения на имунната система</b> С неизвестна честота	Ангиедем, свръхчувствителност, уртикария, анафилактична реакция

#### Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
тел.: + 359 2 8903417  
уебсайт: www.bda.bg

#### 4.9. Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране. При необходимост се прилага симптоматично лечение и подходящи поддържащи мерки.

### 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

#### 5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антивирусни средства за системно приложение  
АТС код: J05AX05

#### Механизъм на действие

Нормализира недостатъчния или нарушен клетъчно-медиран имунитет чрез:



- предизвикване на Th1 отговор, който от своя страна инициира узряването и диференцирането на Т лимфоцитите;
- потенциране на индуцираните лимфопролиферативни реакции в митоген- или антиген-активирани клетки.

Инозин ацедобен димепранол модулира цитотоксичността на Т лимфоцитите и на естествените клетки-убийци, както и функциите на CD8<sup>+</sup> супресорните и CD4<sup>+</sup> хелперните клетки.

Повишава броя на IgG и комплемент-повърхностните маркери. Увеличава производството на IL-1 и подпомага продукцията на IL-2, регулирайки възходящо експресията на IL-2 рецептора в условия *in vitro*.

Увеличава ендогенната секреция на IFN- $\gamma$  и намалява *in vivo* продукцията на IL-4. В допълнение потенцира химиотаксиса и фагоцитозата при неутрофилите, моноцитите и макрофагите.

Установено е, че *in vivo* инозин ацедобен димепранол подпомага потенцирането на потиснатия синтез и транслационна способност на иРНК на лимфоцитите, като едновременно с това инхибира синтеза на вирусната РНК посредством :

- промяна в инозин-медираното включване на оротовата киселина в полирибозомите;
- потискане на залавянето на полиадениловата киселина към иРНК на вируса;
- молекулярна реорганизация на трансмембранните протеинови комплекси, ангажирани в пренасянето на сигнала чрез специфичен Т-клетъчен рецептор в лимфоцитните вътрешмембранни плазмени частици, като увеличава трикратно плътността им.

Инозин ацедобен димепранол инхибира фосфодиестеразата на цикличния гуанозин 3',5'-монофосфат само във високи концентрации в *in vitro* условия и при нива, невключени в проявите на имунофармакологичните ефекти *in vivo*.

#### Фармакологични ефекти

Инозин ацедобен димепранол е синтетично пуриново производно с имуномодулиращи и противовирусни свойства, които водят до усилване на имунния отговор на организма.

#### **5.2. Фармакокинетични свойства**

##### Абсорбция

След перорално приложение инозин ацедобен димепранол се абсорбира бързо и пълно ( $\geq 90\%$ ).

##### Разпределение

Преминава в значителен брой телесни тъкани, като най-големи количества на белязан инозин ацедобен димепранол се установява в бъбреците, белия и черния дроб, сърцето, далака, тестисите, панкреаса, мозъка и скелетната мускулатура.

##### Биотрансформация

След прием на дневна доза от 1 g при човека са установени следните метаболити N,N-диметиламино-2-пропанол (DIP) и p-ацетамидобензоена киселина (PACBA), като техните плазмени нива са били 3,7 mcg/ml на 2<sup>та</sup> час след приема и 9,4 mcg/ml на 1<sup>ва</sup> час след приема, съответно.

Данните от клинични изпитвания при хора показват, че максималното повишение на плазмените концентрации на пикочната киселина като маркер за внесеното в организма количества инозин не показва линеен характер и в рамките на 3 часа след приема варира в границите  $\pm 10\%$ .

При човека основен метаболит на DIP е N-оксид, а на PACBA – o-ацилглюкуронид.

##### Елиминиране

След прием на доза от 4 g в steady-state условия, 24-часовата екскреция с урината на PACBA и нейният основен метаболит достига 85%.

95% от установената радиоактивност в урината, дължаща се на DIP се реализира от неметаболизирания DIP и неговия N-оксид.

Времето на полуживот на DIP е 3,5 ч., а за PACBA – 50 минути.



### **5.3. Предклинични данни за безопасност**

В изследвания върху животни е установено, че стойностите на средната летална доза ( $LD_{50}$ ) надвишават максималната терапевтична доза при хора средно 50 пъти.

Няма данни за мутагенна активност и канцерогенен потенциал.

Не е установено тератогенно и ембриотоксично действие, както и неблагоприятни ефекти върху фертилитета, бременността и раждането.

## **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

### **6.1. Списък на помощните вещества**

Манитол  
Аспартам (E 951)  
Ацесулфам калий  
Силициев диоксид, колоиден безводен  
Аромат на ягода (смес на ароматни вещества и малтодекстрин)

### **6.2. Несъвместимости**

Не са известни.

### **6.3. Срок на годност**

3 години.

### **6.4. Специални условия на съхранение**

Да се съхранява при температура под 25 °C.  
Да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

### **6.5. Вид и съдържание на опаковката**

Прах за перорален разтвор 3,4 g в саше от хартия/алуминий/полиетилен.  
Една опаковка съдържа 10 или 20 броя сашета.

### **6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа**

Няма специални изисквания.

## **7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Адифарм ЕАД  
бул Симеоновско шосе № 130  
1700 София  
България



**8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Рег. № 20160213

**9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Дата на първо разрешаване: 24.06.2016

Дата на последно подновяване:

**10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА**

Май, 2021

