

**ЛИСТОВКА**

**Симбикорт Турбухалер 320 микрограмма/9 микрограмма/инхалация, прах за инхалация  
Symbicort Turbuhaler 320 micrograms/9 micrograms/inhalation, inhalation powder**

будезонид/формотеролов фумарат дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate) 07. 01. 2022

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признатите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Симбикорт Турбухалер
3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Симбикорт Турбухалер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва**

Симбикорт Турбухалер е инхалатор, който се използва за лечение на астма при възрастни и юноши на възраст 12 - 17 години. Използва се също и за лечение на симптоми на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), при възрастни на и над 18 години. Той съдържа две различни лекарства – будезонид и формотеролов фумарат дихидрат.

- Будезонид принадлежи към група лекарства, наречени „кортикоステроиди“. Той действа като намалява отока и възпалението в белия Ви дроб и предотвратява развитието им.
- Формотеролов фумарат дихидрат принадлежи към група лекарства, наречени „дългодействащи бета<sub>2</sub>-адренорецепторни миметици“ или „бронходилататори“. Той действа като отпуска мускулите на въздухоносните пътища. Това улеснява дишането.

**Астма**

За лечение на астма Вашият лекар ще Ви предпише два инхалатора: Симбикорт Турбухалер и отделен инхалатор „за облекчаване на симптоми“.

- Използвайте Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това помага да не се появяват симптомите на астмата.
- Използвайте инхалатора си „за облекчаване на симптоми“ тогава, когато имате симптоми на астма, за да облекчите дишането си.

Не използвайте Симбикорт Турбухалер за облекчаване на симптомите на астма.

**Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)**

Симбикорт Турбухалер може да се използва и за лечение на симптомите на ХОББ при възрастни. ХОББ е хронично заболяване на дихателните пътища в белите дробове, което често се дължи на тютюнопушене.



## 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Симбикорт Турбухалер

### Не използвайте Симбикорт Турбухалер:

- ако сте алергични към будезонид, формотерол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), която е лактоза (съдържа малки количества млечен протеин).

### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Симбикорт Турбухалер, ако:

- Вие имате диабет;
- Вие имате белодробна инфекция;
- Вие имате високо артериално налягане или някога сте имали проблем със сърцето (включително неравномерен сърден ритъм, ускорен пулс, стесняване на артериите или сърдечна недостатъчност);
- Вие имате проблеми с щитовидната жлеза или с надбъбречните жлези;
- Вие имате ниско ниво на калий в кръвта;
- Вие имате тежко чернодробно заболяване.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

### Други лекарства и Симбикорт Турбухалер

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

В частност, уведомете лекаря или фармацевта си, ако използвате някое от следните лекарства:

- Бета-блокери (като атенолол и пропранолол, използвани за лечение на високо артериално налягане), включително и под формата на капки за очи (като тимолол, използван за лечение на глаукома).
- Лекарства за лечение на ускорен или неравномерен сърден ритъм (като хинидин).
- Лекарства като дигоксин, използвани често за лечение на сърдечна недостатъчност.
- Диуретици, наричани още „отводняващи“ (като фуроземид). Те се използват за лечение на високото артериално налягане.
- Кортикоステроиди, които се приемат през устата (като преднизолон).
- Ксантинови медикаменти (като теофилин или аминофилин). Те се използват често за лечение на астма.
- Други бронходилататори (като салбутамол).
- Трициклични антидепресанти (като амитриптилин) и антидепресанта нефазодон.
- Фенотиазинови медикаменти (като хлорпромазин и прохлорперазин).
- Лекарства, наречени „HIV-протеазни инхибитори“ (като ритонавир), използвани за лечение на HIV-инфекциията.
- Лекарства за лечение на инфекции (като кетоконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол, кларитромицин и телитромицин). Лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (като леводопа).
- Лекарства за лечение на заболявания на щитовидната жлеза (като левотироксин).

Ако някое от изброените важи за Вас или не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

Също така уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако Ви предстои операция или стоматологична манипулация под обща упойка.

### Бременност, кърмене и фертилитет

- Ако сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да използвате Симбикорт Турбухалер – не използвайте Симбикорт Турбухалер, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го използвате.
- Ако забременеете, докато използвате Симбикорт Турбухалер, не спирайте да го използвате, а незабавно се свържете с Вашия лекар.



- Ако кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

#### **Шофиране и работа с машини**

Симбикорт Турбухалер не засяга или засяга в пренебрежима степен способността Ви да шофирате или да работите с инструменти и машини.

#### **Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза**

Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза, която представлява вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него, преди да започнете да използвате това лекарство. Количество лактоза, съдържащо се в това лекарство, обикновено не предизвика проблеми при хора с непоносимост към лактоза.

Помощното вещество лактоза съдържа малко количество млечни протеини, които могат да причинят развитие на алергични реакции.

### **3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер**

- Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Важно е да използвате Симбикорт Турбухалер всеки ден, дори и да нямаете симптоми на астма или ХОББ.
- Ако използвате Симбикорт Турбухалер за лечение на астма, Вашият лекар ще иска да проверява редовно какви симптоми имате.

Ако приемате кортикоステроидни таблетки за астмата си или за ХОББ, Вашият лекар може да намали броя на таблетките, които взимате, след като започнете да използвате Симбикорт Турбухалер. Ако приемате кортикоステроидни таблетки от дълго време, Вашият лекар може да иска да Ви прави изследвания на кръвта от време на време. Когато намалявате пероралните кортикоステроидни таблетки, може да почувствате общо неразположение, въпреки че симптомите от гръденния Ви кош може да се подобряват. Може да изпитате симптоми като запущен или течащ нос, слабост или ставна и мускулна болка, и обрив (екзема). Ако някой от тези симптоми Ви притеснява или ако се появят симптоми като главоболие, умора, гадене или повръщане, моля свържете се с Вашия лекар незабавно. Може да се наложи да приемете друго лекарство, ако развиете алергични или артритни симптоми. Трябва да говорите с лекаря си, ако се притеснявате дали трябва да продължите да използвате Симбикорт Турбухалер.

Вашият лекар може да прецени, че е нужно добавяне на кортикоステроидни таблетки към обичайното Ви лечение по време на периоди на стрес (например, когато имате инфекция в гръденния кош или преди операция).

#### **Важна информация за симптомите на астма или ХОББ**

Ако почувствате, че докато използвате Симбикорт Турбухалер дишането Ви става затруднено или се появяват хрипове, трябва да продължите да го използвате, но веднага, щом това е възможно, трябва да посетите Вашия лекар, защото може да се нуждаете от допълнително лечение.

Незабавно се свържете с лекаря си, ако:

- Дишането Ви става по-трудно или често се събуждате по-често с пристъп на астма.
- Сутрин имате стягане на гърдите или стягането на гърдите продължава по-дълго от обичайно. Тези белези могат да означават, че Вашата астма или ХОББ не е под адекватен контрол и е възможно незабавно да се нуждаете от различно или допълнително лечение.

#### **Астма**

**Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотвратят развитието на симптоми на астма.**



## **Възрастни (на и над 18 години)**

- Обичайната доза е 1 инхалация два пъти дневно.
- Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 2 инхалации два пъти дневно.
- Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

## **Юноши (от 12 до 17 години)**

- Обичайната доза е 1 инхалация два пъти дневно.
- Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

За лечение на деца на възраст от 6 до 11 години е наличен Симбикорт Турбуhaler в по-ниска доза.

Употребата на Симбикорт Турбуhaler при деца на възраст под 6 години не се препоръчва.

Вашият лекар (или медицинска сестра) ще Ви помогне да контролирате астмата си. Те ще подберат най-ниската доза на това лекарство, достатъчна за контролиране на симптомите Ви. Все пак не променяйте дозата, без преди това да сте се посъветвали с лекаря си (или медицинската си сестра).

**Използвайте отделен инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астма, когато се появят такива.** Винаги носете инхалатора за облекчаване на симптомите – в случай че имате нужда от него. Не използвайте Симбикорт Турбуhaler за овладяване на симптомите на астма – използвайте инхалатора за облекчаване на симптомите.

## **Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)**

- За употреба само при възрастни (на възраст на и над 18 години).
- Обичайната дозировка е 1 инхалация 2 пъти дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише и други бронходилататори, например антихолинергични лекарства (като тиотропиев или ипратропиев бромид) при ХОББ.

## **Как да подгответе новия си инхалатор Симбикорт Турбуhaler**

Преди да започнете да използвате **новия си инхалатор Симбикорт Турбуhaler за първи път**, трябва да го подгответе за употреба по следния начин:

- Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете шум.
- Задръжте своя инхалатор Симбикорт Турбуhaler прав, с червения диск отдолу.
- Завъртете докрай червения диск в едната посока. След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване. Няма значение дали щракването ще се появи на първото или второто завъртане.
- Направете същото отново, завъртайки червения диск в двете посоки.
- Вашият инхалатор Симбикорт Турбуhaler вече е зареден и готов за употреба.

## **Как да си направите инхалация**

Следвайте дадените по-долу инструкции при всяка инхалация, която се налага да си правите.

1. Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете шум.

2. Задръжте своя инхалатор Симбикорт Турбуhaler прав, с червения диск отдолу.



3. Когато зареждате своя инхалатор Симбикорт Турбухалер, не дръжте мундшука. За да заредите своя инхалатор Симбикорт Турбухалер с една доза, завъртете докрай червения диск в едната посока.



След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване. Няма значение дали щракването ще се появи на първото или второто завъртане. Вашият инхалатор Симбикорт Турбухалер вече е зареден и готов за употреба. Зареждайте своя инхалатор Симбикорт Турбухалер само тогава, когато трябва да го използвате.

4. Задръжте своя инхалатор Симбикорт Турбухалер далече от устата си. Издишайте спокойно (дотолкова, че да не Ви причинява дискомфорт). Не издишвайте в своя Турбухалер.

5. Внимателно поставете мундшука между зъбите си. Затворете устни. Вдишайте максимално дълбоко и силно през устата. Не дъвчете или хапете мундшука.



6. **Извадете своя инхалатор Симбикорт Турбухалер от устата си. След това издишайте спокойно.** Количеството лекарство, което сте инхалирали, е много малко. Това означава, че след инхалация може да не усещате вкуса му. Обаче, ако сте следвали инструкциите, можете да сте сигурни, че сте инхалирали дозата си и лекарството вече е в белите Ви дробове.

7. Ако трябва да си направите втора инхалация, повторете стъпки от 2 до 6.

8. След употреба сложете обратно и затегнете капачката.



9. След ежедневните си сутрешни и/или вечерни дози изплаквайте устата си с вода, която изплювайте.

Не се опитвайте да махнете или усучете мундшука. Той е свързан с вашия инхалатор Симбикорт Турбухалер и не трябва да се отстранява. Не използвайте своя инхалатор Симбикорт Турбухалер, ако е повреден или мундшукът е отделен от него.

Както е валидно за всички инхалатори, болногледачите трябва да се уверят, че децата, на които е предписан Симбикорт Турбухалер, използват правилна техника на инхалиране, както е описано по-горе.

#### **Как да почиствате своя инхалатор Симбикорт Турбухалер**

Веднъж седмично избръсвайте външната повърхност на мундшука със суха кърпа. Не използвайте вода или други течности.

#### **Кога да започнете да използвате нов Турбухалер**

- Индикаторът за дозите Ви показва колко дози (инхалации) са останали във Вашия инхалатор Симбикорт Турбухалер, като при пълен инхалатор броенето започва от 60.



- Скалата на индикатора е през 10 дози. Следователно той не показва всяка доза.
- Когато видите за първи път червена черта на ръба на индикатора, остават приблизително 20 дози. За последните 10 дози индикаторът е на червен фон. Когато цифрата „0“ на червен фон



достигне до средата на прозореца, трябва да започнете да използвате нов инхалатор Симбикорт Турбухалер.

Важно:

- Дискът ще продължи да се върти и „щрака”, дори и след като Вашият инхалатор Симбикорт Турбухалер се изпразни.
- Звукът, който чувате при разклащане на своя инхалатор Симбикорт Турбухалер, се дължи на абсорбатора на влага, а не на лекарството. Поради това звукът не може да Ви ориентира колко от лекарството е останало във Вашия инхалатор Симбикорт Турбухалер.
- Ако по грешка преди инхалацията си заредите своя инхалатор Симбикорт Турбухалер повече от веднъж, все пак ще си инхалирате една доза. Индикаторът обаче ще отчете всички заредени дози.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Симбикорт Турбухалер**

Важно е да приемате Вашата доза както е препоръчал Вашият лекар или фармацевт. Вие не трябва да превишавате Вашата предписана доза без да потърсите медицински съвет.

Най-честите симптоми при прием на по-висока от необходимата доза Симбикорт Турбухалер са треперене, главоболие и ускорена сърдечна дейност.

#### **Ако сте пропуснали да използвате Симбикорт Турбухалер**

- Ако сте забравили да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните. Ако обаче наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената.
- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

**Ако развиете някой от следните симптоми, спрете да използвате Симбикорт Турбухалер и незабавно се обърнете към Вашия лекар:**

- Отличане на лицето, особено на устата (на езика и/или гърлото и/или затруднено прегълъдане) или появя на уртикариален обрив наред със затруднено дишане (ангиоедем) и/или внезапно присмоктане. Това може да означава, че сте развили алергична реакция. Такава се развива рядко – при по-малко от 1 на всеки 1 000 души.
- Внезапно, остро развитие на хрипове или задух непосредствено след използването на инхалатора. Ако се развие който и да е от тези симптоми, спрете да използвате инхалатора Симбикорт Турбухалер незабавно и направете инхалация с инхалатора си „за облекчаване на симптоми”. Незабавно се свържете с лекаря си, защото може да се налага промяна на лечението Ви. Това се случва много рядко – при по-малко от 1 на всеки 10 000 души.

**Други възможни нежелани реакции:**

**Чести (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 10 души)**

- палпитации (сърцебиене), треперене. Ако тези нежелани реакции се проявят, те обикновено са леки и най-често при продължаване на лечението със Симбикорт Турбухалер изчезват;
- кандидоза (гъбична инфекция) на устата. Вероятността за развитието ѝ е по-малка, ако, след като използвате своя Симбикорт Турбухалер, редовно изплаквате устата си;



- леки болки в гърлото, кашлица и дрезгав глас;
- главоболие;
- пневмония (инфекција на белите дробове) при пациенти с ХОББ.

Уведомете Вашия лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, докато приемате Симбикорт Турбухалер, тъй като те могат да бъдат симптоми на белодробна инфекция:

- висока температура или втискане;
- повишено образуване на храчки, промяна в цвета на храчките;
- засилване на кашлицата или засилване на проблемите с дишането.

#### **Нечести (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 100 души)**

- неспокойствие, нервност или беспокойство;
- нарушение на съня;
- замаяност;
- гадене;
- ускорена сърдечна дейност;
- кожни хематоми;
- мускулни крампи;
- замъглено зрение.

#### **Редки (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 1 000 души)**

- обриви, сърбеж;
- бронхоспазъм (съкращаване на мускулите на въздухносните пътища, което води до поява на хрипове). Ако веднага след приложение на Симбикорт Турбухалер развиете хрипове, спрете да го използвате и незабавно се свържете с лекаря си;
- понижаване на нивото на калий в серума Ви;
- неравномерен сърден ритъм.

#### **Много редки (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 10 000 души)**

- депресия;
- промени в поведението, особено при деца;
- болка или стягане в гърдите (стенокардия);
- повишаване на кръвната захар;
- промяна на вкуса, например неприятен вкус в устата;
- промяна на артериалното налягане.

Инхалаторните кортикоステроиди могат да повлияват нормалната продукция на стероидни хормони в организма Ви, особено ако ги приемате във висока доза за продължителен период от време. Тези ефекти включват:

- Промяна на костната плътност (отслабване на костите).
- Катаракта (замъгливане на лещата на окото).
- Глаукома (повишено вътрешно налягане).
- Забавяне на растежа при деца и юноши.
- Повлияване на функцията на надбъбречните жлези (малки жлези в непосредствена близост до бъбреците).

Вероятността за развитие на тези ефекти е много по-малка при прием на инхалаторни кортикостероиди, отколкото при прием на кортикостероиди под формата на таблетки.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**България**



Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

## 5. Как да съхранявате Симбикорт Турбухалер

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца..
- Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или на етикета на Вашия инхалатор след надписа „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
- Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Симбикорт Турбухалер

Активните вещества са будезонид и формотеролов фумарат дихидрат. Всяка доза за инхалация съдържа 320 микрограма будезонид и 9 микрограма формотеролов фумарат дихидрат. Другата съставка е лактозаmonoхидрат (която съдържа млечни протеини).

### Как изглежда Симбикорт Турбухалер и какво съдържа опаковката

Симбикорт Турбухалер е инхалатор, съдържащ Вашето лекарство. Прахът за инхалация е бял на цвят. Всеки инхалатор съдържа 60 дози и има бял корпус с червен въртящ се диск. На въртящия се диск има обозначение на Брайлова азбука с цифрата 6 с цел идентификация, за да се отличава от други инхалаторни продукти на AstraZeneca.

Симбикорт Турбухалер се доставя в опаковки от 1, 2, 3, 10 или 18 инхалатора, съдържащи 60 дози. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:  
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Швеция

Производител:  
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Швеция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

АстраЗенека България ЕООД  
Тел.: +359 2 44 55 000

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

Държава

Търговско име и количество на активното вещество



Австрия	Symbicort forte Turbohaler 320 µg/9 µg/inhalation
Белгия	Symbicort forte Turbohaler 320 µg/9 µg/inhalation
България	Симбикорт Турбухалер 320 µg/9 µg /инхалация
Хърватия	Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation
Кипър	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Чехия	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Дания	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation,
Естония	Symbicort Turbuhaler, 320 µg/9 µg
Финландия	Symbicort Turbuhaler forte 320 µg/9 µg/inhalation
Франция	Symbicort Turbuhaler 400 µg/12 µg/inhalation
Германия	Symbicort Turbohaler 320 µg/9 µg/inhalation
Гърция	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Унгария	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Исландия	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Ирландия	Symbicort Turbohaler 400 µg/12 µg/inhalation
Италия	Symbicort 320 µg/9 µg/inhalation
Латвия	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Литва	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Люксембург	Symbicort forte Turbohaler 320 µg/9 µg/inhalation
Малта	Symbicort Turbohaler 400 µg/12 µg/inhalation
Холандия	Symbicort Turbuhaler 400 µg/12 µg/inhalation
Норвегия	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Полша	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Португалия	Symbicort Turbohaler 320 µg/9 µg/inhalation
Румъния	Symbicort Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Словакия	Symbicort Turbuhaler forte 400 µg/12 µg/inhalation
Словения	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Испания	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Швеция	Symbicort forte Turbuhaler 320 µg/9 µg/inhalation
Обединено кралство	Symbicort Turbohaler 400 µg/12 µg/inhalation

Дата на последно преразглеждане на листовката:

<p><i>Подробна и актуална информация за този продукт е достъпна при сканиране със смарт телефон на баркода, помещен в Листовката и върху картонената опаковка. Същата информация е достъпна и на следния URL адрес: <a href="http://www.turbuhaler.bg">www.turbuhaler.bg</a>.</i></p>	<i>место за QR код</i>
---	------------------------

