

20160506

БГ/МА7МР-53171

13-06-2022

**Листовка: информация за потребителя**

**ПараCета 500 mg таблетки**  
**ParaCeta 500 mg tablets**

(парацетамол/paracetamol)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след три дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява ПараCета и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПараCета
3. Как да приемате ПараCета
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПараCета
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява ПараCета и за какво се използва**

ПараCета 500 mg таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигrena, зъббол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.

**Как действия ПараCета**

ПараCета съдържа парациетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипириетик (понижава температурата). ПараCета не дразни стомаха.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПараCета**

**Запомните: ПараCета съдържа парациетамол.**

**Не приемайте с други лекарства, съдържащи парациетамол.**

Не взимайте ПараCета, ако сте алергични към парациетамол или някоя от другите съставки.

**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПараCета, ако:**

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повъръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти - лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- злоупотребявате с алкохол;
- сте бременна или кърмите.



## **Други лекарства и ПараСета**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- флуклоксацилин (антибиотик), тъй като съществува сериозен риск от отклонения в кръвните показатели и алкално-киселинното равновесие (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика), което изисква спешно лечение и може да се прояви особено при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане, сепсис (когато бактерии и техните токсини са попаднали в кръвообращението, което води до увреждане на органите), недохранване, хроничен алкохолизъм и при употреба на максималната дневна доза парацетамол.

## **Бременност и кърмене**

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества. Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

## **3. Как да приемате ПараСета**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.

**Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:**

2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000 mg парацетамол) за период от 24 часа.

**Деца (от 6 до 12 години):**

½ (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6-годишна възраст.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се превишава препоръчаната доза.

**Ако сте приемали повече от необходимата доза ПараСета**

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

**Ако сте пропуснали да приемете ПараСета**

Приемете дозата, когато си спомните. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

**Ако сте спрели приема на ПараСета**

Приемът на ПараСета може да се прекрати по всяко време, в зависимост от Вашето състояние.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всички ги получава.

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, например кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, пропадане на оток по



- устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиеняване.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна Агенция по Лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ №8  
1303 София  
Тел.: + 359 2 890 34 17  
Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Парасета**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  
Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Парасета**

Активната съставка е парацетамол

- Другите съставки са: лактоза монохидрат, повидон, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип A), магнезиев стеарат, силициев диоксид (колоиден, безводен)

##### **Как изглежда Парасета и какво съдържа опаковката**

Всяка една картонена кутия Парасета 500 mg таблетки се състои от 1 блистер, който съдържа 10 бели кръгли таблетки с делителна черта от едната страна.

##### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД  
бул. „Г.М.Димитров“ № 1,  
гр. София 1172, България  
тел.: + 359 2 962 54 54  
факс: + 359 2 960 37 03  
e-mail: [info@tchaikapharma.com](mailto:info@tchaikapharma.com)

*За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на*



*разрешението за употреба:*

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД  
бул. „Г.М.Димитров“ №1, София 1172, България  
тел. 02 / 962 54 54  
факс: 02/ 960 37 03  
e-mail: [info@tchaikapharma.com](mailto:info@tchaikapharma.com)

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

Май, 2022

