

Листовка: информация за пациента №

20220266

СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

STODAL COLD AND COUGH, syrup

Одобрение №

29-09-2022

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**
3. Как да приемате **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА** и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на:

- простуда (хрема, запушен нос, кихане и леки болки в гърлото)
- кашлица (суха и влажна кашлица)

Съдържа пет активни вещества, използвани при следните симптоми:

Dulcamara: Секрети от носа; суха, дрезгава, спастична кашлица; влажна кашлица с обилен секрет.

Ferrum phosphoricum: При първи симптоми на простуда: леки болки в гърлото, суха кашлица с влошаване през нощта, запушване на носа; спастична кашлица.

Hydrastis canadensis: Стичащи се секрети при задна хрема и суха кашлица; при типични симптоми при ринофарингити.

Kalium bichromicum: Хрема с раздразнена и възпалена лигавица на носа; гъст секрет от носа, запушен нос, нощна кашлица.

Nux vomica: Суха кашлица и хрема (при ринит) с многократни кихания; течаш нос през деня и запушен нос през нощта.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**

Не приемайте **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете **СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА**.



- Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.
- Това лекарство съдържа 4,3 g или 13,0 g захароза съответно на доза от 5 или 15 ml. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.
- Това лекарство съдържа натриев бензоат, еквивалентен на 11,2 mg бензоена киселина и 2,1 mg натрий във всеки 5 ml и 33,6 mg бензоена киселина и 6,3 mg натрий във всеки 15 ml от сиропа.
Бензоената киселина може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (на възраст до 4 седмици).
- Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 5 ml и 15 ml, което по същество означава „без натрий“.

Други лекарства и СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА с храна, напитки и алкохол

Неприложимо.

Бременност, кърмене и фертилитет

Този лекарствен продукт може да се употребява по време на бременност и кърмене и не оказва влияние върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Възрастни и деца над 12 години: Една доза от 15 ml, измерена с помощта на мерителната чашка, 3 до 5 пъти на ден.

Деца от 2 до 12 години: Една доза от 5 ml, измерена с помощта на мерителната чашка, 3 пъти на ден.


Деца под 2 години: Една доза от 5 ml, измерена с помощта на мерителната чашка, 3 пъти на ден. За да се приложи, сиропът трябва да се разреди в малко количество течност.

Продължителност на лечението

Разредете приемите, веднага щом симптомите се подобрят и спрете приема, когато симптомите изчезнат. Ако симптомите продължават или се влошават, консултирайте се с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.



Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да не се съхранява в продължение на повече от 1 година след отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА

Активни вещества за 100 g сироп:

Dulcamara 5 CH	0.01 g
Ferrum phosphoricum 9 CH	0.01 g
Hydrastis canadensis 9 CH	0.01 g
Kalium bichromicum 9 CH	0.01 g
Nux vomica 9 CH	0.01 g

Другите съставки са:

Течна захароза, пречистена вода, натриев бензоат (E211), лимонена киселина, маноза, Лактоз (E570)

Как изглежда СТОДАЛ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА и какво съдържа опаковката



Този лекарствен продукт се предлага под формата на сироп.
Първичната опаковка е кафява стъклена бутилка тип III (200 ml) с бяла капачка на винт от LDPE и мерителна чашка от PP, поставени в кутия заедно с листовката.

Първичната опаковка е кафява стъклена бутилка тип III (200 ml) със приспособление за отливане от PE, бяла капачка на винт от LDPE и мерителна чашка от PP, поставени в кутия заедно с листовката.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2022

