

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БронхоМАКС
30 mg/5 ml сироп

BronchoMAXX
30 mg/5 ml syrup

Амброксолов хидрохлорид (*Ambroxol hydrochloride*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп
3. Как да приемате БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | |
| Листовка - Приложение 2 | |
| Към Рег. № | 20180052 |
| Разрешение № | BG/МММ. 60973 |
| Одобрение № | 24-11-2022 |

1. **Какво представлява БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп и за какво се използва**

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп е показан при остри и хронични заболявания на дихателната система, протичащи с образуване на гъст секрет в дихателните пътища. По този начин се улеснява отделянето му, облекчава се кашлицата и се подобрява дишането.

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп съдържа амброксолов хидрохлорид, който втечнява бронхиалния секрет и засилва движението на ресничките на бронхиалната лигавица, което води до усилено отделяне на секрета.

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп**

Не приемайте БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към бромхексин или неговото производно амброксол, или някое от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Алергичната реакция може да се разпознае по появата на: обрив, сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.
- Ако сте бременна в първите три месеца от бременността.
- Ако провеждате лечение на язва на стомаха и/или на дванадесетопръстника.

Предупреждения и предпазни мерки

- Консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате БронхоМАКС в случай, че страдате от бъбречна или чернодробна недостатъчност.



- Не приемайте БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп, ако имате назначено лечение с кодеин или други противокашлични средства. Когато тези лекарства се прилагат съвместно, отстраняването на обилните секрети от дихателните пътища се затруднява.
- Съществуват много редки съобщения за пациенти, при които след употребата на амброксол са се появили остри кожни реакции с нарушаване целостта на кожата, разязвяване или мехури (синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайл). Затова, ако забележите поява на реакции от страна на кожата и лигавиците, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар и да преустановите употребата на БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп.

Други лекарства и БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Особено важно е да информирате Вашия лекар:

- Ако вземате антибиотици като амоксицилин, цефуроксим, доксицилин и еритромицин, тъй като съвместната употреба с амброксолов хидрохлорид води до по-висока концентрация на антибиотика в бронхиалния секрет и слюнката.
- Ако вземате атропин, амантадин, трициклически антидепресанти, халоперидол, блокери на H1 рецепторите и прокаиамид. Те потискат активността на ресничките и намаляват отделянето на секрет.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Безопасността на този продукт по време на бременност не е доказана. Използването му по време на първия триместър не се препоръчва.

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп преминава в кърмата. Ако сте бременна, мислите че сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма данни БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп съдържа сорбитол. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп съдържа метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, поради което може да причини алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) и много рядко бронхоспазм.

3. Как да приемате БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

Този продукт се отпуска без лекарско предписание. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп се приема през устата.

Препоръчителната дозировка на БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп за възрастни и деца над 12 години:

Начална доза: през първите 2-3 дни по 10 ml 2 пъти дневно (5 ml = 1 чаена лъжичка). Впоследствие дозата трябва да се намали на 5 ml 2 – 3 пъти дневно.

Продължителност на лечението е от 8 до 10 дни.

За приложение при деца под 12 години използвайте БронхоМАКС 15 mg/5 ml сироп.

Ако сте използвали повече от необходимата доза БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп, ако смятате, че сте приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

Ако сте пропуснали да приемете една доза, можете да я вземете веднага щом се сетите. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза както обикновено.



Ако сте спрели приема на БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп е необходимо да бъде приеман само при нужда, и употребата му да бъде преустановена след затихване на симптомите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

- Обикновено БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп се понася добре. По-рядко срещани нежелани реакции са: гадене, повръщане, диария, обрив, сърбеж, уморяемост и главоболие. Възможно е преходно увеличение на някои ензими (AST, ALT).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Вие можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителната Агенция по Лекарствата

ул. Дамян Груев No 8,

1303 София

тел. +359 2 8903417,

уебсайт www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отбелязана върху опаковката

Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката – 28 дни.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп

- Активното вещество е: амброксолов хидрохлорид. Всяка доза от 5 ml БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп съдържа 30 mg амброксолов хидрохлорид.



- Другите съставки са: лимонена киселина монохидрат, течен сорбитол (Е 420), глицерол, метил парахидроксibenзоат (Е 218), пропилен парахидроксibenзоат (Е 216), пропиленгликол, ароматизатор малина, пречистена вода.

Как изглежда БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп и какво съдържа опаковката

БронхоМАКС 30 mg/5 ml сироп е бистър, светложълт разтвор, с плодов аромат на малина, в тъмна бутилка от полиетилентерефталат (PET) по 100 ml и 120 ml, с бяла бандеролова капачка на винт, поставена заедно с мерителна чашка в индивидуална картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

ДАНСОН-БГ ООД
ул. "Отец Паисий" № 26
2400 гр. Радомир
България
тел.: 024519300
e-mail: office@danhson.com

Производител

ВЕТПРОМ АД,
ул. "Отец Паисий" № 26
2400 гр. Радомир
България
тел.: 024519300
e-mail: office@danhson.com

Дата на последно преразглеждане на листовката
октомври, 2022 г.

