

Листовка: информация за пациента

Амоксиклав 500 mg/125 mg филмирани таблетки
Amoksiklav 500 mg/125 mg film-coated tablets
Амоксицилин/клавуланова киселина
(Amoxicillin/clavulanic acid)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Амоксиклав и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Амоксиклав
3. Как да приемате Амоксиклав
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амоксиклав
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Амоксиклав и за какво се използва

Амоксиклав е антибиотик и действа като унищожават бактериите, които причиняват инфекции. Той съдържа две различни лекарства, наречени амоксицилин и клавуланова киселина. Амоксицилин принадлежи към групата лекарства, наречени "пеницилини", чието действие понякога може да бъде прекратено (да станат неактивни). Другият активен компонент (клавуланова киселина) не позволява това да се случи..

Амоксиклав се използва при възрастни и деца за лечение на следните инфекции:

- инфекции на средното ухо и синусите
- инфекции на дихателните пътища
- инфекции на пикочните пътища
- инфекции на кожата и меките тъкани, включително зъбни инфекции
- инфекции на костите и ставите

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Амоксиклав

Не приемайте Амоксиклав:

- ако имате алергия (свръхчувствителност) към амоксицилин, клавуланова киселина пеницилин или към някоя от другите съставки на Амоксиклав (посочени в точка 6);
- ако сте имали сериозна алергична реакция (свръхчувствителност) към друг антибиотик. Това може да включва кожен обрив или оток на лицето или шията.
- ако някога сте имали проблеми с черния дроб или жълтеница (пожълтяване на кожата) при приемане на антибиотик.

Не приемайте Амоксиклав, ако някое от горепосочените неща се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете Амоксиклав.

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство, ако:

- имате жлезиста треска
- сте лекувани за чернодробни или бъбречни проблеми
- не уринирате редовно

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените неща се отнася за Вас, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема.

В някои случаи лекарят може да изследва вида на бактерията, която причинява Вашата инфекция. В зависимост от резултатите, може да Ви се предпише Амоксиклав с различно съдържание на активното вещество или друго лекарство.

Състояния, за които трябва да внимавате

Амоксиклав може да влоши някои съществуващи състояния или да причини сериозни странични реакции. Сред тях са алергични реакции, гърчове (припадъци) и възпаление на дебелото черво. Трябва да внимавате за определени симптоми, докато приемате това лекарство, за да се намали рискът от проблеми. Вижте „Състояния, за които трябва да внимавате” в **точка 4**.

Изследвания на кръв и урина

Ако Ви се правят кръвни изследвания (като изследване на състоянието на червените кръвни клетки или изследвания на чернодробната функция) или изследвания на урина (за кръвна захар), предупредете лекаря или медицинската сестра, че приемате Амоксиклав. Това е необходимо, защото Амоксиклав може да повлияе на резултатите от тези видове изследвания.

Други лекарства и Амоксиклав

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, или е възможно да приемете други лекарства.

Ако приемате алопуринол (използван за лечение на подагра) с Амоксиклав, може да има по-голяма вероятност да получите алергична кожна реакция.

Ако приемате пробенецид (използва се за лечение на подагра): лекарят може да реши да коригира дозата на Амоксиклав. Съпътстваща употреба на пробенецид не се препоръчва, защото може да намали отстраняването от организма на амоксицилин.

Ако лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци (например варфарин), се приемат заедно с Амоксиклав тогава може да са необходими допълнителни изследвания на кръвта.

Амоксиклав може да повлияе на начина, по който действа метотрексат (използва се за лечение на рак, тежък псориазис или ревматични заболявания): Пеницилините може да намалят отстраняването от организма на метотрексат, като по този начин може да причинят увеличаване на нежеланите реакции.

Ако приемате микофенолат мофетил (използван за потискане на имунната система при трансплантации) е необходимо клинично наблюдение отблизо по време на едновременното приложение с антибиотика и кратък период след това.


Амоксиклав с храна и напитки

За да сведете до минимум вероятността за стомашно-чревна непоносимост, приемайте таблетките непосредствено преди хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Трябва да се вземе предвид възможността за повишаване на чувствителността.



Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате някакви лекарства.

Шофиране и работа с машини

Амоксиклав може да предизвика нежелани реакции и симптомите може да Ви направят неспособни да шофирате.

Не трябва да шофирате или да работите с машини, ако не се чувствате добре.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в една доза, т.е може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Амоксиклав

Винаги приемайте Амоксиклав точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца с телесно тегло над 40 kg

Обичайната доза е:

- 1 таблетка три пъти на ден

Деца с телесно тегло под 40 kg.

Деца на възраст 6 години или по-малко е за предпочитане да бъдат лекувани с перорална суспензия или сашета амоксицилин/клавуланова киселина.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, когато давате таблетки Амоксиклав на деца с тегло по-малко от 40 kg.

Пациенти с бъбречни и чернодробни проблеми

- Ако имате проблеми с бъбреците, дозата може да бъде променена. Вашият лекар може да избере различно съдържание на активното вещество или различно лекарство.
- Ако имате проблеми с черния дроб, може да Ви се правят по-често кръвни изследвания, за да се види как работи черният Ви дроб.

Как да приемате Амоксиклав

- Приемайте таблетките в началото на храненето или малко преди това.
- Разделяйте дозите равномерно през деня, най-малко на 4 часа. Не приемайте 2 дози за 1 час.
- Не приемайте това лекарство повече от 2 седмици. Ако все още се чувствате недобре, трябва да отидете отново на лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амоксиклав

Ако приемете повече от необходимата доза Амоксиклав, признаците може да включват стомашно неразположение (гадене, повръщане или диария) или гърчове. Консултирайте се с Вашия лекар, колкото е възможно по-скоро. Вземете опаковката с лекарството, за да я покажете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Амоксиклав

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете я веднага, когато се сетите. Не трябва да приемате следващата доза прекалено скоро, а изчакайте поне 4 часа преди да я приемете.

Ако спрете да приемате Амоксиклав.

Продължавайте да приемате Амоксиклав до завършване на лечението, дори и да се чувствате по-добре. Вие се нуждаете всяка доза, за да се подпомогне борбата с инфекцията. Ако някои бактерии оцелеят, това може да възобнови инфекцията.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Амоксиклав може да предизвика нежелани лекарствени реакции, макар че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да внимавате

Алергични реакции

- кожен обрив
- възпаление на кръвоносните съдове (*васкулит*), което може да се прояви като червен или виолетов релефен обрив по кожата, но може да засегне други части от тялото
- повишена температура, ставни болки, подути лимфни възли в областта на шията, под мишниците или в слабините
- подуване, понякога на лицето или гърлото (*ангиоедем*), причиняващо затруднение на дишането
- припадък
- гръдна болка при алергична реакция, която може да е симптом на предизвикан от алергичната реакция сърдечен инфаркт (синдром на Кунис).

→ **Обърнете се незабавно към лекар, ако получите някой от тези симптоми. Спрете приема на Амоксиклав.**

Възпаление на дебелото черво

Възпаление на дебелото черво, което причинява водниста диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха и/или повишена температура.

Остро възпаление на панкреаса (остър панкреатит)

Ако имате силна и продължителна болка в областта на стомаха, това може да е признак на остър панкреатит.

Ентероколитен синдром, предизвикан от прием на лекарството:

Има съобщения за ентероколитен синдром, предизвикан от прием на лекарството, главно при деца, приемащи амоксицилин/клавуланат. Това е определен вид алергична реакция с водещ симптом многократно повръщане (1 – 4 часа след прием на лекарството). Допълнителни симптоми могат да бъдат болка в корема, летаргия, диария и ниско кръвно налягане.

→ **Обърнете се към Вашия лекар за съвет възможно най-бързо, ако получите тези симптоми.**

Други нежелани реакции

Много чести (засягат повече от 1 на 10 човека)

- диария (при възрастни)

Чести (засягат до 1 на 10 човека)

- млечница (*кандида* - гъбична инфекция на устата, влагалището или кожните гънки)
- гадене, особено при прием на високи дози. Ако това се случи, Амоксиклав да се приема преди хранене.
- повръщане
- диария (при деца)

Нечести (засягат до 1 на 100 души)

- кожен обрив, сърбеж
- надигнат над кожата сърбящ обрив (копривна треска)
- нарушено храносмилане
- замайване
- главоболие

Нечести нежелани реакции, които могат да се изявят при кръвните Ви изследвания.



- повишение на нивата на някои вещества в кръвта (*ензими*), произвеждани от черния дроб.

Редки (засягат до 1 на 1 000 човека)

- кожен обрив, който може да е като мехури и да изглежда като малки мишени (централни тъмни петна заобиколени от по-бледа област, с тъмен пръстен около ръба - *еритема мултиформе*).

→ Ако забележите някоя от тези симптоми, свържете се с лекар незабавно.

Редки нежелани реакции, които могат да се изият при кръвните Ви изследвания:

- малък брой на клетките, участващи в съсирването на кръвта
- малък брой на белите кръвни клетки (обратимо).

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- Разрастване на микроорганизми, които са нечувствителни към антибиотика.
- Алергични реакции (вж. по-горе)
- Възпаление на дебелото черво (виж по-горе)
- Сериозни кожни реакции:
 - широкоразпространен обрив с мехури и белене на кожата, особено в областта на устата, носа, очите и гениталиите (*синдром на Стивънс-Джонсън*), както и по-тежка форма, причиняваща обширно белене на кожата (повече от 30% от повърхността на тялото - *токсична епидермална некролиза*)
 - широкоразпространен червен обрив на кожата с малки мехури, съдържащи гной (*булезен ексфолиативен дерматит*)
 - червен, люспест обрив с подутини под кожата и мехури (екзантематозна пустулоза).
 - грипopodobни симптоми с обрив, повишена температура, подуване на жлезите и резултати от кръвни тестове, които са извън референтните стойности (включително повишени нива на белите кръвни клетки (еозинофилия) и чернодробните ензими) (*Лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)*).
 - кристали в урината, водещи до остро увреждане на бъбреците (урината може да стане мътна и уринирането да е трудно и болезнено).
 - обрив с мехури, подредени в кръг, с образуване на коричка в средата, или като наниз от перли (линеарна IgA болест)
 - възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък (асептичен менингит)

→ Обърнете се към лекар незабавно, ако получите някой от тези симптоми.

- възпаление на черния дроб (*хепатит*)
- жълтеница, причинена от увеличение на билирубина в кръвта (вещество, произвеждано в черния дроб), което може да направи кожата и бялото на очите Ви да изглеждат жълти
- възпаление на тръбичките в бъбреците
- кръвта се съсирва по-бавно
- хиперактивност
- гърчове (при хора, приемащи високи дози Амоксиклав или които имат бъбречни проблеми)
- менингит (възпаление на мозъчните обвивки)
- черен език, който изглежда космат
- оцветяване на зъбите (при деца), обикновено се отстранява с четка.

Нежелани реакции, които могат да се изият при изследванията на кръвта или урината Ви

- сериозно намаляване на броя на белите кръвни клетки
- малък брой на червените кръвни клетки (*хемолитична анемия*)



Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: + 359 2 890 34 17, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Амоксиклав

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, защитен от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Амоксиклав след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност се отнася за последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Амоксиклав

Активните вещества са: амоксицилин и клавуланова киселина.

Всяка таблетка съдържа 500 mg амоксицилин, под формата на амоксицилин трихидрат, и 125 mg клавуланова киселина, под формата на калиев клавуланат.

Другите съставки са:

Сърцевина: колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, натриев нишестен гликолат (Тип А), микрокристална целулоза

Филмово покритие: триетилцитрат, хидроксипропилметилцелулоза (хипромелоза), талк, етилцелулоза водна дисперсия, титанов диоксид.

Как изглежда Амоксиклав и какво съдържа опаковката

Бели до бледо жълти, продълговати, двойно изпъкнали филмирани таблетки с приблизителен размер 10 x 21 mm и вдлъбнат надпис GG N6 от едната страна.

Блистери от Alu/Alu, съдържащи 16 филмирани таблетки.

Ленти от Alu, съдържащи 16 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Словения

Производители

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Австрия



Дата на последно преразглеждане на листовката:
ММ/ГГГГ

Съвет/медицинско образование

Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от бактерии. Те нямат ефект срещу инфекции, причинени от вируси.

Понякога инфекция, причинена от бактерии, не реагира на курс с даден антибиотик. Една от най-честите причини за това е, че бактериите, причиняващи инфекцията, са резистентни на антибиотика, който се приема. Това означава, че те могат да оцелеят и дори да се размножават, въпреки антибиотика.

Бактериите могат да станат резистентни на антибиотици по много причини. Внимателното използването на антибиотици може да помогне да се намали вероятността бактериите да станат резистентни към тях.

Когато Вашият лекар Ви предписва курс на антибиотик, той е предназначен за лечение само на текущото Ви заболяване. Обърнете внимание на следните съвети, за да помогнете да се предотврати появата на резистентни бактерии, които могат да спрат действието на антибиотика.

1. Много е важно да приемате антибиотика в правилната доза, в точното време и в продължение на правилния брой дни. Прочетете инструкциите върху етикета и, ако не разбирате нещо, помолете Вашия лекар или фармацевт да Ви обясни.
2. Не трябва да приемате антибиотик, освен ако не е предписан специално на Вас и трябва да го използвате само за лечение на инфекцията, за която е предписан.
3. Не трябва да приемате антибиотици, които са били предписани на други хора, дори ако те са имали инфекция, подобна на Вашата.
4. Не трябва да давате антибиотици, които са предписани на Вас, на други хора.
5. Ако имате някакви останали антибиотици, когато сте завършили курса според указанията на Вашия лекар, трябва да занесете остатъка до аптеката, за да бъде изхвърлен по подходящия начин.

Lek Pharmaceuticals d.d. е част от компанията  **SANDOZ**

