

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ сублингвални таблетки RHINALLERGY CONTROL sublingual tablets

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да съвсем прекратите приема на лекарството.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ
3. Как да приемате РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за профилактика и лечение на симптоми на сезонен алергичен ринит (сенна хрема):

- кихане, секреция и сърбеж в носа, запущен нос;
- сърбеж, сълзене, усещане за парене и дразнене в очите.

РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ съдържа три активни съставки, традиционно използвани при следните симптоми:

- *Apis mellifica*: за профилактика и лечение на симптомите на алергия: дразнене на лигавицата на носа, съпроведено от сърбеж и усещане за парене; дразнене на очите и клепачите, усещане за парене в очите.
- *Pollens*: за профилактика и лечение на симптоми на сезонен алергичен ринит : кихане, сърбеж в носа, секреция от носа, запущен нос, обилно сълзене.
- *Roumon histamine*: повлияване на предразположението към сезонен алергичен ринит.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Не приемайте РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове лекарства, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Примложение 2	20230144
Към Ред. №	62937
Разрешение №	06 - 07 - 2023
BGMA/MP -	Одобрено



Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в една таблетка, което по същество означава „без натрий“.

Други лекарства и РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ с храна и напитки

Не се очаква специфично взаимодействие с храни и напитки, но за предпочтение е да приемате това лекарство най-малко половин час преди или след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Този лекарствен продукт може да се приема по време на бременност и кърмене и не оказва влияние върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Възрастни и деца над 6 години. При деца под 6 години е необходима консултация с лекар за изясняване на диагнозата.

За профилактика:

Един месец преди обичайната поява на симптомите и през целия период на разпространение на полените, по 1 таблетка на ден.

За лечение:

По 1 таблетка на прием, до 6 таблетки дневно.

При подобряване на симптомите, приемите се разреждат. Приемът се спира, когато симптомите изчезнат.

Консултирайте се с лекар ако симптомите продължават или състоянието се влошава.

Начин на приложение

Сублингвально приложение.

Оставете таблетката да се разтвори под езика. За предпочтение е да приемате това лекарство най-малко половин час преди или след хранене.

Употреба при деца и юноши

При деца под 6 години таблетката се разтваря в малко количество вода.

Ако сте приемали повече от необходимата доза РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Не се очаква особен риск в случай на предозиране.

Вижте точка 6.

Ако сте пропуснали да приемете РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ** след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа **РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ**

Активните вещества за сублингвална таблетка от 250 mg са:

Apis mellifica 15 CH	0,833 mg
Pollens 15 CH.....	0,833 mg
Poumon histamine 15 CH.....	0,833 mg

Другите съставки са: лактоза, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат.

Как изглежда **РИНАЛЕРЖИ КОНТРОЛ** и какво съдържа опаковката

Бяла, цилиндрична, леко двойноизпъкнала сублингвална таблетка.

Картонена кутия, съдържаща 20, 40, 60 или 120 сублингвални таблетки в блистери (PVC/алуминий).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.



Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката

