

Листовка: Информация за потребителя

Neo Emedil 50 mg/50 mg обвити таблетки

Neo Emedil 50 mg/50 mg coated tablets

дименхидринат/кофеин

dimenhydrinate/caffeine

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като ти съдържа важна за Вас информация.

- Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, които не са описани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се почувствате по-добре или ако състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява *Neo Emedil* за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *Neo Emedil*
3. Как да използвате *Neo Emedil*
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате *Neo Emedil*
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информа-

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Примложение 2	Разрешение №
РКН Рег. №	20230052
Разрешение №	63091 26-07-2023
BG/MAM/P -	/
Образение №	/

1. Какво представлява *Neo Emedil* и за какво се използва

Neo Emedil съдържа активните вещества дименхидринат и кофеин.

Дименхидринат е изпитано средство срещу замаяност, гадене и повръщане. То действа директно върху центъра на равновесие и центъра на повръщане в мозъка и затова е подходящ за профилактика и лечение на симптоми на морска и пътна болест (замаяност, гадене и повръщане, причинени от пътуване по море, въздух, с железопътен транспорт, автобус и автомобил).

Кофеинът противодейства на успокоятелния ефект на дименхидринат. Кофеинът стимулира мозъчния кортекс, дихателния и кръвоносния център и сърдечната дейност. 1 филмирана таблетка съдържа приблизително толкова кофеин, колкото ½ чаша филтрирано кафе или 1 чаша черен чай. Кофеинът намалява умората.

Neo Emedil се използва за предотвратяване и лечение на морска и пътна болест при ~~старатни и юноши на възраст над 12 години.~~

Ако след 3 дни не се чувствате добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.



2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *Нeo Еmedил*

Не използвайте *Нeo Еmedил*:

- ако сте алергични към дименхидринат и кофеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- при деца на възраст под 12 години;
- през последните 3 месеца от бременността;
- ако кърмите;
- ако имате остръ пристъп на астма;
- ако страдате от повишено вътрешно налягане (глаукома);
- ако страдате от конвултивни припадъци като спилепсия;
- ако страдате от порфирия (проблеми с образуването на хемоглобин);
- ако имате поставена диагноза феохромоцитом (тумор на сърцевината на надбъбречната жлеза);
- ако имате стесняване на стомашно-чревния тракт или шийката на пикочния мехур;
- ако имате чревна парализа (паралитичен илеус) или чревна обструкция (запушване);
- ако в момента приемате лекарства, известни като МАО-инхибитори (използвани за лечение на депресия) или сте ги приемали в рамките на последната седмица.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате *Нeo Еmedил*.

Бъдете особено внимателни, когато използвате *Нeo Еmedил*, ако:

- страдате от хронични дихателни проблеми, астма или емфизем;
- имате узколемена простата с образуване на остатъчна урина;
- имате повишено мозъчно налягане или намален приток на кръв към мозъка;
- имате недостиг на калий или магнезий;
- имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност);
- страдате от нарушения на сърдечния ритъм или брадикардия (забавена сърдечна дейност);
- имате стомашно-чревни язви и кървене;
- страдате от свръхактивна щитовидна жлеза;
- имате тежка чернодробна и бъбречна дисфункция.

Силно се препоръчва да не консумирате алкохол, докато използвате това лекарство.

И дименхидринатът, и кофеинът могат да предизвикат пристрастяване. Следователно *Нeo Еmedил* трябва да се приемат за възможно най-кратък период от време.

Ако симптомите продължават или ако не реагирате на лечението според очакванията, трябва възможно най-бързо да се консултирате с лекар.


Преди лечение с *Нeo Еmedил* трябва да уведомите вашия лекар, ако сте бременна.

Други лекарства и *Нeo Еmedил*

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или може да използвате други лекарства.

Ефектът от това лекарство и другите лекарства може да бъде взаимно засилен:

- Успокоителни, хапчета за сън, болкоуспокояващи, съдържащи морфин или подобни на морфин вещества и алкохол, могат да намалят въздействието на лекарството.
- Ефектът на лекарствата за нормализиране на високото кръвно налягане може да бъде усилен.
- Някои лекарства за болестта на Паркинсон и депресия (известни като трициклични антидепресанти и МАО-инхибитори) могат да усилят и удължат ефектите на *Нeo Еmedил*. В резултат на това може да настъпи чревна парализа (паралитичен илеус), задържане на урина или остро повишаване на вътрешното налягане.



- Едновременното използване на дисулфирам, бупропион и лекарства, които причиняват мускулни спазми, може да доведе до припадъци.
 - Не приемайте *Нес Емедин* заедно с алкохол.

Нео Емедил не трябва да се приемат едновременно с други лекарства, съдържащи дименхидринат, дифенхидрамин, 8-хлоротеофилин или кофеин.

Трябва да избягвате употребата на *Нес Емедил* съновременно с други лекарства, които допълнително удължават QT интервала (свиване на вентрикуларните мускули на сърцето), например антиаритмични лекарства от клас Ia и III (лекарства, използвани за лечение на нарушения на сърдечния ритъм), антибиотици, антималарийни средства, невролептици (използвани при психични заболявания) и антихистамини, тъй като това може да доведе до нарушения на сърдечния ритъм, пристъпи на замаяност и прималяване или дефицит на калий.

Вредният ефект на някои антибиотици (аминогликозидни антибиотици) и някои лекарства за лечение на рак (цисплатин) върху вътрешното ухо се маскира.

Спрете приема на *Несо Емедил* най-малко 3 дни, преди да си направите тест за алергии, тъй като те могат да доведат до фалшиви резултати.

Нео Емедил с храна, напитки и алкохол

Препоръчва се повищено внимание, ако се приемат в комбинация с хrани и напитки, съдържащи кофеин.

Не приемайте *Неко Емедил* заедно с алкоголем.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

През първите 6 месеца от бременността се препоръчва да потърсите съвет от лекар преди употреба на *Нето Емедил*, за да се вземе предвид съдържанието на кофеин в този продукт.

Не приемайте *Нес Емедил* през последните 3 месеца от бременността, тъй като на този етап те могат да предизвикат раждане.

Не приемайте *Нес Емедил*, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, тъй като това лекарство може да повлияе на реакциите Ви. Това важи особено в случаите на комбиниране с алкохол или други лекарства, които потискат мозъчната функция.

Нето Емедил съдържат захароза (захар)

Това лекарство съдържа захароза. Ако Ви е известно, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете *Нес Емедил* обвити таблетки.

3. Как да приемате *Нес Емедил*

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо попитайте своя лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и юноши на възраст над 12 години да приемат 1 обвита таблетка 30 минути преди началото на пътуването и 1 допълнителна таблетка на всеки 4 – 6 часа след това.

Не превишавайте максималната дневна доза от 6 обвити таблетки.



Обвитите таблетки Neo Емедил трябва да се погълнат с достатъчно количество безалкохолна течност (например 1 чаша вода).

Лечението трябва да продължава възможно най-кратко.

При продължителна употреба лечението трябва да бъде наблюдавано от лекар.

При пациенти в старческа възраст, немощни пациенти и при пациенти с тежко чернодробно увреждане дозата трябва да се намали. Преди приема на това лекарство, дозата трябва внимателно да се адаптира към клиничната картина от лекар.

При пациенти с бъбречно увреждане интервалът между приема на таблетки трябва, в зависимост от степента на увреждане, да се удължи до 6 – 12 часа (при умерено увреждане) или до 12 – 18 часа (при тежко увреждане на бъбреците).

Употреба при деца и юноши

Neo Емедил не са подходящи за деца на възраст под 12 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Neo Емедил

Незабавно се свържете с лекар.

Признаци на предозиране (интоксикация), могат да бъдат променени състояния на съзнанието (като съниливост, халюцинации), състояния на тревожност, възбуда, припадъци, трепор, както и замаяност, понижаване на кръвното налягане, сухота в устата, зачеряване, треска, разпирени зеници, нарушен слух и зренис, нарушения на сърдечния ритъм, ускорен или забавен пулс.

Информация за лекарите:

Терапевтични мерки:

Мерки за намаляване на абсорбцията: промивка на stomахa (лаваж), като стомашната промивка може да донесе полза часове след предозирането, лечение с активен въглен, ускоряване на чревния транзит (натриев сулфат). Лечението на интоксикация с дименхидринат е симптоматично, с поддържачи мерки като изкуствено дишане, интравенозно приложение на течности и външно охлаждане при хипертермия.

Припадъците могат да бъдат контролирани с интравенозен диазепам. Не давайте никакви стимуланти.

Като антидот при централни антихолинергични ефекти могат да се дават повторящи се дози физостигмин (0,02 – 0,06 mg/kg телесно тегло интравенозно). В случай на предозиране с физостигмин се препоръчва атропин.

При хипотония могат да се използват вазопресори като норадреналин или фенилесфрин, но не трябва да се дава адреналин, тъй като може да последва допълнително парадоксално понижение на кръвното налягане.

Ако сте пропуснали да приемете Neo Емедил

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Neo Емедил

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите реакции се използват следните честоти:

- *Много чести ($\geq 1/10$)*
- *Чести (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$)*
- *Нечести (от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$)*
- *Редки (от $\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$)*
- *Много редки ($< 1/10\ 000$)*
- *Неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)*

Възможни нежелани реакции:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много редки: промени в кръвната картина

Психически разстройства

Чести: промени в настроението

Нарушения на нервната система

Нечести: Дименхидринатът причинява умора, а кофеинът действа като стимулант. Въпреки това след прием на *Несо Емедин* може да се появи умора и намалена бдителност, в зависимост от индивидуалната чувствителност и при по-високи дози. Това важи особено за пациенти в старческа възраст и когато таблетките се приемат заедно с алкохол.

Чести: Кофеинът, особено при по-високи дози, често причинява проблеми със заспиването и беспокойство.

Много редки: възбуда, беспокойство, раздразнителност, безсъние, трепор, припадъци

Зрителни нарушения

Редки: зрителни нарушения (при по-високи дози)

Много редки: повишено вътречно налягане

Сърдечно-съдови нарушения

Редки: спадане на кръвното налягане, ускорен пулс

Много редки: нарушения на сърдечния ритъм (при по-високи дози)

Стомашно-чревни разстройства

Нечести: стомашно-чревни смущения, запек

Хепатобилиарни нарушения

Неизвестна честота: чернодробна дисфункция (холестатична жълтеница: жълтеница поради задръстване на жълъчката)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести: сухота в устата, носа и гърлото

Много редки: алергични кожни реакции, сърбеж

Неизвестна честота: фоточувствителност на кожата (предупреждение: избягвайте пряка слънчева светлина)

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Нечести: мускулна слабост

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести: нарушения на изпразването на пикочния мехур

Чести: кофеин: повишено желание за уриниране

Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

Нечести: главоболие

Много редки: реакции на свръхчувствителност и дори анафилактичен шок.



Както и при другите сънотворни (лекарства за предизвикване на сън), зависимост е възможна след продължителна неправилна употреба.

Кожна фоточувствителност по време на лечение с дименхидринат е наблюдавана в единични случаи.

При продължителна употреба на дименхидринат не може да се изключи развитието на лекарствена зависимост поради неговия седативен ефект.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8

1303 София

тел. +35928903417

уебсайт www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате *Neo Емедил*

Да се съхранява при температура под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след обозначението „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат *Neo Емедил*

- Активните вещества са: дименхидринат (*dimenhydrinate*) и кофеин (*caffeine*).
Всяка обвита таблетка съдържа 50 mg дименхидринат (*dimenhydrinate*) и 50 mg кофеин(*caffeine*).

Другите съставки са:

магнезиев стеарат, кросповидон, малтодекстрин, хидроксипропилцелулоза, арабска гума, захароза, метилцелулоза, талк, калициев карбонат, повидон, титанов диоксид, глицерол 85%, силициев диоксид, колоиден безводен, сънсет жълто FCF (E110), кохинилово червено А (E124), монтанов гликолов въсък.

Как изглежда *Neo Емедил* и какво съдържа на опаковката

Кръгли, двойноизпъкнали обвити таблетки с оранжев цвят.

Опаковка от 12 обвити таблетки: 1 блистер в картонена кутия.

Опаковка от 36 обвити таблетки: 3 блистера в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H
Salzbergstrasse 96
6067 Absam/Tirol
Австрия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Март 2023

