

|   |            |
|---|------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА                           |            |
| Листовка Приложение 2   |            |
| Към Ред. № .....  | 20000750   |
| Разрешение № .....  | 63535      |
| Срок годности - .....   | 19-09-2023 |
| 2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол № ..... |            |

### Листовка: информация за потребител

**Нео-ангин 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смукане**  
**2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол**

**Neo-angin 1,20/0,60 mg/5,90 mg lozenges**  
**2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylmetacresol/levomenthol**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин
3. Как да приемате Нео-ангин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. Какво представлява Нео-ангин и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

### 2. Какво трябва да знаете преди да приемете Нео-ангин

#### Не приемайте Нео-ангин

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6 годишна възраст

#### Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захариди, предупредете се с него преди да вземете този продукт.



**Нео-ангин не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.**

**Други лекарства и Нео-ангин**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насконо сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

**Нео-ангин с храни и напитки**

Нео-ангин може да се приема независимо от храненията.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на Нео-ангин по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рисъкът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

**Шофиране и работа с машини**

Нео-ангин не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

**Нео-ангин таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (E124), глюкоза и захароза**

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин съдържа 1,14 g глюкоза и 1,42 g захароза в една таблетка за смучене, което е еквивалентно приблизително на 10 kcal (42 kJ). Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

**3. Как да приемате Нео-ангин**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, моля спазвайте следните указания:  
Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата.  
Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

**Продължителност на лечението**

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или напомогнат след 3-4 дни.



**Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин**  
Няма съобщения за случаи на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин**

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза Нео-ангин, продължете да вземате лекарството според указанията. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели употребата на Нео-ангин**

Няма опасност от възникване на някакви проблеми при спиране на употребата на Нео-ангин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 человека): възпаление на лигавицата на устата и стомаха

Оцветителят кохинил червено А (Е124) може да причини алергични реакции.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Нео-ангин**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25° C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Нео-ангин**

- **Активните вещества са:** 2,4-дихлоробензил алкохол, амилметакрезол, левоментол. Една таблетка за смучене съдържа 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,90 mg
- **Другите съставки са:** масло от звездовиден анисон, ментово масло, захароза, глюкозен сироп, винена киселина, кохинил червено А (E124).

### **Как изглежда Нео-ангин и какво съдържа опаковката**

Червени, кръгли, полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 12, 24, 36 и 48 таблетки за смучене в PVC/алуминиеви блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Divapharma GmbH

12274 Berlin

Германия

### **Дата на последно преразглеждане на листовката**

Август 2023

