

Информация за пациента

Фенистил 24 4 mg x 10 капсули
Fenistil® 24 4 mg x 10 capsules

ИАЛ
ОДОБРЕННОІ
ДАТА ...*26. 06. 07.*

Моля, прочетете я внимателно тази листовка, преди да започнете да го приемате.
Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Фенистил 24?

Фенистил 24 принадлежи към групата медикаменти, наречени антихистамини. Те се използват за облекчаване на кожни алергии, сърбеж, сенна хрема или други форми на алергични ринити.

Всяка капсула Фенистил 24 съдържа 4 mg dimetindene maleate като активна съставка.

Активната съставка се освобождава контролирано от капсулите, което поддържа ефективността на лекарството в продължение на минимум 24 часа.

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, картофено нишесте, глутаминова киселина, силиконова емулсия E 2, метилхидроксипропилцелулоза, титанов диоксид, талк, полиакрилатна дисперсия 30%, аквакоат ECD 30. Капсулите са съставени от желатин, титанов диоксид, жълт железен оксид, червен железен оксид.

2. Как действа Фенистил 24?

Фенистил 24 блокира действието на хистамина – вещество, отделящо се в организма по време на алергична реакция. Той облекчава сърбежа и възпалението при алергични кожни реакции, намалява отока и облекчава симптомите на алергичен ринит, като секреция от носа, дразнене, сърбеж в носа, както и сърбеж и секреция от очите.

3. За какво се използва Фенистил 24?

Фенистил 24 се прилага за лечение при следните индикации:

- сърбеж свързан с алергични кожни реакции, като екзема или дерматит (възпаление на кожата);
- уртикария (сипаница, копривна треска);
- сенна хрема и други форми на алергични ринити (алергии към домашен прах, животни, перушина и др.).

4. Преди да използвате Фенистил 24

Кога не трябва да се използва Фенистил 24 ?

Не използвайте Фенистил 24, ако сте алергичен към някоя от съставките му.

Фенистил 24 не трябва да се прилага при деца под 12 години.

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди да вземете Фенистил 24, при следните случаи:



Бременност и кърмене:

Ако сте бременна или кърмите, не използвайте Фенистил 24, освен ако не ви е предписан от лекар.

Други здравословни проблеми

Информирайте Вашия лекар:

- ако имате някой от следните проблеми: глаукома, затруднения в уринирането поради увеличена простатна жлеза;
- ако вземате антидепресанти (лекарства за депресия), антихолинергични средства (лекарства за коремни и стомашни спазми), или депресанти на централната нервна система (лекарства, които успокояват нервната система), като: транквилянти, седативни средства или лекарства за сън.

Какво още трябва да помните, когато вземате Фенистил 24:

- Като много антихистамини Фенистил 24 може да засили ефекта на алкохола.
- Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

При препоръчителната схема на дозиране и при вечерен прием, Фенистил 24 обикновено не води до намаляване на вниманието и не оказва влияние върху способността за работа и концентрация. Въпреки това, в редки случаи има пациенти, които чувстват умора и намалено внимание и които трябва да проявяват повишено внимание при шофиране и работа с машини.

5. Как се приема Фенистил 24?

Възрастни и деца над 12 години:

По 1 капсула дневно, вечер.

Капсулата трябва да се погълща цяла с чаша вода, без да се чупи или дъвче преди гълтане.

В случай, че работите на смени, Фенистил 24 трябва да се приема преди лягане.

Какво да се прави, ако е пропусната една доза?

Ако забравите една доза, вземете нова веднага след като се сетите, освен ако до следващия прием не остават по-малко от 12 часа. После продължете лечението си по обичайната схема.

Какво да се прави, ако е погълнат твърде много Фенистил 24?

В случай на предозиране веднага се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

6. Какви нежелани ефекти може да има Фенистил 24?

Фенистил 24 обикновено се понася добре и не предизвиква умора и сънливост. Гастроинтестинални смущения, гадене, нервност, главоболие, сухота в устата и световъртеж се проявяват в редки случаи. Има съобщения за изолирани случаи на кожни зачервявания или оток на лицето или гърлото, учестено дишане и мускулни спазми. Ако усетите някой от тези симптоми, спрете употребата на Фенистил и веднага се консултирайте с лекар.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който по Ваша преценка може да е свързан с употребата на Фенистил 24.



7. Как се съхранява Фенистил 24 ?

Допълнителна информация

Не използвайте Фенистил 24 след срока на годност, отбелаязан върху опаковката.

Условия за съхранение:

Да се пази от светлина и влага. Съхранявайте блистера в картонената кутия. Да се съхранява под 30°C.

Пазете всички лекарства далеч от достъпа на деца!

8. Производител

Famar Italia S.p.A., 20021 Baranzate di Bollate (MI) Ital

Последна редакция на листовката – май 1999 г.

