

Листовка: информация за потребителя

СОЛКОСЕРИЛ 2,125 mg/g + 10 mg/g паста за устна лигавица
депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химично и биологично стандартизиран/полидоканол

SOLCOSERYL® 2.125 mg/g + 10 mg/g oromucosal paste
protein-free haemodialysate of calf blood, chemically and biologically standardized/polidocanol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 10 дни Вие не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Солкосерил паста за устна лигавица и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Солкосерил паста за устна лигавица
3. Как да използвате Солкосерил паста за устна лигавица
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Солкосерил паста за устна лигавица
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Рег. № 20050336	
Разрешение № BG/HA/HP-45028	
Одобрение № / 26-03-2019	

1. Какво представлява Солкосерил паста за устна лигавица и за какво се използва

Солкосерил паста за устна лигавица е лекарство, предназначено за лечение на:

- болезнени и възпалителни раздразнения на устната лигавица, венци и устни: афти, гингивит, периодонтит;
- наранявания от зъбни протези;
- проблеми, свързани с никнене на постоянни зъби и мъдреци.

Лекар или фармацевт може да препоръча това лекарство като ранева превръзка след почистване на зъбен камък, кюртаж, периодонтални операции, зъбна екстракция с последващо протезиране, алвеолит.

Солкосерил паста за устна лигавица съдържа като активни вещества депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, който подобрява кръвоснабдяването и полидоканол, който спомага за бързо и трайно намаляване на болката. Пастата образува защитен филм, който прилепва към раната дълго време и я предпазва от дразнене по време на хранене и пиене.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Солкосерил паста за устна лигавица

Не използвайте Солкосерил паста за устна лигавица

- ако сте алергични или свръхчувствителни към активните вещества, консервантите метилпарахидроксибензоат (E218) и пропилпарахидроксибензоат (E216) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- при бебета и деца под 2 години.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако пастата се използва според указанията, не са необходими специални предпазни мерки.



Пастата не трябва да се втрива дълбоко в рани, които наскоро са затворени с шев. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт в случай че:

- лигавицата на устата или раната са инфектирани;
- имате друго заболяване;
- имате алергия или използвате друго лекарство (включително, лекарство без рецепта) или някакво вещество за външно приложение.

В случай на остра инфекция се препоръчва, устата да се изплакне с дезинфектиращи разтвори (хлорхексидин диглюконат).

Деца

Солкосерил паста за устна лигавица е показана при деца, по-големи от 2 години.

При бебета и деца под 2 години ментовото масло и левоментолът, които се съдържат като помощни вещества, е възможно да предизвикат ларингоспазъм, който води до остро нарушение в дишането.

Други лекарства и Солкосерил паста за устна лигавица

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Въз основа на натрупания опит, няма риск, ако Солкосерил паста за устна лигавица се използва правилно. Стандартни клинични изпитвания не са провеждани. Препоръчва се по време на бременност да се въздържате от използването на това лекарство или се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди неговата употреба.

Няма противопоказания при употребата на Солкосерил паста за устна лигавица по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Няма известни данни за нарушаване способността за шофиране и работа с машини.

Солкосерил паста за устна лигавица съдържа консервантите метил- и пропилпарахидроксибензоат (E216 и E218), които могат да причинат алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

3. Как да използвате Солкосерил паста за устна лигавица

Винаги използвайте Солкосерил паста за устна лигавица точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Освен ако няма друго предписание, нанасяйте ивица от пастата (с дължина около 0,5 cm) на тънък слой върху лезията, 3 – 5 пъти дневно. Препоръчва се да се прилага преди лягане.

Пастата се нанася внимателно, без да се втрива. Най-добър начин за нанасяне на пастата е мястото да се подсуши с памучен тампон или хартиена салфетка. След това, пастата се нанася на върха на чист и сух пръст или на памучен тампон. Отворът на тубата да се пази от влага. Нанесете тънък слой от пастата върху раната, без да се втрива. Намокрете пръста или памучния тампон и навлажнете внимателно нанесената паста. При по-големи рани, изплакнете устата с чаша вода. Това ще спомогне пастата да набъбне и да образува защитен филм. В случай на рани от протези, пастата трябва да се нанесе върху измитите и подсушени протези. За да се подобри фиксацията на протезите, изплакнете устата си преди да ги поставите.

Продължителност на лечението: до пълно затваряне на раните.

След използване, затворете тубата добре. Това ще предпази влагата да проникне до отвора.

Спазвайте посочената доза или препоръчаната от лекаря. Ако смятате, че ефектът от лекарството е твърде слаб или много силен, моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Солкосерил паста за устна лигавица може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нарушения на имунната система

Много редки: свръхчувствителност

Нарушения на нервната система

С неизвестна честота: дисгезия

Респираторни, гръдни и меднастинални нарушения

Много редки: диспнея, бронхоспазъм

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

С неизвестна честота: реакции на мястото на приложение (напр. подуване, еритема, парестезия, парене)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Солкосерил паста за устна лигавица

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение.

Срок на годност след първо отваряне: 28 дни.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте тубата плътно затворена, за да предпазите от влага.

Леко гранулираната и суха консистенция на Солкосерил паста за устна лигавица е показател за оптималния адхезивен ефект, а не за влошено качество на продукта. Понякога в отвора на тубата може да се отдели масло, което не повлиява качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Солкосерил паста за устна лигавица

- Активните вещества са: 2,125 mg/g депотеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химично и биологично стандартизиран, 10 mg/g полидоканол 600.
- Другите съставки са: метилпарахидроксибензоат (E218), пропилпарахидроксибензоат (E216), желатин, кармелоза натрий, пектин, полиетилен, течен парафин и ароматни вещества – ментово масло и ментол.



Как изглежда Солкосерил паста за устна лигавица и какво съдържа опаковката

Солкосерил паста за устна лигавица се предлага в туби от 5 g в аптеките, без лекарско предписание.

Притежател на разрешението за употреба

Майлан ЕООД
Офис сграда „Сердика офиси“
бул. Ситняково № 48, ет. 7
1505 София
България

Производител

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2018



Подсушете мястото с памучен тампон или хартиена салфетка.



Нанесете пастата на върха на чист и сух пръст или на памучен тампон. Отворът на тубата да се пази от влага.



Нанесете тънък слой от пастата върху раната, без да се втрива!



Намокнете пръста или памучния тампон и навлажнете внимателно нанесената паста. При по-големи рани, изплакнете устата с чаша вода. Ако се наложи отново да нанесете от пастата, внимавайте върха на пръста да е сух при вземане на пастата от тубата.



В случай на рани от протези, нанесете пастата върху сухи протези.

