

Листовка: информация за потребителя

Съд. Рег. №

2008211

Бевит Форте 100 mg/200 mg/200 микрограма филмирани таблетки
 тиаминов хидрохлорид (витамин В₁), пиридоксинов хидрохлорид (витамин В₆),
 цианокобаламин (витамин В₁₂)

ВБ/Нк/Нр-43182

15-10-2018

Bevit Forte 100 mg/200 mg/200 micrograms film-coated tablets
 thiamine hydrochloride (vitamin B₁), pyridoxine hydrochloride (vitamin B₆),
 cyanocobalamin (vitamin B₁₂)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бевит Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бевит Форте
3. Как да приемате Бевит Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бевит Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бевит Форте и за какво се използва

Витамин В₁ (тиаминов хидрохлорид) поддържа въглехидратния метаболизъм и оказва влияние върху нервната функция.

Витамин В₆ (пиридоксинов хидрохлорид) индуцира метаболизма на аминокиселините в нервната тъкан и оказва влияние върху биосинтезата на редица добре известни медиатори, като допамин, адреналин и норадреналин.

Витамин В₁₂ (цианокобаламин) има ефект особено по отношение на метаболизма на мастните киселини в нервната тъкан и е необходим за растежа и репликацията на клетките.

Бевит Форте се използва за подпомагане на лечението на невропатии като:

- възпалителни и дегенеративни невропатии,
- невралгия и неврит,
- възпаление на нервните коренчета в резултат на дегенеративни заболявания на гръбначния мозък,
- болка и ограничаване на движенията на врата, раменния пояс, ръцете и поясния отдел на гръбначния стълб,
- болка в областта на седалищния нерв,
- внезапна поява на болка в областта на лицето (възпаление на троичния нерв) или в областта на гръдния кош или гръдния пояс (възпаление на междуребрните нерви),
- синдром „ръка-рамо”,
- парализа на мускулите на лицето.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бевит Форте

Не приемайте Бевит Форте

- ако сте алергични към витамин В₁, витамин В₆, витамин В₁₂ или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако сте приемали повече от 3 таблетки дневно Бевит Форте в продължение на повече от 4 седмици е възможна поява на нежелани реакции по отношение на нервната система. Консултирайте се с Вашия лекар за по-нататъшното лечение.

Други лекарства и Бевит Форте

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

При едновременна употреба с **L-Дора** (лекарствен продукт за лечение на **Болест на Паркинсон** или **хипертония**) Бевит Форте може да понижи ефективността на L-Дора.

Бевит Форте с храна и напитки

Приемът на храна усилва резорбцията на витамин В₁ от храносмилателния тракт. Затова таблетките трябва да се приемат с малко течност след хранене.

Не са известни допълнителни влияния на храната и напитките върху Бевит Форте.

Бременност и кърмене

По време на бременност или кърмене **не трябва да се приемат** лекарства, съдържащи витамини от група В.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство..

Шофиране и работа с машини

Не е известно влияние на Бевит Форте върху способностите за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Бевит Форте

Винаги приемайте това лекарство **точно както ви е казал Вашият лекар**. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките трябва да се приемат **цели, с малко течност, след хранене**.
Обичайната доза е 1 таблетка три пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бевит Форте

Уведомете Вашия лекар, ако сте приели твърде много таблетки Бевит Форте, тъй като витамините, които се съдържат в Бевит Форте може да предизвикат поява на определени реакции.

Витамин В₁

Не са известни реакции при предозиране.

Витамин В₆

При прием на повече от 2 g (съответстващи на 10 таблетки Бевит Форте) дневно се съобщава за нарушения на функцията на нервната система като двигателни нарушения, нарушения на сетивността (мравучкане, изтръпване), припадъци и ЕЕГ промени. В редки случаи може да се появят анемия и кожен обрив.

Витамин В₁₂

В редки случаи приемът на много високи дози може да предизвика алергични реакции, екзема и акне.

Ако сте пропуснали да приемете Бевит Форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете да приемате лекарството както обикновено.

Ако сте спрели приема на Бевит Форте

Ако желаете да преустановите приема на Бевит Форте, моля, първо се консултирайте с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Възможна е поява на следните нежелани реакции

Редки (1 до 10 на 10 000 човека)

- Нарушения на нервната система: главоболие, световъртеж,
- Стомашно-чревни нарушения: гадене.

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 човека)

- нарушения на имунната система: реакции на свръхчувствителност, главно върху кожата (обрив, екзема).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: + 35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бевит Форте

Да се съхранява под 25 °С.

Да се съхранява във външната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бевит Форте

- Активните вещества са: тиаминов хидрохлорид (витамин В₁), пиридоксинов хидрохлорид (витамин В₆) и цианокобаламин (витамин В₁₂). Една филмирана таблетка съдържа 100 mg витамин В₁, 200 mg витамин В₆ и 200 микрограма витамин В₁₂.
- Другите съставки са: прежелатинирана скорбяла, натриев цитрат, монохидрат на лимонената киселина, колоиден безводен силициев диоксид, целулоза микрокристална, магнезиев стеарат, повидон, макрогол 6000, титанов диоксид (Е 171), талк, хипромелоза, Еудражит NE.

Как изглежда Бевит Форте и какво съдържа опаковката

Бевит Форте са бели до почти бели на цвят, кръгли и двойно изпъкнали филмирани таблетки.

Бевит Форте се предлага в PVC/PVdC/алуминиеви блистери и алуминий-алуминиеви блистери, съдържащи [20, 30, 50 и 100] филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител
G.L. Pharma GmbH,
Schlossplatz 1
8502 Lannach, Австрия

Дата на последно преразглеждане на листовката
декември/2017

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти

Предозиране:

Витамин В₁

При перорално приложение не са отбелязани симптоми на предозиране.

Витамин В₆

При прием на повече от 2 g дневно са описани невропатии с атаксия и нарушения на сетивността, церебрални конвулсии с ЕЕГ промени и в много редки случаи хипохромна анемия и себореен дерматит.

Витамин В₁₂

След парентерално приложение на високи дози (в редки случаи след перорално приложение), са наблюдавани алергични реакции, екзематозни кожни промени и бенигнена форма на акне.