

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към  
разрешение за употреба №

**SOPHARMA**

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

№ 10/17.12.01

Моля прочетете внимателно тази листовка. Тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

**PHLEBESCI<sup>®</sup>**

**ФЛЕБЕСЦИН<sup>®</sup>**

Лекарствени вещества: Vurphenine hydrochloride,  $\beta$ -Escin

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНА  
ГРУПА

Флебесцин под формата на гел е капиляротоничен и съдоразширяващ лекарствен продукт.

### ПОКАЗАНИЯ

В кои случаи може да се прилага Флебесцин?

Продуктът може да се прилага при разширени вени, възпаление на вените, отоци от тромбофлебити (възпаление на вени с образуване на тромб), контузии и нагъртвания при травми. Профилактично се прилага при болки и тежест в краката при бременност, статични положения, след операции.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В кои случаи не трябва да се прилага?

Флебесцин не трябва да се прилага при свръхчувствителност към продукта, екземи и открити рани.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

В някои случаи при по-чувствителни пациенти могат да се появят повърхностни най-често алергични кожни реакции, които отзвучават след спиране на продукта. Флебесцин е с много добра поносимост, проявява приятно охлаждащ ефект върху кожата, не оставя мазни петна и може да се прилага под превръзка и еластични чорапи.

## ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Досега не са наблюдавани клинично значими лекарствени взаимодействия между Флебесцин и други лекарства.

Трябва да информирате Вашия лекуващ лекар в случай на каквото и да било съпътстващо лечение с други лекарства, с оглед да бъде избегнато евентуално взаимодействие между продуктите.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Гелът се нанася в тънък слой върху кожата на засегнатата тъкан и около нея от 2 до 4 пъти дневно.

Да се избягват масажирането и директното загряване на мястото след намазване.

## НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Какви нежелани реакции могат да настъпят при прилагането на Флебесцин?

При локално прилагане понякога може да се наблюдават сърбеж, зачервяване, парене, обриви.

За всички нежелани лекарствени реакции, включително и неописани в листовката, пациентът трябва незабавно да съобщи на своя лекуващ лекар.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

В оригинална опаковка на защитено от светлина място при температура под 25° С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

## СРОК НА ГОДНОСТ

Две години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност!

## СЪСТАВ

Съдържание в 1 g гел в g:

*Лекарствени вещества:*

Viphenine hydrochloride 0,010

β-Escin 0,010

*Помощни вещества:* Борово масло, лавандулово масло, карбопол, пропиленгликол, изопропилов алкохол, емулгатор 14156, триетаноламин, пречистена вода.

## ДАНИ ЗА ОПАКОВКАТА

По 40 g от продукта се дозират в алуминиеви туби, които се поставят в единични картонени кутии заедно с листовка с указания за употреба.

## НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Без лекарско предписание.

## ПРОИЗВОДИТЕЛ

СОФАРМА АД, България

София, ул. "Илиенско шосе" N 16

## ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

15.01.2002 г.