



## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

### ХЕЛМИЦИД HELMICID сироп

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ.**

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт.
- Този продукт е предписан лично на Вас и не бива да го давате на никой друг. Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

#### **В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Какво представлява Хелмицид и за какво се прилага.
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Хелмицид.
3. Как се прилага Хелмицид.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Условия за съхранение.
6. Допълнителна информация.

Хелмицид, сироп.

Съдържание на лекарственото вещество в 5 ml (една мерителна лъжичка):  
Piperazine hydrate – 1,235 g.

Помощни вещества: захароза, глицерол, метил парахидроксибензоат, етанол, тинктура мента, лимонена киселина, пречистена вода.

Хелмицид, сироп се предлага в тъмни стъклени бутилки от 100 мл, заедно с мерителна лъжичка.

Притежател на разрешението за употреба

"Актавис" ЕАД  
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2  
София, България  
Тел: 9321 762

Производител

"Балканфарма-Троян" АД,  
5600 Троян, ул. "Крайречна" № 1, България  
Тел. (0670) 62 607; Факс: (0670) 62 610

#### **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЕЛМИЦИД И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА**

Хелмицид причинява парализа на нервно-мускулната система на паразитите. Спира активната подвижност на глистите, след което те се изхвърлят навън с изпражненията.

Хелмицид се използва за лечение на заболявания, предизвикани от чувствителни на него паразити:

- Ентеробиоза (опаразитяване с острици, дребни глисти);

- Аскаридоза (опаразитяване с едри глисти).

## **2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХЕЛМИЦИД**

**Хелмицид не се прилага при:**

- Алергия към активното или към някое от помощните вещества;
- Епилепсия;
- Напреднала бъбречна и чернодробна недостатъчност.

**При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:**

При назначаване на диабетици трябва да се вземе в предвид, че Хелмицид съдържа 2 g захароза в 5 ml сироп (една дозова единица).

Да се прилага с повишено внимание на деца поради потенциалния невротоксичен ефект на продукта. Поради това при тях трябва да се избягва многократното и продължително приемане.

**Приложение на Хелмицид и прием на храни и напитки:**

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

**Бременност и кърмене**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт*

Хелмицид не се прилага по време на бременност и кърмене.

**Шофиране и работа с машини**

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

**Важна информация относно някои от съставките на Хелмицид**

Поради наличието в състава му на метилпарабен трябва да се има пред вид възможността за прояви на алергични реакции (по-често контактен дерматит и по-рядко – уртикария, бронхоспазъм).

Този продукт съдържа, като помощно вещество етанол в количество 0,03 g в 5 ml (една дозова единица). Поради това може да представлява опасност при деца и при болни с чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания.

**Приложение на други лекарствени продукти:**

*Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.*

Не трябва да се употребява едновременно с хлорпромазин, поради увеличаването на риска от поява на конвулсии и припадъци.

Пиперазин и Пирантел имат противоположен механизъм на противопаразитно действие, поради което не бива да се назначават едновременно.

## **3. КАК СЕ ПРИЕМА ХЕЛМИЦИД**

*Винаги приемайте Хелмицид според инструкциите на лекуващия лекар.*

Хелмицид сироп се приема през устата, един час след хранене по следната схема:

- При опаразитяване с дребни глисти (острици) - ентеробиоза.



възраст	сутрин	вечер
от 1 до 2 год.	½ мерителна лъжичка	
от 2 до 3 год.	½ мерителна лъжичка	½ мерителна лъжичка
от 4 до 6 год.	1 мерителна лъжичка	½ мерителна лъжичка
от 7 до 9 год.	1 мерителна лъжичка	1 мерителна лъжичка
от 10 до 12 год.	1 ½ мерителни лъжички	1 мерителна лъжичка
възрастни и деца над 12 год.	2 мерителни лъжички	1 мерителна лъжичка

- При опаразитяване с едри глисти (аскариди) - аскаридоза.

възраст	дневна доза, еднократно вечер
от 1 до 2 год.	1 мерителна лъжичка
от 2 до 4 год.	1 ½ мерителни лъжички
от 5 до 6 год.	2 мерителни лъжички
от 7 до 9 год.	2 ½ мерителни лъжички
от 10 до 12 год.	3 мерителни лъжички
възрастни и деца над 12 год.	4 мерителни лъжички

Лечението продължава 3 дни и след завършването му е препоръчително да се приеме очистително.

При упорити случаи и/или неефективно първо лечение, то може да се повтори след 7-10 дни.

Противорецидивно лечение при ентеробиоза се прави след 20 дни, а при аскаридоза след 2-2.5 месеца.

*Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Хелмицид е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.*

**Ако сте използвали по-голяма доза Хелмицид от предписаната:**

*При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!*

При предозиране е възможно да се наблюдава: замъглено зрение; нарушения в координацията; парестезии (мравучкане); тикове на лицето, ръцете и краката; мускулна слабост; треперене; конвулсии; потискане на дишането.

Мерки в случай на предозиране: спиране приема на продукта, незабавно отделяне на стомашното съдържимо, стомашна промивка, прилагане на активен въглен за намаляване на резорбцията; симптоматични средства.

*При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!*

**Ако сте пропуснали да приложите Хелмицид**

Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както и всеки друг лекарствен продукт, Хелмицид може да предизвика нежелани лекарствени реакции.*



Нежеланите лекарствени реакции при лечение с пиперазин се наблюдават рядко. Изявяват се предимно в намаление на апетита, умерени коремни болки, гадене, понякога повръщане и разстройство.

Понякога се срещат алергични реакции – уртикариални кожни обриви, температура, ставни болки.

Рядко може да възникнат неврологични нарушения – главоболие, сънливост, треперене, мускулна слабост, виене на свят, мравучкане, лека нестабилност при ходене. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

*Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.*

## **5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

При температура под 25<sup>0</sup>С.

Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!

***Срок на годност***

2 /две/ години от датата на производство.

***Срок на годност след първо отваряне на опаковката:***

30 (тридесет) дни

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2

София, България

Последна актуализация на текста - Декември 2006 г.

