



## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,  
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. За допълнителни въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

**Hotemin® cream**  
Хотемин крем

Производител и притежател на разрешението за употреба:  
EGIS PHARMACEUTICALS LTD.  
1106 BUDAPEST, Kereszturi ut 30-38.  
HUNGARY  
Phone: (36-1) 265-5555  
Fax: (36-1) 265-5529

### 1. Какво съдържа вашето лекарство?

50 g крем съдържа като лекарствено вещество 0.5 g *piroxicam*. Като помощни вещества се съдържат още: пречистена вода, течен парафин, бял вазелин, стеаринова киселина, кетостериллов алкохол, цетомакрогол 1000, сорбитол моностеарат и метил парахидроксибензоат.

### 2. Защо се използва това лекарство?

*Piroxicam* е нестероидно противовъзпалително лекарство. Има мощен болкоуспокояващ ефект и повлиява редица елементи на възпалението в ставите. Използва се за лечение на дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб, също както и за повлияване на болката, получена от травматични увреждания на същите.

### 3. Кога не трябва да прилагате Хотемин крем?

Не трябва да употребявате Хотемин крем, ако:  
- сте алергични към *piroxicam*  
- имате уртикария

Не прилагайте крема при деца и юноши под 14 години!



#### 4. Предпазни мерки преди употребата на крема

Приложението на *riogixam* може да затрудни евентуално забременяване. Информирайте лекуващия лекар ако желаете да забременеете или ако сте имали проблеми във връзка със забременяване. Ако кърмите, уведомете за това Вашия лекар преди да започнете лечение с крема.

#### 5. Предпазни мерки при употребата на крема

Следете за възможна поява на нежелани реакции и уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### 6. Как другите лекарства могат да повлияят вашето лечение с Хотемин крем?

Винаги информирайте Вашият лекуващ лекар за използваните от Вас лекарства. Тъй като този крем е само за външна употреба, количеството лекарствено вещество, което се резорбира е малко и не би трябвало да взаимодейства с другите употребявани в момента лекарства.

#### 7. Шофиране и работа с машини по време на лечението с Хотемин крем

Приложението на този крем не би трябвало да повлиява способността Ви за управление на моторни превозни средства или работа с машини.

#### 8. Начин на употреба

В зависимост от големината на засегнатата зона, нанесете 0,33 до 1.0 g (т.е. 1-3 cm ивица) от крема и го втрийте в болезнената здрава кожна повърхност. Използвайте крема по предписанието на лекуващия лекар, който може да назначи употребата му 3-4 пъти дневно.

#### 9. Възможни нежелани лекарствени реакции

Може да се получи локално дразнене под формата на обрив, парене или зачервяване на кожата. При появата на подобни реакции **СПРЕТЕ НЕЗАБАВНО** лечението с Хотемин и се обърнете за съвет към лекуващия лекар.

*Ако се появят някои други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, трябва да съобщите на лекуващия лекар.*

Срокът на годност е отпечатан върху картонената опаковка.

Не трябва да използвате крема след тази дата!

Да се съхранява под 25°C, в оригиналната опаковка!



ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА  
МЯСТО!

**10. Дата на изготвяне или последна проверка**

Февруари, 2003 год.

