

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВИТАМИН С 100 mg/ml инжекционен разтвор
VITAMIN C 100 mg/ml solution for injection
аскорбинова киселина

Прочетете внимателно цялата листовка преди да Ви се приложи това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

В тази листовка:

1. Какво представлява Витамин С и за какво се използва
2. Преди да се приложи Витамин С
3. Как да се прилага Витамин С
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Витамин С
6. Допълнителна информация

| |
|--------------------------------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |
| Листовка - Приложение 2 |
| Към РУ №: 11-2757 / 05-08-08 |
| Одобрено: 12 / 12.02.08 |

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИТАМИН С И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Витамин С (аскорбинова киселина) е водно-разтворим витамин, който участва в много жизнено-важни процеси в организма. При недостиг на аскорбинова киселина могат да се появят симптоми като мускулна слабост, оток и кръвоизливи от венците, подкожни кръвоизливи, чувство на умора, потиснатост.

Витамин С се прилага за лечение на състояния, възникнали в резултат на недостиг на аскорбинова киселина – скорбут, идиопатична метхемоглобинемия (заболяване на кръвта). Използва се и като допълнително лечение при състояния и заболявания, при които нуждата от аскорбинова киселина е повишена: тежки инфекциозни заболявания; заболявания на стомашно-чревния тракт (продължителни диарии; пептични язви; операции на стомаха и червата); тежки травми, изгаряния; неопластични заболявания; хронична хемодиализа; хипертиреозидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза); алкохолизъм.


2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ВИТАМИН С

Не използвайте Витамин С

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към аскорбинова киселина или към някоя от останалите съставки на инжекционния разтвор.

Обърнете специално внимание при употребата на Витамин С

- ако имате заболявания като недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (наследствено заболяване), хемохроматоза (болестно нарушена обмяна на желязото), заболявания на кръвта като таласемия, сърповидноклетъчна анемия, сидеробластна анемия;
- когато Ви предстоят лабораторни изследвания за трансаминазни, статдеhidrogenaza, билирубин, глюкоза и проби за кръв в изпражненията. Аскорбиновата киселина може да промени



результатите от изследванията. Приложението на Витамин С трябва да бъде преустановено 1-2 дни преди провеждане на теста.

Уведомете лекуващия лекар ако:

- имате бъбречно-каменна болест.
- имате заболявания на вените като тромбоза или склонност към образуване на тромби (съсиреци).

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Витамин С не трябва да се прилага със следните лекарства:

- лекарства за лечение на депресия, епилепсия, психични заболявания;
- салицилати (аспирин);
- лекарствени продукти, съдържащи желязо;
- изопреналин (лекарство за лечение на бронхиална астма);
- аминогликозидни антибиотици (гентамицин);
- противосъсирващи лекарства, които се приемат през устата (варфарин).

Жени в детородна възраст, които използват противозачатъчни средства и са прилагали Витамин С във високи дози (над 1 g дневно) трябва да коригират дозата им след прекъсване на терапията с Витамин С поради възможен риск от нежелано забременяване.

Употреба на Витамин С с храна и напитки

Витамин С се прилага инжекционно и храната не оказва влияние.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Витамин С може да се използва по време на бременност и кърмене в препоръчаните дози.

Шофиране и работа с машини

Витамин С не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Витамин С

Натриев сулфит, който влиза в състава на продукта, рядко може да предизвика алергични реакции, включително бронхоспазм, особено при пациенти с анамнеза за астма или алергия.

3. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ВИТАМИН С

Витамин С инжекционен разтвор се прилага мускулно или венозно. Предпочита се мускулното приложение. Дозите и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар. Венозното приложение трябва да се извършва от лекар.

Ако е приложена повече от необходимата доза Витамин С

Много високи дози Витамин С (5-10 g дневно) могат да предизвикат гадене, повръщане, колики, диария.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с приложението на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Витамин С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи и при приложение във високи дози Витамин С може да предизвика зачервяване на кожата, гадене, повръщане, колики, диария, да повиши риска от образуване на камъни в бъбреците. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВИТАМИН С

В оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25°C.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Витамин С

- Активната съставка е аскорбинова киселина 100 mg/ml, 2 ml или 5 ml.
- Другите съставки са: натриев хидрогенкарбонат; натриев сулфит, безводен; едетинова киселина; вода за инжекции.

Как изглежда Витамин С и какво съдържа опаковката

Витамин С инжекционен разтвор представлява бистра, безцветна течност в стъклени безцветни ампули с маркировка за отваряне - цветна точка или пръстен. По 10 броя ампули от 2 или 5 ml в блистер от PVC фолио, по 1 блистер в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: май 2008 г.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Начин на приложение: интрамускулно, интравенозно. За предпочитане е интрамускулното приложение. Когато се налага венозно приложение, въвеждането трябва да става бавно. Бързото интравенозно приложение може да предизвика временно замайване.

Възрастни: 100 до 500 mg дневно в продължение най-малко на 2 седмици. Максималната дневна доза е 6 g.

Деца: 100 до 300 mg дневно в разделени дози, в продължение най-малко на 2 седмици.



VITAMIN C 100 mg/ml
sol.inj. – 2 ml, 5 ml

Витамин С инжекционен разтвор не трябва да се смесва в една спринцовка или инфузия с ампицилин, карбеницилин, цефалоспорици, хлорамфеникол, витамини от група В и по-специално витамин В₁₂, аминофилин, блеомицин, естрогени, декстран, натриев бикарбонат, теофилин.

