

Листовка: информация за пациента

Листовка - Приложение 2

Л0080099/100

Амлодипин 5 mg таблетки

Amlodipine 5 mg tablets

Б6/МДА/МР-585/Х-8

29-03-2022

Амлодипин 10 mg таблетки

Amlodipine 10 mg tablets

амлодипин (amlodipine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Амлодипин таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амлодипин таблетки
3. Как да приемате Амлодипин таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амлодипин таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Амлодипин таблетки и за какво се използва**

Амлодипин таблетки съдържа активното вещество амлодипин, което принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти.

Амлодипин таблетки се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) или някои видове болка в гърдите наречена ангина, по-рядката форма на която е ангина на Принцметал или вариантна ангина.

При пациенти с високо кръвно налягане това лекарство действа като отпуска кръвоносните съдове, така че кръвта да преминава през тях по-лесно. При пациенти с ангина Амлодипин таблетки действа като подобрява доставянето на кръв до сърдечния мускул, който получава повече кислород и като резултат се предотвратява появата на гръден болка. Това лекарство няма незабавно действие при облекчаване на гръдената болка от ангина.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амлодипин таблетки**

**Не приемайте Амлодипин таблетки**

- ако сте алергични към амлодипин или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), или към друг калциев антагонист. Симптомите могат да бъдат: сърбеж, зачервяване на кожата или задух.
- ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония);
- ако имате стесняване на аортната клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето Ви не е в състояние да доставя достатъчно кръв на организма).
- ако страдате от сърдечна недостатъчност след сърдечен пристъп (инфаркт на миокарда).



## **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Амлодерон таблетки.

Информирайте Вашия лекар, ако имате или сте имали което и да е от следните заболявания:

- пресен инфаркт на миокарда;
- сърдечна недостатъчност;
- силно повишаване на кръвното налягане (хипертонична криза);
- чернодробно заболяване;
- ако сте в старческа възраст и дозата Ви трябва да бъде повищена.

## **Деца и юноши**

Амлодипин не е проучван при деца под 6-годишна възраст. Амлодерон таблетки трябва да се използва само за хипертония при деца и юноши на възраст от 6 до 17 години (вижте точка 3). За допълнителна информация се консултирайте с Вашия лекар.

## **Други лекарства и Амлодерон таблетки**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате, насъкоро сте приемали/използвали или е възможно да приемате/използвате други лекарства.

Амлодипин таблетки може да повлияе или да бъде повлиян от други лекарства, като:

- кетоконазол, итраконазол (лекарства против гъбички);
- ритонавир, индинавир, нелфинавир (т. нар. протеазни инхибитори, използвани за лечение на HIV);
- рифампицин, кларитромицин, еритромицин (антибиотици - за инфекции, причинени от бактерии);
- жълт кантарион (*Hypericum perforatum*);
- дилтиазем, верапамил (лекарства за сърце);
- дантролен (инфузионен разтвор за тежко отклонение от нормалната телесна температура);
- такролимус, сиролимус, темсиролимус и еверолимус (лекарства, използвани да променят начина, по който работи Вашата имунна система);
- симвастатин (лекарство за понижаване на холестерола);
- циклоспорин (лекарство за потискане на имунната система).

Амлодерон таблетки може да понижи кръвното Ви налягане дори повече, ако вече приемате други лекарства за лечение на Вашето високо кръвно налягане.

## **Амлодерон таблетки с храна и напитки**

Сокът от грейпфрут и грейпфрут не трябва да се консумират от хора, които приемат Амлодерон таблетки. Това се дължи на факта, че грейпфрутът и сокът от грейпфрут може да доведат до повишаване кръвните нива на Амлодерон таблетки, което да е причина за непредсказуемо усилване на хипотензивния ефект.

## **Бременност и кърмене**

### **Бременност**

Безопасността на амлодипин върху бременността при хора не е била установена. Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### **Кърмене**

Доказано е, че амлодипин преминава в кърмата в малки количества. Ако кърмите или планирате да кърмите, Вие трябва да информирате Вашия лекар преди да започнете да приемате Амлодерон таблетки.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



## **Шофиране и работа с машини**

Амлоторон таблетки може да повлияе способността Ви за шофиране или работа с машини. Ако таблетките са причина да получите гадене, световъртеж или умора, или имате главоболие, не шофирайте, нито работете с машини и веднага се обадете на Вашия лекар.

## **Амлоторон съдържа натрий**

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

### **3. Как да приемате Амлоторон таблетки**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната начална доза е една таблетка Амлоторон 5 mg веднъж дневно. Дозата може да бъде повишена до една таблетка Амлоторон 10 mg веднъж дневно.

Това лекарство може да се приема преди или след храна и напитки. Трябва да приемате това лекарство по едно и също време на денонощието. Преглътнете таблетката веднага с чаша вода. Не приемайте Амлоторон таблетки със сок от грейпфрут.

## **Употреба при деца и юноши**

За деца и юноши (6-17 години) обичайната препоръчителна начална доза е 2,5 mg дневно.



Максималната препоръчителна дневна доза е 5 mg.

Таблетките Амлоторон от 5 mg могат да се разделят на две равни половини, за да доставят доза от 2,5 mg.

Таблетките Амлоторон от 10 mg също могат да бъдат разделени на две равни дози.

Ако Вашият лекар Ви е казал да вземате  $\frac{1}{2}$  (половин) таблетка дневно, препоръчваме да не използвате устройства за разполовяване на таблетката. Следвайте следната инструкция как да разполовите таблетката:

Поставете таблетката с надписа нагоре върху равна, твърда повърхност (напр. маса или плот). Счупете я като натиснете от двете страни на делителната черта с показалците на двете ръце.



Важно е да продължите да приемате таблетките. Не чакайте таблетките Ви да свършат, за да посетите Вашия лекар.

## **Ако сте приемали повече от необходимата доза Амлоторон таблетки**

Прием на твърде много таблетки може да е причина за силно понижение на кръвното налягане, дори до опасни стойности. Може да се почувстввате замаяни, със световъртеж, да получите



припадък или слабост. Ако кръвното налягане спадне доста силно може да се развие шок. Кожата Ви ще стане студена и влажна и може да загубите съзнание. Ако приемете голямо количество таблетки Амлодиерон, незабавно потърсете медицинска помощ.

**Ако сте пропуснали да приемете Амлодиерон таблетки**

Не се тревожете. Ако сте пропуснали да вземете таблетка, пропуснете дозата. Вземете следващата си доза в необходимото време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели приема на Амлодиерон таблетки**

Вашият лекар ще Ви даде указания колко дълго да приемате това лекарство. Ако спрете употребата на това лекарство предварително, състоянието Ви може да се възстанови.

Ако имате никакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на това лекарство и/или специално се консултирайте с лекар, ако след прием на това лекарство получите която и да е от тези нежелани реакции:

- внезапна поява на хрипове, болка в гърдите, задух или затруднено дишане;
- подуване на клепачите, лицето или устните;
- подуване на езика и гърлото, което води до затруднено дишане;
- тежки кожни реакции, включващи интензивен кожен обрив, копривна треска, зачерявяне на кожата по цялото тяло, силен сърбеж, образуване на мехури, излющване и оток на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза) или други алергични реакции;
- сърдечен пристъп, неравномерно биење на сърцето;
- възпаление на задстомашната жлеза, което може да е причина за много силна болка в корема и гърба, придвижена от гадене и повръщане.

Съобщени са следните много чести нежелани реакции. Ако някоя от тях Ви създаде проблеми или ако продължава повече от една седмица, Вие трябва да се обадите на Вашия лекар.

**Много чести:** могат да засегнат повече от 1 на 10 души

- оток (задържане на течности).

Съобщени са следните чести нежелани реакции. Ако някоя от тях Ви създаде проблеми или ако продължава повече от една седмица, Вие трябва да се обадите на Вашия лекар.

**Чести:** могат да засегнат до 1 на 10 души

- главоболие, замаяност, сънливост (особено в началото на лечението);
- сърдебиене (усещане за сърдечната дейност), зачерявяне;
- болка в корема, гадене;
- нарушена перисталтика, диария, запек, лошо храносмилане;
- умора, слабост;
- зрителни нарушения, двойно виждане;
- мускулни спазми;
- подуване на глезните.



Други нежелани реакции, които са докладвани са включени в следващия списък. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашния лекар или фармацевт.

**Нечести:** могат да засегнат до 1 на 100 души

- промени в настроението, тревожност, депресия, безсъние;
- треперене, промени във вкуса, припадъци;
- изтръпване и мравучкане на крайниците, загуба на чувствителност за болка;
- шум в ушите;
- ниско кръвно налягане;
- хрема/запущен нос вследствие на възпаление на лигавицата на носа (ринит);
- кашлица;
- сухота в устата, повръщане;
- косопад, повишено изпотяване, сърбяща кожа, червени петна по кожата или обезцветяване;
- нарушения в отделянето на урината, чести позиви за уриниране през нощта, по-често уриниране;
- невъзможност за получаване на ерекция, дискомфорт или уголемяване на млечните жлези при мъже;
- болка, общо неразположение;
- ставни или мускулни болки, болка в гърба;
- повишаване или намаляване на телесното тегло.

**Редки:** могат да засегнат до 1 на 1 000 души

- състояние на обърканост.

**Много редки:** могат да засегнат до 1 на 10 000 души

- намален брой на белите кръвни клетки, намаляване на тромбоцитите, което може да доведе до необичайна појава на синими или лесно кървене;
- повишено ниво на кръвната захар (хипергликемия);
- нарушение на нервите, което да е причина за мускулна слабост, изтръпване и мравучкане подуване на венците;
- подуване на корема (гастрит);
- нарушена чернодробна функция, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (жълтеница), повишени стойности на чернодробните ензими, което да се отрази върху някои медицински изследвания;
- повишено напрежение в мускулите;
- възпаление на кръвоносните съдове, често с кожен обрив;
- чувствителност към светлина.

**С неизвестна честота:** от наличните данни не може да бъде направена оценка

- треперене, скована стойка, лице като маска, забавени движения и влечеща се, небалансирана походка.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашния лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. Как да съхранявате Амлодерон таблетки**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Пластмасови бутилки

Срок на годност след първо отваряне: 4 месеца

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви признания за обезцветяване или влошаване вида на таблетките.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Амлодерон**

- Активното вещество е амлодипин (като безилат).

#### Амлодерон 5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 5 mg амлодипин (като безилат).

#### Амлодерон 10 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 10 mg амлодипин (като безилат).

- Другите съставки са микрокристална целулоза, калциев хидрогенфосфат, натриев нишестен гликолат и магнезиев стеарат.

### **Как изглежда Амлодерон таблетки и какво съдържа опаковката**

Амлодерон 5 mg таблетки са бели, кръгли таблетки с диаметър 8 mm. Едната страна е леко вдълбната с делителна черта и релефно означение “A5”. Другата страна е леко изпъкната и гладка.

- Картонени кутии: с по 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 и 300 (10 x 30) таблетки.
- Календарни опаковки: 28 таблетки.
- Болнична опаковка: 50 таблетки.
- Пластмасова бутилка: с по 30, 98, 100, 200 и 250 таблетки със защитена капачка на винт.

Амлодерон 10 mg таблетки са бели, кръгли таблетки с диаметър 11 mm. Едната страна е леко вдълбната с делителна черта и релефно означение “A10”. Другата страна е леко изпъкната и гладка.

- Картонени опаковки: с по 14, 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200 и 250 таблетки.
- Календарни опаковки: 28 таблетки.
- Болнична опаковка: 50 таблетки.
- Пластмасова бутилка: с по 30, 98, 100, 200 и 250 таблетки със защитена капачка на винт.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара.



**Притежател на разрешението за употреба**

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Нидерландия

**Производители:**

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Нидерландия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Унгария

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków

Полша

**Това лекарство е разрешено за употреба в държавите членки на ЕИП под следните търговски имена:**

Австрия

Amlodipin ratiopharm 5 mg Tabletten

Amlodipin ratiopharm 10 mg Tabletten

Белгия

Amlodipine Teva 5 mg Tabletten

Amlodipine Teva 10 mg Tabletten

България

Амлодипин 5 mg таблетки

Амлодипин 10 mg таблетки

Дания

Amlodipin Teva

Естония

AMLODIPINE TEVA

Унгария

Amlodipin-Teva 5 mg tabletta

Amlodipin-Teva 10 mg tabletta

Ирландия

Amlodipine Teva 5 mg Tablets

Amlodipine Teva 10 mg Tablets

Италия

Amlodipina Teva Italia 5 mg compresse

Amlodipina Teva Italia 10 mg compresse

Литва

Amlodipine Teva 5 mg tabletes

Amlodipine Teva 10 mg tabletes

Нидерландия

Amlodipine (als besilaat) 5 mg PCH, tabletten

Amlodipine (als besilaat) 10 mg PCH, tabletten

Португалия

Amlodipina Teva 5 mg comprimido

Amlodipina Teva 10 mg comprimido

Швеция

Amlodipine Teva 5 mg tablet

Amlodipine Teva 10 mg tablet

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

