

Листовка: информация за пациента

Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване
Rapone 2 mg prolonged-release tablets

Рапонер 4 mg таблетки с удължено освобождаване
Rapone 4 mg prolonged-release tablets

Рапонер 8 mg таблетки с удължено освобождаване
Rapone 8 mg prolonged-release tablets

ропинирол (ropinirole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че призначите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Рапонер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Рапонер
3. Как да приемате Рапонер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Рапонер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20120231133135	
Разрешение № ВС(МЧ)Р-56569-6	
Одобрение № / 04. 11. 2021	

1. Какво представлява Рапонер и за какво се използва

Активното вещество в Рапонер е ропинирол, който принадлежи към група лекарства наречени допаминови агонисти. Допаминовите агонисти повлияват мозъка по подобен начин на естествено вещество, наречено допамин.

Рапонер таблетки с удължено освобождаване се използват за лечение на болестта на Паркинсон. Хората, страдащи от Паркинсонова болест имат ниски нива на допамин в някои части на мозъка. Ефектите на ропинирол са сходни с тези на естествения допамин, като по този начин той помага за намаляване на симптомите на болестта на Паркинсон.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Рапонер

Не приемайте Рапонер

- ако сте алергични към ропинирол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате тежко бъбречно заболяване;
- ако имате чернодробно заболяване.

Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че някое от горепосочените се отнася за Вас.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Рапонер:

- ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна;
- ако кърмите;
- ако сте на възраст под 18 години;
- ако имате сериозни сърдечни оплаквания;
- ако имате сериозен психичен проблем;
- ако имате непоносимост към някои захари (като лактоза).

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че някое от горепосочените се отнася за Вас. Вашият лекар ще прецени дали Рапонер е подходящ за Вас или дали е необходимо провеждането на допълнителни изследвания докато го приемате.

Докато приемате Рапонер

Кажете на Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/полагащия грижи забележи, че развивате необходимост или нужди да се държите по начин, който е необичен за Вас и не можете да устоите на импулса, подтика или изкушението за извършване на определени дейности, които биха могли да навредят на Вас или на хората около Вас. Те се наричат нарушения в контрола на импулсите и може да включват поведение, свързано с пристрастяване към хазарт, прекомерно хранене или увеличени разходи, необичайно силно сексуално желание или засилване на сексуалните намерения или настроения. Вашият лекар може да коригира Вашата доза или да Ви посъветва да преустановите приема на лекарствения продукт.

Тютюнопушене и Рапонер

Уведомете Вашия лекар ако започнете да пушите, или спирате пушенето докато приемате Рапонер. Може да се наложи Вашият лекар да промени приеманата от Вас доза.

Кажете на Вашия лекар, ако след спиране на лечението или понижаване на дозата на ропинирол, която приемате при Вас се появят симптоми като депресия, апатия, беспокойство, умора, изпотяване или болка (наречени „синдром на отнемане на допаминов агонист или DAWS“). Ако проблемите продължават повече от няколко седмици, може да се наложи Вашият лекар да промени лечението Ви.

Други лекарства и Рапонер

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали, или е възможно да приемате никакви други лекарства, включително и такива, отпускані без лекарско предписание. Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако сте започнали да приемате ново лекарство докато приемате Рапонер.

Някои лекарства могат да повлият действието на Рапонер или да увеличат вероятността за нежелани лекарствени реакции. Рапонер също може да повлияе действието на някои лекарства.

Такива лекарства са:

- антидепресантът флуоксамин;
- лекарства за други психични проблеми, например сулпирид;
- хормонозаместителна терапия (ХЗТ);
- метоклопрамид, който се използва при гадене и киселини;
- антибиотиците ципрофлоксацин или еноксацин;
- всички други лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или насърко сте приемали някое от тези лекарства.

Допълнителни кръвни изследвания ще са необходими, ако приемате следните лекарства с Рапонер:

- антагонисти на витамин K (използвани да намалят образуването на кръвни съсърещи), като варфарин.

Рапонер с храна и напитки

Можете да приемате Рапонер със или без храна според Вашите предпочитания.



Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Употребата на Рапонер не се препоръчва по време на бременност, освен ако Вашият лекар не счита, че ползата за Вас от приема на Рапонер е по-голяма от риска за неродено Ви бебе.

Вашият лекар ще Ви даде съвети, в случай че кърмите или планирате да кърмите. Рапонер не се препоръчва по време на кърмене, тъй като може да повлияе отделянето на кърма. Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Рапонер.

Шофиране и работа с машини

Рапонер може да предизвика съниливост. Може да доведе до много силна съниливост и понякога предизвиква внезапно заспиване без предупредителни признания.

Ако има вероятност това да се отнася за Вас: не шофирайте, не работете с машини и не се поставяйте в ситуации, в които съниливостта или заспиването биха могли да Ви поставят в опасност (или други хора) от сериозно увреждане или смърт. Не взимайте участие в такива дейности, докато тези ефекти не преминат.

Ропинирол може да предизвика халюцинации (да виждате, чувате или усещате неща, които не съществуват). Ако имате халюцинации, не шофирайте и не използвайте машини.

Рапонер съдържа лактоза, глюкоза (съставка на малтодекстрин) и рициново масло

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Рициновото масло може да причини стомашно неразположение и диария.

Рапонер съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка с удължено освобождаване, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Рапонер

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Рапонер таблетки са направени да освобождават лекарството за период от 24 часа. Ако страдате от състояние, което води до твърде бързо преминаване на лекарството през организма, напр. диария, таблетките може да не се разтворят напълно и да не окажат правилен ефект. Може да видите таблетките в изпражненията. Ако това се случи, информирайте Вашия лекар незабавно.

Употреба при деца и юноши

Не давайте Рапонер на деца. Рапонер обикновено не се предписва на хора под 18-годишна възраст.

Може да Ви бъде даден Рапонер самостоятелно за лечение на болест на Паркинсон. Също така, може да Ви бъде даден Рапонер с друго лекарство наречено леводопа (L-dopa). Ако приемате леводопа може да получите някои неконтролирани движения, когато започнете да приемате Рапонер. Кажете на Вашия лекар ако това се случи, тъй като може да е необходимо той да коригира дозата на леводопа (L-dopa), която приемате.

По колко Рапонер ще трябва да приемате?

Може да отнеме малко време, за да се определи най-подходящата за Вас доза Рапонер.



Препоръчителната начална доза е 2 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно през първата седмица. След това Вашият лекар може да повиши Вашата доза до 4 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно от втората седмица на лечението. Ако сте в много напреднала възраст, Вашият лекар може да повишава дозата Ви по-бавно. След това Вашият лекар може да коригира дозата докато започнете да приемате най-подходящата за Вас доза. Някои хора приемат до 24 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване всеки ден.

Ако в началото на Вашето лечение получите нежелани реакции, които трудно понасяте, консултирайте се с Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви посъветва да преминете на пониска доза ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки, които ще приемате три пъти на ден.

Може да отнеме няколко седмици преди Рапонер да започне да Ви действа. Не приемайте повече Рапонер, отколкото Ви е препоръчал Вашият лекар.

Начин на приложение

Приемайте Рапонер веднъж дневно, по едно и също време всеки ден.

Погльщайте Вашите Рапонер таблетки с удължено освобождаване цели с чаша вода. Не ги чупете, дъвчете и разтроявате. Ако го направите, има опасност от предозиране, тъй като лекарството ще се освободи в организма Ви търде бързо.

Ако преминавате от ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки към таблетки с удължено освобождаване

Вашият лекар ще определи дозата Ви Рапонер таблетки с удължено освобождаване въз основа на дозата на ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки, които приемате.

Приемете Вашите ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки както обикновено в деня преди да преминете към таблетките с удължено освобождаване. Вземете Вашите Рапонер таблетки с удължено освобождаване на следващата сутрин и не приемайте повече ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки.

Ако сте приели повече от необходимата доза Рапонер

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. Ако е възможно, покажете им опаковката на Рапонер.

При хора, приели повече от необходимата доза Рапонер могат да се наблюдават следните симптоми: гадене, повръщане, замаяност (усещане за световъртеж), съниливост, психическа или физическа умора, припадане, халюцинации.

Ако сте пропуснали да приемете Рапонер

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте пропуснали да приемете Рапонер за един ден или повече, обърнете се към Вашия лекар за съвет как да започнете да го приемате отново.

Ако сте спрели приема на Рапонер

Не спирайте приема на Рапонер без да сте посъветвани за това. Приемайте Рапонер толкова дълго, колкото Ви препоръча Вашият лекар.

Не спирайте лекарството, освен ако лекарят не Ви е казал да го направите. Ако изведнъж спрете приема на Рапонер, симптомите на болестта на Паркинсон могат бързо да се влошат.

Ако се налага да спрете приема на Рапонер, Вашият лекар ще намалява дозата Ви постепенно.

Не спирайте употребата на Рапонер внезапно, без да говорите с Вашия лекар. Внезапното спиране може да доведе до развитие на състояние, наречено невролептичен малитчен синдром, което може да представлява значителен рисък за здравето. Симптомите са: акинезия (загуба на мускулна подвижност), скованi мускули, повишена температура, нестабилно къръво налягане, тахикардия (ускорен сърден ритъм), обърканост, и потиснато ниво на съзнание (напр. кома).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции на Рапонер е по-вероятно да се появят когато започвате да приемате лекарството или веднага след повишаване на дозата. Те обикновено са леки и може да се облекчат след като сте приемали лекарството известно време. Обърнете се към Вашия лекар, ако сте притеснени за нежеланите реакции.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

- загуба на съзнание;
- съниливост;
- гадене.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

- заспиване изведнъж без предхождаща съниливост (епизоди на внезапно заспиване);
- халюцинации („виждане” на неща, които реално не са там);
- повръщане;
- замаяност (световъртеж);
- стомашни киселини;
- коремна болка;
- запек;
- подуване на краката, стъпалата или ръцете.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

- повишенна съниливост през деня (изключителна съниливост);
- психични проблеми като делириум (тежко объркване), заблуждения (неразумни идеи) или параноя (безпричинни подозрения);
- замаяност или загуба на съзнание, особено при внезапно изправяне (това се причинява от понижаване на кръвното налягане).


С неизвестна честота (от наличните данни честотата не може да се определи):

- промени в чернодробната функция, които се установяват при кръвни тестове;
- реакции на свръхчувствителност, включително кожен обрив, подуване на лицето, устните, гърлото или езика, което може да причини затруднения при прегълъщането или дишането, обрив и сърбеж;
- прекомерна употреба на Рапонер (нужда от висока доза от допаминергичното лекарство, която надвишава тази, която е необходима за контролиране на двигателните симптоми, известна като синдром на допаминова дисрегулация);
- агресивен начин на действие;
- след спиране на лечението с Рапонер или след понижаване на дозата е възможно да се появят депресия, апатия, беспокойство, умора, изпотяване или болка (наречени синдром на отнемане на допаминовия агонист).

Можете да изпитате следните нежелани реакции:

Неспособност да устоите на импулса, подтика или изкушението за извършване на определени дейности, които биха могли да навредят на Вас или на хората около Вас и могат да включват:

- силен импулс за хазартни игри с прекомерно залагане, въпреки сериозните лични или семейни последици;
- променен или повишен сексуален интерес и поведение на сериозна загриженост за Вас или за другите, например, увеличаване на сексуалното желание;



- неконтролирано, прекомерно пазаруване или увеличени разходи;
- склонност към преяждане (погълдане на големи количества храна за кратък период от време) или компулсивно хранене (консумирате повече храна, отколкото нормално и повече, отколкото е необходимо, за да задоволите глада си).

Кажете на Вашия лекар, ако наблюдавате някое от горепосочените промени в поведението, той ще обсъди с Вас начини за контролиране или намаляване на симптомите.

Ако приемате Рапонер с леводопа (L-dopa)

Хората, които приемат Рапонер с леводопа (L-dopa) могат да развият други нежелани реакции в течение на времето:

- много честа нежелана реакция са неконтролируемите конвулсивни движения. Ако приемате леводопа (L-dopa) може да получите неконтролируеми движения когато започнете приема на Рапонер. Информирайте Вашия лекар ако това се случи, тъй като може да е необходимо Вашия лекар да коригира дозата на лекарствата, които приемате.
- честа нежелана реакция е чувството на обърканост.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Рапонер

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след „Годен до:“, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Датата на изтичане на срока на годност съответства на последния ден от посочения месец.


Да се съхранява под 30°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Рапонер

- Активното вещество е ропинирол. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 2 mg, 4 mg или 8 mg ропинирол (като хидрохлорид).
- Другите съставки са: хипромелоза, кроскармелоза натрий, малтодекстрин (съдържа глюкоза), лактозаmonoхидрат, хидрогенирано рициново масло; колоиден, безводен силициев диоксид; магнезиев стеарат; *пигментна смес*: [2 mg таблетки с удължено освобождаване]: червен железен оксид (E172); жълт железен оксид (E172); лактоза monoхидрат; [4 mg таблетки с удължено освобождаване]: червен железен оксид (E172); жълт железен оксид (E172); лактоза monoхидрат, черен железен оксид (E172); [4 mg и 8 mg таблетки с удължено освобождаване]: червен железен оксид (E172); жълт железен оксид (E172); лактоза monoхидрат, черен железен оксид (E172).



Как изглежда Рапонер и какво съдържа опаковката

Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване са розови, пъстри и овални с 2x гравирано от едната страна.

Рапонер 4 mg таблетки с удължено освобождаване са кафяви, пъстри и овални с 4x гравирано от едната страна.

Рапонер 8 mg таблетки с удължено освобождаване са тъмнорозови, с мозаечна структура и овални с 8x гравирано от едната страна.

Видове опаковки:

Рапонер таблетки с удължено освобождаване се предлагат в блистерни опаковки от 21, 28, 30, 42, 56, 84 и 90 таблетки с удължено освобождаване.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Нидерландия

Производител

Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Малта

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Дания	Raponeg
България	Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване Рапонер 4 mg таблетки с удължено освобождаване Рапонер 8 mg таблетки с удължено освобождаване
Кипър	Raponer PR
Чешка република	Ropinirol Actavis 2 mg Retard Ropinirol Actavis 4 mg Retard Ropinirol Actavis 8 mg Retard
Естония	Ropinirole Actavis
Унгария	Ropinirol 2 mg retard tabletta Ropinirol 4 mg retard tabletta Ropinirol 8 mg retard tabletta
Литва	Ropinirole Actavis 2 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Ropinirole Actavis 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Ropinirole Actavis 8 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Латвия	Ropinirole Actavis 2 mg ilgstošās darbības tabletes Ropinirole Actavis 4 mg ilgstošās darbības tabletes Ropinirole Actavis 8 mg ilgstošās darbības tabletes
Малта	Raponer PR
Полша	Raponer
Румъния	Ropinirol Teva 2 mg prolonged release tablets Ropinirol Teva 4 mg prolonged release tablets Ropinirol Teva 8 mg prolonged release tablets
Словения	Ropinirol Actavis 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Ropinirol Actavis 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Ropinirol Actavis 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem



Словашка република Raponer 2 mg
Raponer 4 mg
Raponer 8 mg

Дата на последно преразглеждане на листовката –

