

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор
OMALGIN 500 mg/ml solution for injection

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Кратка характеристика на продукта - Приложение 1

Към Рев. № 9900 402

Разрешение № 668/17

16 - 10 - 2024

BG/MAMP -

Одобрение №

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml разтвор съдържа като активно вещество 500 mg метамизол натрий монохидрат (metamizole sodium monohydrate).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

Бистър и слабо жълтеникав разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

За краткотрайно повлияване на остра, умерено до средно силно изразена болка (след хирургични интервенции, болки при спазъм на гладката мускулатура на никочните и жълчни пътища).

4.2. Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Метамизол под формата на инжекционен разтвор трябва да се използва само когато пероралното приложение не е показано.

Дозата се определя от интензитета на болката или повишената температура и от индивидуалната чувствителност към ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор. Важно е да се избере най-ниската доза, при която се овладяват болката и повишената температура.

При деца и юноши на възраст до 14 години 8 – 16 mg метамизол на килограм телесно тегло може да се прилагат като единична доза. В случай на повищена температура доза от 10 mg метамизол на килограм телесно тегло обикновено е достатъчна за деца. Възрастни и юноши на възраст над 15 години (> 53 kg) могат да получават до 1000 mg като единична доза.

В зависимост от максималната дневна доза, единична доза може да се приема до 4 пъти дневно през интервали от 6 -8 часа.

Началото на аналгетичния или антипиретичния ефект може да се очаква 30 минути след приложение. Обикновено продължителността на действие е около 4 часа.

Тъй като хипотензивната реакция след инжектирането може да зависи от приложната доза, назначаването на единична доза за парентерално приложение по-висока от 1000 mg метамизол трябва да бъде внимателно обмислено. С цел да се сведе до минимум риска от хипотензивна реакция, интравенозната инжекция трябва да се прилага много бавно. Вижте също точка 6.1 наричана приложение.

В следващата таблица са показани препоръчителните единични дози и максималните дневни дози в зависимост от теглото или възрастта:



Телесно тегло		Единична доза		Максимална дневна доза	
kg	възраст	ml	mg	ml	mg
5 - 8	3 - 11 месеца	0,1 - 0,2	50-100	0,4 - 0,8	200-400
9 - 15	1 - 3 години	0,2 - 0,5	100-250	0,8 - 2,0	400-1 000
16 - 23	4 - 6 години	0,3 - 0,8	150-400	1,2 - 3,2	600-1 600
24 - 30	7 - 9 години	0,4 - 1,0	200-500	1,6 - 4,0	800-2 000
31 - 45	10 - 12 години	0,5 - 1,4	250-700	2,0 - 5,6	1 000-2 800
46 - 53	13 - 14 години	0,8 - 1,8	400-900	3,2 - 7,2	1 600-3 600
> 53	≥ 15 години	1,0 - 2,0*	500-1 000*	4,0 - 8,0*	2 000-4 000*

- Ако е необходимо, единичната доза може да се увеличи до 5 ml (съответстващо на 2 500 mg метамизол), а дневната доза – до 10 ml (съответстващо на 5000 mg метамизол).

Популяция в старческа възраст, изтощени пациенти и пациенти с намален креатининов клирънс
Дозата трябва да се намали при пациенти в старческа възраст, при изтощени пациенти и при пациенти с намален креатининов клирънс, тъй като елиминирането на метаболитните продукти на метамизол може да се удължи.

Пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане

Тъй като скоростта на елиминиране е намалена при пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция, многократни високи дози трябва да се избягват. Не се налага намаляване на дозата само при краткосрочна употреба. Няма наличен опит от дългосрочна употреба.

Начин на приложение

Необходимо е да се гарантира, че след първите симптоми на анафилактична/анафилактоидна реакция (вж. точка 4.8) инжектирането може да бъде прекъснато и рисъкът от изолирана хипотензивна реакция – сведен до минимум. По време на парентерално приложение е необходимо пациентите да бъдат под внимателно наблюдение от медицинско лице и в легнало положение. За да се избегне хипотензивна реакция, интравенозната инжекция трябва да се прилага много бавно, например 1 ml (500 mg метамизол) на минута като максимална скорост.

4.3. Противопоказания

- Свръхчувствителност към метамизол, включително и към други пиразолонови лекарствени продукти и инхибитори на простагландиновата синтеза (като аспирин, индометацин, волтарен, пиroxикам) или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.
- Нарушение в кръвотворенето (тромбоцитопения и гранулоцитопения).
- Генетично обусловена липса на специфичния ензим глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа.
- Остра чернодробна порфирия.
- Приложението при хематологично болни е само в изключителни случаи, при строго контролиране показателите на хомопоезата и точна преценка на евентуалния рисък.
- Не се прилага през първия и последния триместър на бременността и по време на кърмене.
- При деца до 15 години.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Парентералното приложение при деца и болни с увредена бъбречна функция следва да се избегне. Венозното прилагане на лекарствения продукт става само в изключителни случаи, поради рисък от развитие на тежки алергични реакции, включително и анафилактичен шок и колапс. Приложението му инжектиране следва да се избягва поради локално дразнещо действие и рисък от раздразняване на съдържанието. При пациенти с повишен рисък от анафилактични реакции е необходима внимателна оценка на съотношението риск/полза.



Парентералното приложение на ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор може да доведе до появата на хипотония, особено при пациенти с дехидратация, начален циркулаторен колапс, политравма и др.

Възможно е червено оцветяване на урината, в резултат на отделянето на метаболита рубазонова киселина.

С особено внимание при пациенти със свръхчувствителност към някои НСПВС, алкохол и храни, при пациенти страдащи от бронхиална астма и хронични белодробни инфекции.

Лекарствено индуцирано чернодробно увреждане

Съобщени са случаи на остръ хепатит, предимно от хепатоцелуларен тип, при пациенти, лекувани с метамизол, с начало от няколко дни до няколко месеца след започване на лечението. Признаките и симптомите включват повишени чернодробни ензими в серума със или без жълтеница, често в контекста на други реакции на свръхчувствителност към лекарството (напр. кожен обрив, кръвни дискразии, повищена температура и еозинофилия) или придружени от характеристики на автоимунен хепатит. Повечето пациенти са се възстановили при прекратяване на лечението с метамизол; въпреки това в отделни случаи има съобщения за прогресия до остра чернодробна недостатъчност, налагаща чернодробна трансплантиация.

Механизмът на индуцираното от метамизол чернодробно увреждане не е изяснен напълно, но данните показват имуно-алергичен механизъм.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да се свържат със своя лекар в случай на поява на симптоми, предполагащи чернодробно увреждане. При такива пациенти употребата на метамизол трябва да се преустанови и да се оцени чернодробната функция.

Метамизол не трябва да се въвежда повторно при пациенти с епизод на чернодробно увреждане по време на лечение с метамизол, при които не е установена друга причина за чернодробното увреждане.

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Фармакокинетично взаимодействие – индуциране на лекарство-метаболизиращи ензими:

Метамизол може да индуцира лекарство-метаболизиращи ензими, включително CYP2B6 и CYP3A4.

Едновременно приложение на метамизол с бупропион, ефавиренц, метадон, валпроат, циклоспорин, такролимус или сертралин може да доведе до намаляване на плазмените концентрации на тези лекарства с потенциално намаляване на клиничната ефикасност. Поради това се препоръчва повишено внимание при едновременно приложение на метамизол; клиничният отговор и/или нивата на лекарствата трябва да се проследяват по подходящ начин.

При едновременно приложение на ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор с други нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, може да се повиши риска от алергии. При едновременно приложение с лекарствени продукти, съдържащи златни соли, както и други, потискащи костномъзъчната функция продукти, се повишава риска от агранулоцитоза.

ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор може да потисне екскрецията на метотрексат и да се повишат плазмените му нива и неговата токсичност.

Невролептици и транквилизатори потенцират аналгетичния му ефект.

Алкохолът потенцира аналгетичния ефект на метамизол. Проявява синергизъм и се комбинира успешно с периферни M-холинолитици, аминофеназин, хинин, кодеин. Може да се комбинира с атропин, бусколизин, други спазмолитици. Хлорамфеникол и други миелотоксични лекарствени продукти потенцират риска от странични ефекти от страна на хемопоезата. Ефектите му се потенцират и от трицикличните антидепресанти, оралните контрацептивни лекарствени продукти, алопуринол в резултат на ензимна инхибиция и забавяне на биотрансформацията му в резултат на чернодробна ензимна индукция. Метамизол понижава активността на кумариновите антикоагуланти. Темпидон усилива и пролонгира действието на метамизол. Не променя ефекта на утерокинетичните и утеротонични лекарствени продукти.

При пациенти приемащи аспирин като антиагрегант, метамизол може да отслаби антиагрегантния ефект, подобно на ибупрофен.

4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

Не се препоръчва прилагането на ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор във време на бременността, особено в първия и последния триместър и в периода на кърмене.



4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за неблагоприятно повлияване на активното внимание и рефлексите, поради което лекарственият продукт може да се прилага при шофьори и лица, работещи с машини. Като предпазна мярка пациентът трябва да бъде предупреждаван за възможността за поява на хипотония и свързаните с нея симптоми.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани по честота и по система -орган-клас.

Честотата по MedDRA отговаря на: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ и $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1\,000$ и $< 1/100$), редки ($\geq 1/10\,000$ и $< 1/1\,000$) и много редки ($< 1/10\,000$), включително единични съобщения.

Кръвоносна и лимфна система

Рядко се наблюдава левкопения и много рядко агранулоцитоза (намаляване на белите кръвни клетки и увреждане на кръвотворенето) или тромбоцитопения.

Сърдечно-съдова система

Рядко могат да се наблюдават хипотонични реакции.

Дихателна система

Много рядко – бронхоспазъм. При пациенти с аналгетична астма – астматични пристъпи.

Кожа и лигавици

Рядко са възможни кожни алергични реакции, прояви на свръхчувствителност, синдром на Layell and Stevens-Johnson.

Реакции на свръхчувствителност

Рядко се наблюдават реакции на свръхчувствителност: уртикария, бронхоспазъм, анафилактичен шок.

Отделителна система

Много рядко се наблюдава остро влошаване на бъбрената функция, последвано от протеинурия, олигурия и анурия. В отделни случаи може да се развие и оствър интерстициален нефрит.

Хепатобилиарни нарушения

С неизвестна честота: Лекарствено индуцирано чернодробно увреждане, включително оствър хепатит, жълтеница, повишени чернодробни ензими (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изиска да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев" № 8
1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9. Предозиране

Симптоми

При предозиране се наблюдават епилептиформни гърчове, намаляване на концентрацията, деградацията, циароза (посиняване), колапс, мениероподобни явления, гадене, коремни болки.



Лечение

Няма специфичен антидот.

Лечението е симптоматично.

Основният метаболит (4-метиламиноантипирин) може да бъде елиминиран с помощта на хемодиализа, хемофилтрация или плазмофилтрация.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други аналгетици и антипириетици. Пиразолони.

ATC код: N02BB02

Механизъм на действие

Метамизол принадлежи към групата на пиразолоните и притежава изразен аналгетичен и антипириетичен ефект.

Фармакодинамични ефекти

Действието му е обусловено от изразено инхибиращо влияние върху циклооксигеназата предимно в мозъка и по-малко в периферията. Блокирането на синтезата на ендогенните пирогени – някои простагландини, лежи в основата на антипириетичния му ефект, но има голямо значение и за осъществяване на аналгетичното му действие. По-малка роля играе намаляването на простагландиновата синтеза в периферията, респективно намаляване чувствителността на нервните окончания в огнището на възпалението към местните алгогенни медиатори. За разлика от останалите ненаркотични аналгетици, метамизол стимулира отделянето на бета - ендорфини. Това обяснява, както силният му аналгетичен ефект, така и ефективността му при висцерални болки. Има слабо седативно действие. Упражнява спазмолитичен ефект върху гладката мускулатура на жълчката и пикочните пътища и върху маточната мускулатура.

5.2. Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След интрамускулно приложение се резорбира бързо и пълно, като максималната плазмена концентрация се достига след 1/2 час.

Разпределение

Свързва се с плазмените протеини в 50-60 %. Преминава хематоенцефалната и плацентарната бариери. Обем на разпределение – около 0,7 l/kg.

Биотрансформация

Подлага се на интензивна биотрансформация в черния дроб. Основният му метаболит 4-метиламиноантипирин се метаболизира в черния дроб до други метаболити, включително до 4-аминоантипирин, който е фармакологично активен.

Максимални плазмени концентрации (по отношение на всички метаболити) се установяват след около 30 до 90 минути.

Елимиране

Отделя се през бъбреците под формата на метаболити, като само 3 % от изльченото количество метамизол е в непроменен вид. Време на полуживот около 10 часа.

Пациенти с чернодробни нарушения

Времето на полуживот на активния метаболит 4-метиламиноантипирин при пациенти с чернодробни нарушения е удължено на около 3 пъти. При тези пациенти се препоръчва лечение с по-ниски дози метамизол.



Пациенти с бъбречни нарушения

При пациенти с нарушена бъбречна функция се наблюдава понижена степен на елиминиране на някои метаболити. При тези пациенти се препоръчва лечение с по-ниски дози метамизол.

5.3. Предклинични данни за безопасност

При опити върху мишки метамизол е показал слаба токсичност. LD₅₀ след перорално приложение е по-голямо от 2,5 g/kg телесна маса. Няма данни за генотоксично и мутагенно действие при експерименти върху животни.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Списък на помощните вещества

Вода за инжекции.

6.2. Несъвместимости

Не са известни.

6.3. Срок на годност

5 години.

6.4. Специални условия на съхранение

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6.5. Вид и съдържание на опаковката

Първична опаковка

Ампули по 1 ml и 2 ml, самочупещи се, от тъмно неутрално стъкло, I хидролитичен клас.

Ампулите се поставят в блистери от PVC фолио.

Вторична опаковка

Клиширани, сгъваеми кутии.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ДАНСОН-БГ ООД

ул. „Отец Паисий“ № 26

2400 гр. Радомир

България

тел.: 02 451 93 00

e-mail: office@danhson.com

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Рег. № 9900407



9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 декември 1999 г.

Дата на последно подновяване: 25 февруари 2011 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

септември, 2024 г.

