

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
История: Препоръчителен 2	
Към Рег. №	20230133/39
Разрешение №	-71222-3 / 24-02-2026
БЗ/МА/МР	

Листовка: информация за пациента

Диурестад 5 mg таблетки
Diurestad 5 mg tablets

Диурестад 10 mg таблетки
Diurestad 10 mg tablets

тораземид
(*torasemide*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Диурестад и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диурестад
3. Как да приемате Диурестад
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Диурестад
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Диурестад и за какво се използва

Диурестад 5 mg таблетки се използва за лечение на:

- високо кръвно налягане;
- отоци, причинени от повишено количество течност в тялото (едем).

Диурестад 10 mg таблетки се използва за лечение на:

- отоци, причинени от повишено количество течност в тялото (едем).

Тораземид е диуретик – лекарство, повишаващо отделянето на урина.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диурестад

НЕ приемайте Диурестад, ако сте/ако имате:

- **алергични към:**
 - тораземид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
 - подобни лекарства, наречени „сулфонилурейни производни“, които се използват за лечение на високи нива на кръвната захар, съдържащи активни вещества, чиито имена обикновено завършват на „-мид“.



- **бъбречна недостатъчност с недостатъчно образуване на урина;**
- **тежки чернодробни заболявания със загуба на съзнание;**
- **ниско кръвно налягане;**
- **кърмите;**
- **намалени нива на калий или натрий в кръвта;**
- **тежки нарушения на уринирането, причинени например от уголемяване на простатната жлеза;**
- **подагра;**
- **неправилен сърдечен ритъм;**
- **приемате лекарства за лечение на инфекции като цефиксим, цефуроксим, цефаклор, цефалексин, цефадроксил, цефподоксим проксетил, канамицин, неомицин, гентамицин, амикацин или тобрамицин;**
- **намалена бъбречна функция поради лекарства, причиняващи бъбречно увреждане.**

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Диурестада, ако някое от следните се отнася за Вас:

- отклонения в количеството киселини и основи в организма;
- патологични промени в кръвната картина;
- прием на литий, лекарство за лечение на депресия;
- диабет.

Ако приемате тораземид продължително време, Вашият лекар редовно ще проверява кръвните Ви показатели, особено ако приемате и други лекарства, ако имате диабет или страдате от аритмия.

Деца и юноши

Диурестада не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Диурестада

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Следните лекарства могат да повлияят на или да бъдат повлияни от Диурестада:

- **лекарства за лечение на високо кръвно налягане, особено лекарства с активно вещество, завършващо на „-прил“;**
- **лекарства, които подобряват помпената функция на сърцето, като дигитоксин, дигоксин или метилдигоксин;**
- **лекарства за лечение на диабет;**
- **пробенецид - лекарство за лечение на подагра;**
- **лекарства за лечение на възпаление и болка като ацетилсалицилова киселина или индометацин;**
- **сулфасалазин, мезалазин или олсалазин – лекарства за лечение на хронични възпалителни заболявания на червата;**
- **лекарства за лечение на инфекции като цефиксим, цефуроксим, цефаклор, цефалексин, цефадроксил, цефподоксим проксетил, канамицин, неомицин, гентамицин, амикацин или тобрамицин;**
- **лекарства, съдържащи платина, като цисплатин (лекарство за лечение на рак);**
- **литий – лекарство за лечение на депресия;**
- **теофилин – лекарство за лечение на астма;**



- някои лекарства, които се използват за мускулна релаксация, с активни вещества, завършващи на „курониум“ или „куриум“;
- всички лекарства за лечение на запек;
- лекарства, съдържащи кортизон, като хидрокортизон, преднизон или преднизолон;
- колестирамин – лекарство за намаляване на нивата на мастни вещества в кръвта;
- адреналин или норадреналин – лекарства за повишаване на кръвното налягане;
- варфарин – лекарство за лечение на кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Приемайте Диурестад по време на бременност само ако Вашият лекар каже, че е абсолютно необходимо. В този случай трябва да се използва най-ниската възможна доза.

Кърмене

Диурестад не трябва да се използва при жени, които кърмят, тъй като това може да навреди на детето.

Шофиране и работа с машини

При прием на Диурестад могат да настъпят замаяност или сънливост, особено в началото на лечението, при повишаване на дозата, при промяна на лекарството, при започване на прием на допълнително лекарство или при едновременна употреба с алкохол. Ако Вашето внимание е отслабено, не шофирайте и не работете с машини.

Диурестад съдържа лактоза

Това лекарство съдържа лактоза, която е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Диурестад

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Диурестад 5 mg таблетки

Лечение на високо кръвно налягане

Половин таблетка веднъж дневно.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да повиши дозата до 1 таблетка дневно най-рано след два месеца от започване на лечението.

Лечение на отоци, причинени от повишено количество вода в тялото (едем)

1 таблетка веднъж дневно.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да повиши дозата до 4 таблетки веднъж дневно.



Делене на таблетката

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Поставете таблетката върху твърда, равна повърхност с делителната черта, насочена нагоре.

Натиснете с пръст върху средата на таблетката и тя ще се раздели на две равни половини.

Диурестад 10 mg таблетки

Лечение на отоци, причинени от повишено количество вода в тялото (едем)

Половин таблетка веднъж дневно.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да повиши дозата до 2 таблетки веднъж дневно.

Делене на таблетката

Таблетката може да бъде разделена на две или четири равни дози.

Поставете таблетката върху твърда, равна повърхност с делителната черта, насочена нагоре.

Натиснете с пръст от лявата и от дясната страна на единичната делителна черта и таблетката ще се раздели на две равни половини.

С последващо натискане на двете половини по същия начин, ще се получат четири равни дози.

Употреба при деца и юноши

Няма достатъчно опит при употребата на тораземид при деца и юноши. Поради тази причина това лекарство не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Нарушение на чернодробната функция, което не е тежко

Вашият лекар ще Ви лекува с повишено внимание, тъй като нивото на тораземид в кръвта може да се повиши.

Начин на приложение

Приемайте таблетките всяка сутрин със или без храна, без да я дъвчете, със 100 ml вода, равняващи се на половин чаша.

Продължителност на лечението

Ще бъде преценено от наблюдаващия Ви лекар. Диурестад може да се прилага продължително време за няколко години или до изчезване на отоците.

Ако сте приели повече от необходимата доза Диурестад

Незабавно се свържете с Вашия лекар.

Предозирането може да причини отделяне на голямо количество вода (урина), сънливост, обърканост, слабост, замаяност, хипотония, циркулаторен колапс, стомашно неразположение.

Винаги вземайте с Вас всички останали таблетки, както и кутията, тъй като това ще позволи лесното идентифициране на таблетките.

Ако сте пропуснали да приемете Диурестад

Приемете пропуснатата доза възможно най-скоро през същия ден или приемете следващата доза по обичайното време на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Диурестад

Не спирайте приема на тораземид без разрешение от Вашия лекар, тъй като това може сериозно да Ви навреди и да намали терапевтичния ефект.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции могат за се проявят със следната честота

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- нарушения на количеството вода и минерални соли в организма, особено при ограничен прием на сол;
- повишена концентрация на алкални вещества в организма;
- мускулни крампи;
- повишени концентрации на пикочна киселина, захар и мастни вещества в кръвта;
- намалени концентрации на калий и натрий в кръвта;
- намален обем на кръвта;
- нарушения на стомаха и/или червата като липса на апетит, болка в стомаха, гадене (неразположение), повръщане, диария, запек;
- повишение на нивата на някои чернодробни ензими като гама-глутамилтрансфераза;
- главоболие;
- замаяност;
- уморяемост;
- слабост.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

- повишение на концентрациите на урея и креатинин в кръвта;
- сухота в устата;
- усещане за изтръпване или мравучкане в ръцете и краката;
- затруднения при уриниране (напр. поради хиперплазия на простатата).

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

- стесняване или свиване на кръвоносните съдове, причинени от сгъстяване на кръвта;
- по-ниско от нормалното кръвно налягане;
- циркулаторни нарушения, особено при изправяне;
- неправилен сърдечен ритъм;
- стенокардия (ангина пекторис) - състояние, което често се представя със силна болка в гърдите;
- инфаркт;
- припадъци;
- възпаление на панкреаса;
- алергични реакции със сърбеж и обрив;
- повишена чувствителност на кожата към светлина;
- тежки кожни реакции;
- намаление на броя на червените и белите кръвни клетки, и на тромбоцитите;
- зрителни нарушения;
- звънене или шум в ушите



- загуба на слуха.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- недостатъчен приток на кръв към мозъка;
- обърканост.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Диурестад

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:“.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Диурестад

- Активно вещество: тораземид.
Диурестад 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg тораземид.
Диурестад 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg тораземид.

- Други съставки: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, колоиден безводен силициев диоксид.

Как изглежда Диурестад и какво съдържа опаковката



Диурестад 5 mg таблетки са бели до почти бели кръгли двойноизпъкнали таблетки с една делителна черта от едната страна, с диаметър 7 mm и височина 2,5 mm.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Диурестад 10 mg таблетки са бели до почти бели кръгли таблетка с делителна черта под формата на кръст от едната страна, кръстосани линии от другата страна и четири хоризонтални вдлъбнатини, с диаметър 8,5 mm и височина 4,2 mm.

Таблетката може да бъде разделена на две или четири равни дози.

Диурестад 5 mg таблетки са налични в блистери в картонени опаковки по 20, 30, 50, 100 таблетки.

Диурестад 10 mg таблетки са налични в блистери в картонени опаковки по 20, 30, 50, 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

Производител

Heimopharm GmbH

Theodor-Heuss Strasse 52

61118 Bad Vilbel

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката

02/2026

