

### Листовка: информация за пациента

Полприл Плюс 5 mg/1,25 mg твърди капсули  
Полприл Плюс 5 mg/2,5 mg твърди капсули  
Полприл Плюс 10 mg/1,25 mg твърди капсули  
Полприл Плюс 10 mg/2,5 mg твърди капсули  
*рамиприл/индапамид*

Polpril Plus 5 mg/1.25 mg capsules, hard  
Polpril Plus 5 mg/2.5 mg capsules, hard  
Polpril Plus 10 mg/1.25 mg capsules, hard  
Polpril Plus 10 mg/2.5 mg capsules, hard  
*ramipril/indapamide*

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Полприл Плюс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Полприл Плюс
3. Как да приемате Полприл Плюс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Полприл Плюс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20250087/88/89/90
Разрешение №	
ВГ/МА/МР	
Одобрение №	УА 24577-79/81 / 1.1.-06-2026

#### 1. Какво представлява Полприл Плюс и за какво се използва

Полприл Плюс съдържа две активни вещества, наречени рамиприл и индапамид. Рамиприл принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Те действат като намаляват производството в организма на вещества, които могат да повишат кръвното Ви налягане и разширят кръвоносните Ви съдове, което улеснява сърцето в изпомпването на кръвта през тях. Индапамид принадлежи към група лекарства, наречени диуретици. Диуретиците увеличават количеството на урината, произвеждана от бъбреците. Все пак индапамид е различен от другите диуретици, тъй като води само до леко увеличение на количеството произвеждана урина.

Това лекарство се използва за лечение на хипертония (високо кръвно налягане), като заместителна терапия при възрастни пациенти, на които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и индапамид, като отделни продукти, прилагани по едно и също време, в същите дози както в комбинацията, но като отделни таблетки.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Полприл Плюс

##### Не приемайте Полприл Плюс:

- ако сте алергични към рамиприл или индапамид, към други АСЕ инхибитори, или към някой друг сулфонамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство.



- (изброени в точка 6). Признаците на алергична реакция може да включват обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика.
- ако някога сте имали сериозна алергична реакция, наречена "ангиоедем". Признаците включват сърбеж, уртикария, червени петна по дланите, стъпалата и гърлото, подуване на гърлото и езика, подуване около очите и устните, затруднение при дишане и преглъщане.
  - ако сте на диализа или някакъв друг тип филтриране на кръвта. В зависимост от машината, която се използва, лечението с Полприл Плюс може да не е подходящо за Вас.
  - ако имате бъбречни проблеми, при които кръвоснабдяването на Вашия бъбрек е намалено (стеноза на бъбречната артерия);
  - по време на последните 6 месеца от бременността (вж. точка "Бременност и кърмене" по-долу);
  - ако кърмите;
  - ако кръвното Ви налягане е необичайно ниско или нестабилно. Вашият лекар ще трябва да прецени това;
  - ако имате диабет или увредена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
  - ако сте приемали или понастоящем приемате сакубитрил/валсартан - лекарство, използвано за лечение на продължителна (хронична) сърдечна недостатъчност при възрастни, тъй като се увеличава рискът от ангиоедем (рязко подуване в дълбоките слоеве на кожата в определена област, например гърлото).
  - ако имате тежко чернодробно заболяване или ако страдате от състояние, наречено чернодробна енцефалопатия (увреждане на мозъка и нервите, което може да възникне като усложнение на чернодробни проблеми);
  - ако имате тежко бъбречно заболяване;
  - ако Вашият лекар Ви е казал, че имате ниски нива на калий в кръвта;
  - ако сте със сърдечна декомпенсация (особено нелекувана).

Не приемайте Полприл Плюс, ако нещо от по-горе изброените се отнася до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Полприл Плюс:

- ако сте загубили голямо количество соли или течности от организма (при повръщане, диария, изпотяване повече от обичайното, ако сте на диета с ниско съдържание на сол, ако приемате диуретици (таблетки за отводняване) продължително време или ако сте имали диализа);
- ако Ви предстои да получите анестетик. Той може да се приложи при операция или при заболяване. Може да се наложи да спрете лечението си с Полприл Плюс един ден преди това; посъветвайте се с Вашия лекар.
- ако Ви предстои лечение за намаляване на алергията към ужилване от пчели или оси (десенсибилизация);
- ако имате високи количества калий или ниски нива на натрий в кръвта (доказани чрез резултати от кръвните тестове);
- ако имате колагенно съдово заболяване (когато проблеми на имунната система засягат колагена в организма Ви) като склеродерма (хронично заболяване, засягащо предимно кожата) или системен лупус еритематозус (продължително възпалително заболяване, при което имунната система атакува здравите тъкани);
- ако сте с тъмна кожа. Имате по-висок риск от внезапно, в повечето случаи болезнено, силно подуване на дълбоките слоеве на кожата, предимно на лицето и понижен ефект на рамиприл.
- ако имате кашлица. Уведомете Вашия лекар, ако тя се влоши.
- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:



- ангиотензин II рецепторен блокер (АРБ) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате проблеми с бъбреците, свързани с диабет.
- алискирен.
- ако приемате което и да е от следните лекарства, рискът от ангиоедем (рязко подуване в дълбоките слоеве на кожата в определена област, например гърлото) се повишава:
  - рацекадотрил, лекарство за лечение на диария;
  - лекарства, използвани, за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи и за лечение на рак (темзиролимус, сиролимус, еверолимус);
  - вилдаглиптин, лекарство за лечение на диабет.
- ако имате сърдечни, чернодробни или бъбречни проблеми;
- ако имате диабет (редовно проверявайте нивата на кръвната си захар);
- ако страдате от подагра;
- ако сте имали реакции на чувствителност към светлина;
- ако усещате отслабване на зрението или болка в очите. Това може да са симптоми на задържане на течности в съдовия слой на окото (хориоидален излив) или на повишаване на налягането в окото и е възможно да се появят в рамките на часове до седмици след приема на Полприл Плюс. Това може да доведе до постоянна загуба на зрение, ако не се предприеме лечение. Ако някога сте имали алергия към пеницилин или сулфонамид, може да сте изложени на по-висок риск от развитие на такива усложнения;
- ако имате нарушения на нивата на електролитите в кръвта или дефицит на вода в организма;
- ако се нуждаете от преглед, за да проверите как функционира околощитовидната Ви жлеза.

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Полприл Плюс не се препоръчва през първите 3 месеца от бременността и може да причини сериозна вреда на Вашето бебе след 3 месеца от бременността (вж. точка „Бременност и кърмене“).

Ако нещо от горните се отнася до Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, преди да приемете Полприл Плюс.

Препоръчва се Вашият лекар да следи броя на белите кръвни клетки. По-често проследяване е препоръчително:

- в началото на лечението;
- при пациенти с понижена бъбречна функция или колагенно съдово заболяване, или
- когато се използват лекарства, които повлияват броя на кръвните клетки.

Вашият лекар може да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий и натрий) в кръвта на редовни интервали.

Спортистите трябва да имат предвид, че това лекарство съдържа активно вещество, което може да даде позитивна реакция по време на допинг тест.

Вижте също и информацията озаглавена „Не приемайте Полприл Плюс“.

#### **Деца и юноши**

Полприл Плюс не се препоръчва за употреба при деца и юноши.

#### **Други лекарства и Полприл Плюс**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или възможно да приемете други лекарства.

Трябва да се избягва употребата на Полприл Плюс с:



- литий (използва се за лечение на депресия).

Лечението с Полприл Плюс може да бъде повлияно от други лекарства. Кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като може да е необходимо специално внимание:

- сакубитрил/валсартан - използвани за продължително лечение на хронична сърдечна недостатъчност (вижте раздел 2 „Не приемайте Полприл Плюс“);
- лекарства, използвани за облекчаване на болка и възпаление (например нестероидни противовъзпалителни средства [НСПВС] като ибупрофен или индометацин и ацетилсалицилова киселина);
- калиеви добавки (включително заместители на солта), калий-съхраняващи диуретици (като спиронолактон, триамтерен, амилорид) и други лекарства, които може да повишат количеството на калий в кръвта (напр. триметоприм и ко-тримоксазол, известен също като триметоприм/сулфаметоксазол, използвани при бактериални инфекции; циклоспорин – имунодепресант, използван за предотвратяване на отхвърляне на органен трансплантат и хепарин (за разреждане на кръвта, което предпазва от кръвосъсирване).
- диуретици (таблетки, стимулиращи продукцията на урина) като фуросемид;
- лекарства, които понижават кръвното налягане;
- лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок, сърдечна недостатъчност, астма или алергии като ефедрин, норадреналин или адреналин и допамин, добутамин, епинефрин, изопреналин;
- стероидни лекарства за възпаление като преднизолон;
- алопуринол (използван за понижаване на пикочната киселина в кръвта);
- прокаинамид (при проблеми със сърдечния ритъм);
- темсиролимул (за рак);
- сиролимул, еверолимул и други лекарства, принадлежащи към класа инхибитори на mTOR (използват се, за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи);
- вилдаглиптин (използва се за лечение на диабет тип 2);
- рацекадотрил (използва се за лечение на диария);
- лекарства, които могат да променят броя на кръвните клетки;
- еритромицин (антибиотик, използван за лечение на някои бактериални инфекции);
- лекарства, използвани за проблеми със сърдечния ритъм (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид, дигиталис);
- лекарства, използвани за лечение на психични заболявания като депресия, тревожност, шизофрения (напр. трициклически антидепресанти, антипсихотични лекарства, невролептици);
- бепридил (използван за лечение на ангина пекторис – състояние, което предизвиква гръдни болки);
- цизаприд (използва се за лечение на стомашно-чревни проблеми);
- дифеманил (използва се за лечение на стомашни проблеми като язви, твърде много киселина, свръхактивна храносмилателна система);
- спарфлоксацин, моксифлоксацин (антибиотици, използвани за лечение на инфекции);
- инжекционен винкамин (използван за симптоматично лечение на когнитивни нарушения при хора в старческа възраст, включително при загуба на памет);
- халофантрин (противопаразитно лекарство, използвано за лечение на някои видове малария);
- пентамидин (използва се за лечение на някои видове пневмония);
- мизоластин (използва се за лечение на алергични реакции като сенна хрема);
- инжекционен амфотерицин В (противогъбично лекарство);
- перорални кортикостероиди, използвани за лечение на различни състояния, включително тежки състояния на астма и ревматоиден артрит);
- стимулиращи слабители средства;
- баклофен (използва се за лечение на мускулна скованост, появяваща се при заболявания като множествена склероза);
- лекарства за лечение на диабет (като метформин) и инсулин;



- йод съдържащи контрастни вещества (използвани за изследвания, включително рентген);
- калций или калциеви добавки;
- тетракозактид (за лечение на болест на Крон).

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата и/или да вземе други предпазни мерки: ако приемате ангиотензин II рецепторен блокер (АРБ) или алискирен (вижте също информацията, озаглавена „Не приемайте Полприл Плюс“ и „Предупреждения и предпазни мерки“).

#### **Полприл Плюс с храна, напитки и алкохол**

Пиенето на алкохол по време на лечение с Полприл Плюс може да Ви замае или да получите световъртеж. Ако се интересувате какво количество може да пиете, докато приемате Полприл Плюс, обсъдете това с Вашия лекар, тъй като лекарствата, използвани за понижаване на кръвното налягане и алкохолът може да имат допълващи се ефекти.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Бременност**

Трябва да кажете на Вашия лекар, че сте бременна или може да сте забременяла. Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Полприл Плюс преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Полприл Плюс. Това лекарство не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема третия месец от бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето бебе ако се използва след третия месец от бременността.

#### **Кърмене**

Не трябва да приемате Полприл Плюс, ако кърмите. Говорете с Вашия лекар незабавно, ако кърмите или предстои да започнете да кърмите.

#### **Шофиране и работа с машини**

Полприл Плюс може да засегне способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако се чувствате замаяни, докато приемате Полприл Плюс. Това е по-вероятно да се случи, когато започвате приема на това лекарство. Ако това се случи, не шофирайте и не работете с никакви инструменти или машини.

### **3. Как да приемате Полприл Плюс**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Пациенти в старческа възраст**

Препоръчителната доза е една капсула дневно, за предпочитане е да приемате капсулата сутрин с достатъчно количество течност (напр. чаша вода).

#### **Употреба при деца и юноши**

Полприл Плюс не се препоръчва за употреба при деца и юноши, поради липса на данни за безопасност и ефикасност.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Полприл Плюс**

Кажете на лекар или идете веднага в спешното отделение на най-близката болница. Не шофирайте до болницата, помолете някой друг да Ви закара или повикайте линейка. Вземете опаковката на лекарството с Вас. Това е необходимо, за да знае лекарят как сте приели



#### **Ако сте пропуснали да приемете Полприл Плюс**

Ако пропуснете доза, вземете обичайната си доза, когато е време да приемете следващата. Не вземайте двойна доза, за да наваксите пропуснатата капсула.

#### **Ако сте спрели приема на Полприл Плюс**

Не спирайте приема на това лекарство рязко или не променяйте предписаната доза, преди да се консултирате с Вашия лекар, тъй като в такива случаи заболяването Ви може да се влоши.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

**Спрете приема на Полприл Плюс и веднага се обърнете към лекар, ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции – може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:**

- подуване на лицето, устните или гърлото, което затруднява преглъщането или дишането, както и сърбеж и обриви. Това може да бъде признак на тежка алергична реакция към Полприл Плюс.
- тежки кожни реакции, включително обрив, язви в устата, влошаване на съществуващо кожно заболяване, зачервяване, образуване на мехури или отлепване на кожата (като синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза или erythema multiforme).

**Кажете незабавно на Вашия лекар, ако получите:**

- ускорена сърдечна честота, неравномерни или силни удари на сърцето (сърцебиене), болка в гърдите, стягане в гърдите или по-сериозни проблеми, включително сърдечен пристъп и инсулт;
- недостиг на въздух или кашлица. Това могат да бъдат признаци на белодробни проблеми.
- по-лесно насиняване, по-продължително от нормалното кървене, всеки признак на кървене (например кървене от венците), морави петна по кожата или получаване на инфекции по-лесно от обикновено, болки в гърлото и повишена температура, чувство на умора, слабост, замайване или бледа кожа. Това могат да бъдат признаци на проблеми с кръвта или костния мозък.
- силна стомашна болка, която може да се разпространява към гърба. Това може да бъде признак на възпаление на панкреаса (панкреатит).
- повишена температура, студени тръпки, умора, загуба на апетит, стомашна болка, позиви за повръщане, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница). Това могат да бъдат признаци на чернодробни проблеми, като възпаление на черния дроб (хепатит) или чернодробно увреждане.
- концентрирана урина (тъмна на цвят), позиви за повръщане или повръщане, мускулни крампи, объркване и припадъци, които може да се дължат на неадекватна секреция на АДХ (антидиуретичен хормон).

**Другите нежелани ефекти включват:**

Кажете на Вашия лекар, ако някои от следните симптоми станат сериозни или продължават повече от няколко дни.

**Чести** (може да засегнат до 1 на 10 души)

- кръвни изследвания, показващи по-голямо от обикновеното количество калий в кръвта;
- главоболие или чувство на умора;



- припадане (синкоп), хипотония (ненормално ниско кръвно налягане), особено когато се изправяте или сядате бързо;
- суха дразнеща кашлица, възпаление на синусите (синусит) или бронхит, недостиг на въздух;
- възпаление на стомаха и/или червата, болка в стомаха или червата, диария, нарушено храносмилане, позиви за повръщане или повръщане;
- алергична реакция, която води до кожни обриви (особено при хора, предразположени към алергични и астматични реакции);
- крампи или болка в мускулите;
- болка в гърдите чувство на умора.

**Нечести** (може да засегнат до 1 на 100 души)

- повишен брой на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), което се открива при изследване на кръвта;
- загуба или понижаване на апетита (анорексия), ниски нива на натрий в кръвта, което може да доведе до обезводняване и понижаване на кръвното налягане;
- проблеми с равновесието (вертиго), сърбеж и необичайни усещания по кожата, като изтръпване, щипане, боцкане, парене или мравучкане по кожата (парестезии), загуба или промяна на вкуса;
- зрителни нарушения (включително замъглено зрение);
- ангина пекторис или миокарден инфаркт, учестен или неравномерен сърдечен ритъм, сърцебиене, подуване на глезените, краката или пръстите;
- зачервяване;
- запушен нос, затруднение на дишането или влошаване на астма;
- възпаление на панкреаса (панкреатит); подуване на червата, наречено “интестинален ангиоедем”, проявяващо се със симптоми като коремна болка, повръщане и диария; киселини, запек или сухота в устата;
- кръвни изследвания, показващи промени в действието на черния дроб или бъбреците;
- подуване на лицето, устните или гърлото. Вижте първата точка в началото на раздел 4.
- изпотпяване повече от обикновеното;
- екзантем, морави петна по кожата (пурпура), промяна на цвета на кожата;
- болки в ставите;
- бъбречно увреждане, включително тежка бъбречна недостатъчност, повишена необходимост от уриниране;
- полова слабост при мъжете, намалено сексуално желание при мъжете или жените, импотентност (невъзможност да се постигне или задържа ерекция);
- треска.

**Редки** (може да засегнат до 1 на 1000 души)

- кръвни изследвания, показващи намаление на броя на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки или тромбоцитите или на количеството на хемоглобина;
- ниски нива на хлориди в кръвта, ниски нива на магнезий в кръвта;
- треперене или объркване;
- тремор, нарушения в равновесието;
- умора;
- конюнктивит (червени, сърбящи, подути или съзязящи очи);
- намален слух или шум в ушите;
- стеснени кръвоносни съдове, хипоперфузия (намалено количество кръвен поток), възпаление на кръвоносните съдове;
- подуване на езика;
- жълтеница (пожълтяване на кожата и на бялото на окото), увреждане на чернодробните клетки;
- силно лющене или обелване на кожата, сърбящ, изпъкнал обрив, проблеми с ноктите (например разхлабване или отделяне на нокът от неговото ложе);
- чувство за слабост (астения).



**Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)**

- високи нива на калций в кръвта;
- намаляване на нивата на определени кръвни клетки, което може да причини слабост, посиняване или да повиши вероятността от инфекции (хемолитична анемия); апластична анемия (потискане на костния мозък);
- неравномерен сърдечен ритъм;
- панкреатит (възпаление на панкреаса);
- възпаление на черния дроб;
- реакции на фотосенсибилизация (повишена чувствителност на кожата към слънчевите лъчи или изкуствена UV светлина);
- тежки кожни реакции. Вижте втората точка в началото на раздел 4.

**С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)**

- костно-мозъчна недостатъчност, панцитопения (ниски нива на червени, бели кръвни клетки и тромбоцити);
- тежки алергични реакции;
- синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон;
- затруднение на концентрацията;
- нарушения на кръвообращението в мозъка, включително инсулт, чувство на парене, промяна на обонянието;
- намаляване на зрението или болка в очите поради високо налягане (възможни признаци на задържане на течност в съдовия слой на окото (хориоидален излив) или остра закритоъгълна глаукома);
- животозастрашаващ неравномерен пулс (torsade de pointes);
- пръстите на ръцете и краката променят цвета си, когато сте на студено и след това изтръпват или са болезнени, когато се затоплите (феномен на Рейно);
- възпаление на лигавицата на устата с малки разязвявания;
- тежка чернодробна недостатъчност, хепатит (възпаление на черния дроб). Ако имате проблеми с черния дроб, приемането на Полприл Плюс може да причини състояние, наречено чернодробна енцефалопатия (увреждане на мозъка и нервите, което може да възникне като усложнение на чернодробно заболяване);
- косопад;
- увеличаване на гърдите при мъжете (гинекомастия);
- нарушения в електрокардиограмата;
- могат да се появят някои промени в лабораторните Ви показатели (кръвните изследвания) и Вашият лекар може да назначи кръвни изследвания, за да провери Вашето състояние. Могат да се появят следните промени в лабораторните показатели:
  - повишаване на нивото на глюкозата в кръвта при пациенти с диабет;
  - повишаване на пикочната киселина, вещество, което може да причини или да влоши подагратата (болезнени стави особено по ходилата);
  - повишаване на чернодробните ензими.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## 5. Как да съхранявате Полприл Плюс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“, „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Полприл Плюс

- Активните вещества са рамиприл и индапамид.  
Всяка капсула 5 mg/1,25 mg съдържа 5 mg рамиприл и 1,25 mg индапамид.  
Всяка капсула 5 mg/2,5 mg съдържа 5 mg рамиприл и 2,5 mg индапамид.  
Всяка капсула 10 mg/1,25 mg съдържа 10 mg рамиприл и 1,25 mg индапамид.  
Всяка капсула 10 mg/2,5 mg съдържа 10 mg рамиприл и 2,5 mg индапамид.
- Помощните вещества са:  
Съдържимо на капсулата: микрокристална целулоза, манитол, магнезиев стеарат  
Капсулна обвивка: желатин (говежди); капсулите от 5 mg/2,5 mg, 10 mg/1,25 mg и 10 mg/2,5 mg съдържат червен железен оксид (E172); капсулите от 5 mg/1,25 mg, 5 mg/2,5 mg и 10 mg/1,25 mg съдържат жълт железен оксид (E172);

### Как изглежда Полприл Плюс и какво съдържа опаковката

Полприл Плюс 5 mg/1,25 mg твърди желатинови жълти капсули, с надпис 5+1,25 на тялото, размер на капсулите – № 3 (с приблизителна дължина 16 mm); съдържимото е бял или почти бял прах или леко сбити агломерати.

Полприл Плюс 5 mg/2,5 mg твърди желатинови капсули, с жълто тяло и оранжево капаче, с надпис 5 + 2,5 на тялото, размер на капсулите – № 1 (с приблизителна дължина 19,5 mm); съдържимото е бял или почти бял прах или леко сбити агломерати.

Полприл Плюс 10 mg/1,25 mg твърди желатинови капсули, с оранжево тяло и червено капаче, с надпис 10 + 1,25 на тялото, размер на капсулите – № 1 (с приблизителна дължина 19,5 mm); съдържимото е бял или почти бял прах или леко сбити агломерати.

Полприл Плюс 10 mg/2,5 mg са твърди желатинови червени капсули, с надпис 10 + 2,5 на тялото, размер на капсулите – № 1 (с приблизителна дължина 19,5 mm), съдържимото е бял или почти бял прах или леко сбити агломерати.

Една опаковка съдържа 28 или 84 капсули в блистери от алуминий/OPA/алуминий/PVC. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### Притежател на разрешението за употреба

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
Полша

Производител  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.



Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie  
ul. Metalowca 2, 39-460 Nowa Dęba  
Полша

**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:**

България: Полприл Плюс 5 mg/1,25 mg твърди капсули, Полприл Плюс 5 mg/2,5 mg твърди капсули, Полприл Плюс 10 mg/1,25 mg твърди капсули, Полприл Плюс 10 mg/2,5 mg твърди капсули

Полша: Polpril Plus

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

