ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка Приложение 2
Към Рег. № 20080136
Разрешение № 73196 20-10-2026
BG/MA/MP /
Одобрение № /

Листовка: информация за пациента

Кордакер 20 mg таблетки
Cordacare 20 mg tablets

лизиноприл като лизиноприл дихидрат
(lisinopril as lisinopril dihydrate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Кордакер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кордакер
3. Как да приемате Кордакер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кордакер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Кордакер и за какво се използва

Кордакер съдържа активното вещество лизиноприл. То принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори.

Кордакер може да се използва при следните състояния:
- За лечение на високо кръвно налягане (хипертония);
- За лечение на сърдечна недостатъчност;
- Ако наскоро сте претърпели сърдечен удар (миокарден инфаркт);
- За лечение на бъбречни проблеми, причинени от диабет тип 2, при хора с високо кръвно налягане.

Кордакер действа, като разширява кръвоносните Ви съдове. Това спомага за понижаване на кръвното налягане. Също така улеснява сърцето да изпомпва кръвта към всички части на тялото.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кордакер

Не приемайте Кордакер:
- ако сте алергични към лизиноприл или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако някога сте имали алергична реакция към друго лекарство от групата на АСЕ инхибиторите. Алергичната реакция може да е причинила подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, езика или гърлото. Възможно е също така да е затруднила преглъщането или дишането (ангиоедем);
- ако сте приемали или в момента приемате сакубитрил/валсартан - лекарство, използвано за лечение на вид продължителна (хронична) сърдечна недостатъчност при възрастни, тъй като рискът от ангиоедем (бързо подуване под кожата в област като гърлото) е повишен;

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *

- ако член на Вашето семейство е имал тежки алергични реакции (ангиоедем) към АСЕ инхибитор или Вие сте имали тежки алергични реакции (ангиоедем) без известна причина;
- ако сте бременна повече от 3 месеца (също така е по-добре да избягвате Кордакер в началото на бременността - вж. точка „Бременност“);
- ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кордакер.

Ако след започване на лечението с Кордакер развиете суха кашлица, която продължава дълго време, говорете с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кордакер:

- ако имате стеснение (стеноза) на аортата (артерия в сърцето) или стеснение на сърдечните клапи (митралните клапи);
- ако имате стеснение (стеноза) на бъбречната артерия;
- ако имате увеличаване на дебелината на сърдечния мускул (известно като хипертрофична кардиомиопатия);
- ако имате проблем с кръвоносните съдове (колагенна съдова болест);
- ако имате ниско кръвно налягане. Може да забележите това като чувство на замаяност или прилошаване, особено когато се изправите;
- ако имате проблеми с бъбреците или сте на бъбречна диализа;
- ако имате проблеми с черния дроб;
- ако имате диабет;
- ако приемате някое от следните лекарства, рискът от ангиоедем (бързо подуване под кожата в област като гърлото) е повишен:
  - темсиролимус, сиролимус, еверолимус и други лекарства, принадлежащи към групата на mTOR инхибиторите (използвани за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи и за лечение на рак);
  - рацекадотрил, лекарство, използвано за лечение на диария;
  - вилдаглиптин, лекарство, използвано за лечение на диабет.

- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
  - ангиотензин II рецепторен блокер (АРБ) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;
  - алискирен.

Вашият лекар може да проверява бъбречната Ви функция, кръвното Ви налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта на редовни интервали от време.
Вижте също информацията в точка „Не приемайте Кордакер“.

- ако наскоро сте имали диария или повръщане (гадене);
- ако Вашият лекар Ви е казал да контролирате количеството на солта в диетата си;
- ако имате високи нива на холестерол и Ви се прилага лечение, наречено „LDL-афереза“;
- трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или може да забременеете). Кордакер не се препоръчва в първите месеци от бременността и не бива да се приема след третия месец, защото може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва на този етап (вж. раздел „Бременност, кърмене и фертилитет“);
- ако сте от чернокож произход, тъй като Кордакер може да бъде по-малко ефективен. Възможно е също така по-лесно да получите нежеланата реакция „ангиоедем“ (тежка алергична реакция).

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кордакер.

Лечение на алергии, например при ужилване от насекоми
Уведомете Вашия лекар, ако провеждате или ще провеждате лечение за понижаване на ефекта от алергия, като например ужилване от насекоми (десенсибилизиращо лечение). Ако приемате Кордакер, докато провеждате това лечение, той може да предизвика тежка алергична реакция.

Операция
Ако Ви предстои операция (включително стоматологична операция), уведомете Вашия лекар или зъболекар, че приемате Кордакер. Това е така, защото може да получите ниско кръвно налягане (хипотония), ако по време на приема на Кордакер Ви бъдат приложени някои локални или общи анестетици.

Деца и юноши
Кордакер е проучван при деца. За повече информация говорете с Вашия лекар. Кордакер не се препоръчва при деца на възраст под 6 години или при деца с тежки бъбречни проблеми.

Други лекарства и Кордакер
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е така, защото Кордакер може да повлияе начина, по който действат някои лекарства, а някои лекарства могат да повлияят действието на Кордакер. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да предприеме други предпазни мерки.

По-специално, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:
- други лекарства, понижаващи кръвното налягане;
- ангиотензин II рецепторен блокер или алискирен (вижте също информацията в раздели „Не приемайте Кордакер“ и „Предупреждения и предпазни мерки“);
- „отводняващи“ таблетки (диуретици);
- бета-блокери, като атенолол и пропранолол;
- нитратни лекарства (за сърдечни проблеми);
- нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), използвани за лечение на болка и артрит;
- аспирин (ацетилсалицилова киселина), ако приемате повече от 3 грама дневно;
- лекарства за лечение на депресия и психични проблеми, включително литий;
- калиеви добавки (включително заместители на солта), калий-съхраняващи диуретици и други лекарства, които могат да повишат количеството на калия в кръвта Ви (например триметоприм и ко-тримоксазол за лечение на инфекции, причинени от бактерии; циклоспорин, имуносупресивно лекарство, използвано за предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи; и хепарин, лекарство за разреждане на кръвта с цел предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци);
- инсулин или лекарства за диабет, които приемате през устата;
- лекарства, използвани за лечение на астма;
- лекарства за лечение на запушен нос или синуси или други лекарства за лечение на настинка (включително такива, които можете да закупите в аптеката);
- лекарства за разграждане на кръвни съсиреци (обикновено прилагани в болница);
- лекарства, потискащи имунния отговор на организма (имуносупресори);
- алопуринол (за лечение на подагра);
- прокаинамид (при проблеми със сърдечния ритъм);
- лекарства, съдържащи злато, като натриев ауротиомалат, които могат да Ви бъдат приложени като инжекция.

Следните лекарства могат да повишат риска от ангиоедем (признаците на ангиоедем включват подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото със затруднено преглъщане или дишане):
- лекарства за разграждане на кръвни съсиреци (тъканен плазминогенен активатор), които обикновено се прилагат в болница;
- лекарства, които най-често се използват за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи (темсиролимус, сиролимус, еверолимус и други лекарства);

принадлежащи към класа на mTOR инхибиторите). Вижте раздел „Предупреждения и предпазни мерки“;
- рацекадотрил, използван за лечение на диария;
- вилдаглиптин, лекарство, използвано за лечение на диабет.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност
Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или планирате бременност. Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Кордакер, преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Кордакер. Кордакер не се препоръчва в началните месеци на бременността и не трябва да се приема след третия месец на бременността, тъй като може да причини сериозна вреда на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да започнете да кърмите. Кордакер не се препоръчва при майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите, особено ако Вашето бебе е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини
При някои хора по време на приема на това лекарство може да се появят замайване или умора. Ако това се случи с Вас, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини. Трябва да изчакате, за да видите как Ви влияе лекарството, преди да предприемете тези дейности.

3. Как да приемате Кордакер

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

След като започнете да приемате Кордакер, Вашият лекар може да Ви назначи изследвания на кръвта. След това Вашият лекар може да коригира дозата Ви, така че да приемате подходящото за Вас количество от лекарството.

Приемане на Вашето лекарство
- Поглъщайте таблетката с вода;
- Опитайте се да приемате таблетките си по едно и също време всеки ден. Няма значение дали приемате Кордакер преди или след храна;
- Продължавайте да приемате Кордакер толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар, това е продължително лечение. Важно е да приемате Кордакер всеки ден.

Приемане на първата доза
- Обърнете специално внимание, когато приемате първата си доза Кордакер или ако дозата Ви бъде увеличена. Това може да причини по-голямо понижаване на кръвното налягане в сравнение със следващите дози.
- Това може да Ви накара да се почувствате замаяни или отпаднали. Ако това се случи, може да Ви помогне да легнете. Ако сте обезпокоени, моля, говорете с Вашия лекар възможно най-скоро.

Възрастни
Вашата доза зависи от Вашето заболяване и от това дали приемате други лекарства. Вашият лекар ще Ви каже колко таблетки да приемате всеки ден. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При високо кръвно налягане
- Препоръчителната начална доза е 10 mg, веднъж дневно.
- Обичайната поддържаща доза е 20 mg, веднъж дневно.

При сърдечна недостатъчност
- Препоръчителната начална доза е 2,5 mg, веднъж дневно.
- Поддържащата доза е 5 до 35 mg, веднъж дневно.

След сърдечен удар
- Препоръчителната доза е 5 mg в рамките на 24 часа след инфаркта и 5 mg един ден по-късно.
- Обичайната поддържаща доза е 10 mg, веднъж дневно.

При бъбречни проблеми, причинени от диабет
- Препоръчителната доза е 10 mg или 20 mg, веднъж дневно.

Ако сте пациент в старческа възраст, имате бъбречни проблеми или приемате диуретици, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза от обичайната.

Употреба при деца и юноши (на възраст от 6 до 16 години) с високо кръвно налягане
- Кордакер не се препоръчва при деца под 6-годишна възраст или при деца с тежки бъбречни проблеми.
- Лекарят ще определи подходящата доза за Вашето дете. Дозата зависи от телесното тегло на детето.
- За деца с телесно тегло между 20 kg и 50 kg препоръчителната начална доза е 2,5 mg веднъж дневно.
- За деца с телесно тегло над 50 kg препоръчителната начална доза е 5 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кордакер
Ако сте приели повече Кордакер, отколкото Ви е предписал Вашият лекар, говорете с лекар или незабавно отидете в болница. Най-вероятно е да се появят следните реакции: замайване, сърцебиене.

Ако сте пропуснали да приемете Кордакер
Ако сте пропуснали да приемете доза, приемете я веднага щом си спомните. Ако обаче наближава времето за следващата доза, пропуснете забравената доза.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Кордакер
Не спирайте приема на таблетките, дори ако се чувствате добре, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните реакции, **спрете приема на Кордакер и незабавно се консултирайте с Вашия лекар:**
- Тежки алергични реакции (редки, засягат 1 до 10 пациенти на 10 000). Признаците могат да включат внезапна поява на:
  - Подуване на лицето, устните, гърлото или езика. Това може да затрудни преглъщането.

- Внезапно или тежко подуване на ръцете, краката и глезените;
- Затруднено дишане;
- Силен сърбеж на кожата (с поява на подутини).

- Тежки кожни реакции, като внезапен, неочакван обрив или парене, зачервяване или лющене на кожата (много рядко, засяга по-малко от 1 пациент на 10 000);
- Инфекция със симптоми като повишена температура и сериозно влошаване на общото Ви състояние или треска със симптоми на локална инфекция като възпалено гърло/фаринкс/устна кухина или проблеми с уринатa (много рядко, засяга по-малко от 1 пациент на 10 000).

Други възможни нежелани реакции:

Чести (засягат 1 до 10 пациенти на 100)
- Главоболие;
- Чувство на замаяност или световъртеж, особено при рязко изправяне;
- Диария;
- Суха кашлица, която не затихва;
- Гадене (повръщане);
- Бъбречни проблеми (установени при изследвания на кръвта).

Нечести (засягат 1 до 10 пациенти на 1000)
- Промени в настроението;
- Промяна на цвета на пръстите на ръцете и краката (бледосиньо, последвано от зачервяване) или изтръпване и мравучкане на пръстите на ръцете или краката;
- Промени във вкуса;
- Сънливост;
- Усещане за въртене (световъртеж);
- Затруднено заспиване или нарушения на съня;
- Инсулт;
- Ускорен сърдечен ритъм;
- Хрема;
- Чувство на неразположение (гадене);
- Болки в стомаха и нарушено храносмилане;
- Кожен обрив и сърбеж;
- Неспособност за получаване на ерекция (импотентност);
- Чувство на слабост и умора (загуба на сила);
- Много голямо понижаване на кръвното налягане при пациенти, страдащи от следните състояния: коронарна болест на сърцето; стеснение на аортата (артерия в сърцето), стеснение на бъбречната артерия или сърдечните клапи; увеличена дебелина на сърдечния мускул. Ако това се случи с Вас, може да почувствате замаяност или световъртеж, особено при рязко изправяне;
- Промяна в кръвните изследвания, с които се проверява функцията на черния дроб и бъбреците;
- Сърдечен удар;
- Зрителни и/или слухови халюцинации.

Редки (засягат 1 до 10 пациенти на 10 000)
- Обърканост;
- Кожен обрив с подутини (копривна треска);
- Сухота в устата;
- Косопад;
- Псориазис (кожен обрив);
- Промяна в начина, по който се усеща миризмата;
- Увеличаване на бюста при мъжете;

- Промени в някои от клетките или други съставни части на кръвта. Вашият лекар може редовно да назначава кръвни изследвания, за да се проследи как Кордакер влияе върху кръвните клетки. Признаците може да включват чувство на умора, бледа кожа, зачервено гърло, висока температура (треска), болки в мускулите и ставите, възпаление на ставите или жлезите или чувствителност към слънчева светлина;
- Понижени нива на натрий в кръвта (симптомите могат да бъдат умора, главоболие, гадене, повръщане);
- Внезапна бъбречна недостатъчност.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти)
- Синузит (чувство на болка и натиск зад бузите и очите);
- Хриптене;
- Понижени нива на кръвната захар (хипогликемия). Признаците могат да включват засилено чувство на глад или отпадналост, усилено потене и ускорен сърдечен ритъм;
- Възпаление на белите дробове. Признаците включват кашлица, чувство на задух и висока температура (треска);
- Пожълтяване на кожата и бялото на очите (жълтеница);
- Възпаление на черния дроб. Това може да предизвика загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите и тъмен цвят на урината;
- Възпаление на панкреаса. Това предизвиква умерена до силна болка в стомаха;
- Тежки кожни нарушения. Симптомите включват зачервяване, образуване на мехури и лющене на кожата;
- Изпотяване;
- Отделяне на по-малко количество урина от обичайното или липса на отделяне на урина;
- Чернодробна недостатъчност;
- Бучки;
- Възпаление на червата.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
- Симптоми на депресия;
- Припадък.

Нежеланите реакции при деца изглеждат сходни с тези, наблюдавани при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Кордакер

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „EXP"/„Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Кордакер
- Активното вещество е лизиноприл (като лизиноприл дихидрат)
- Другите съставки са: безводен калциев хидрогенфосфат, царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте, магнезиев стеарат, повидон, манитол, жълт железен оксид и черен железен оксид.

Как изглежда Кордакер и какво съдържа опаковката
Кордакер 20 mg се предлага в блистери от PVC/AL по 30 броя (3 блистера по 10 таблетки) в картонена кутия с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
бул."Г.М.Димитров" №1, 1172 София, България
Тел.: 02/962 54 54
e-mail: info@tchaikapharma.com

Дата на последно преразглеждане на листовката
Септември 2026

Други източници на информация

Подробна и актуализирана информация за този лекарствен продукт е налична чрез сканиране със смартфон на QR кода, включен в листовката и картонената опаковка:

Същата информация е налична и на следния URL адрес: tch.bg/cord20,
на уебсайта на Чайкафарма Висококачествените Лекарства: www.tchaikapharma.com, както и на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата: www.bda.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ