

ИАЛ
ОДОБРЕННО!
ДАТА ...*26.06.06*

RGD: 56310/EN/2
26.06.2006

МИКОСИСТ (MYCOSYST)
капсули

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да използвате лекарството.

- Моля, пазете листовката. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство или се съмнявате в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал това лекарство на Вас. Никога не го давайте на някой друг. Възможно е да му причини вреда, дори да има същите симптоми като Вас.

В тази листовка:

1. Какво представлява Микосист капсули 150 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Микосист капсули 150 mg
3. Как се приема Микосист капсули 150 mg
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как трябва да се съхранява Микосист капсули 150 mg

1. Какво представлява Микосист капсули 150 mg и за какво се използва?

Активното вещество на лекарството е 150 mg fluconazole във всяка капсула.

Помощни вещества: колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, талк, повидон, царевично нишесте, безводна лактоза, титаниев диоксид, желатин, индиго кармин.

Микосист капсули са противогъбично средство, което спира размножаването на гъбичките или ги унищожава. Използва се за лечение на гъбични заболявания на вътрешните органи, кожата, ноктите и лигавиците.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Микосист капсули 150 mg

При известна свръхчувствителност към лекарственото вещество флуконазол или някоя от другите съставки на лекарството

Не трябва да приемате Микосист капсули:

- Ако сте свръхчувствителни (алергични) към активното вещество флуконазол или някоя от другите съставки на инфузията;
- Ако приемате лекарства съдържащи цизаприд, астемизол или терфенадин.



- Ако кърмите, тъй като активното вещество преминава в майчиното мляко;
- Ако имате удължен QT интервал (вид нарушение на сърдечния ритъм, което се установява на ЕКГ);
- Ако приемате други лекарства удължаващи QT-интервала, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с Микосист капсули;
- Ако имате ниски нива на калий и магнезий в кръвта;
- Ако имате много бавна сърдечна честота, сериозни нарушения на сърдечния ритъм или сърдечна недостатъчност.

Трябва да приемате Микосист капсули с повищено внимание

- Ако имате тежко чернодробно заболяване или проблеми с бъбреците, или провеждате диализа.
- Ако имате СПИН, може да получите Микосист, но трябва да знаете, че хората които имат СПИН е по-вероятно да развият много тежки кожни реакции към Микосист.
- Ако са се появили проблеми с черния Ви дроб при предишна употреба на Микосист
- Употребата на Микосист капсули не се препоръчва при деца, защото не може да бъде дозиран точно.

Бременност

По време на бременност Микосист капсули може да се прилага при изрични инструкции на Вашия лекар, защото няма достатъчни или добре контролирани проучвания при бременни жени.

Кърмене

Флуконазол навлиза в кърмата, затова жени които кърмят не трябва да приемат Микосист капсули.

Шофиране и работа с машини:

Опитът показва, че не е много вероятно Микосист капсули да повлиява способността за шофиране или работа с машини.

Употреба на други лекарства:

Други лекарства (напр. лекарства за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци, лекарства за стимулиране на стомашната функция, диуретици, орални противозачатъчни средства, лекарства за намаляване нивото на кръвната захар, някои противоалергични или противоастматични средства, някои антибиотици или противовирусни средства, или лекарства без рецепт) могат да окажат влияние върху действието на Микосист капсули или могат да взаимодействват помежду си. По тази причина трябва да приемате тези лекарства само със знанието или спазвайки инструкциите на Вашия лекар.

3. Как се приема Микосист капсули 150 mg?

Лекарят определя дозата на Микосист капсули и продължителността на лечението.

Капсулите трябва да се приемат с малко вода, без да се сдъвкат. Вие можете да приемате лекарството по всяко време на деня, но се препоръчва дозите да се вземат в един и същи час (сутрин или вечер).

Храненията нямат ефект върху абсорбцията (усвояването) на лекарството.

Продължителността на лечението и приеманата доза са различни според вида и типа на заболяването, ето защо трябва стриктно да спазвате указанията на Вашия лекар.

Важно е да спазвате другите хигиенни препоръки, дадени от Вашия лекар (напр. дезинфекция на ножицата за рязане на ноктите, на бельото, чорапите и обувките).

Ако сте приели твърде много капсули по погрешка, трябва да се обърнете незабавно към лекар, тъй като може да е необходимо извършването на стомашна промивка или приемане на друга медицинска мярка.

Какво трябва да направите, ако сте пропуснали приема на капсулата Микосист?

Вземете я в рамките на 12 часа, но никога не приемайте две дози в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси за употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Микосист капсули може да има нежелани реакции.

По време на приложението на лекарството могат да настъпят следните нежелани реакции:

Най-често гадене, повръщане, диария и повищено отделяне на газове, нарушения на вкуса.

Освен това кожен обрив, главоболие, замаяност и припадъци.

Много рядко увреждащ ефект върху кръвотворната система, бъбреците и черния дроб.

Възпаление и увреждане на черния дроб, понякога с жълтеница (жълта кожа).

При някои пациенти, особено при такива със сериозни заболявания като СПИН или рак, може да има промени в лабораторните тестове контролиращи черния дроб, бъбреците и броя на кръвните клетки.

Намален брой на бели кръвни клетки (което води до повишен рисков от инфекции) или тромбоцити (което води до лесно образуване на синини и кървене за по-дълъг период от обичайното) в кръвта.

Рядко покачване на холестерола и другите мазнини в кръвта, намаляване на нивата на калий в кръвта и косопад.

Ако забележите някоя от описаните нежелани реакции или други неочаквани симптоми и оплаквания, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.

Както при всички лекарства, при употреба на Микосист капсули също могат да се появят реакции на свърхчувствителност. Следователно, ако изпитате някой от следните симптоми като кожен обрив, копривна треска, отоци на крайниците, устните или клепачите, чувство за прилошаване, *незабавно* трябва да се консултирате с Вашия лекар.

5. Как трябва да се съхранява Микосист капсули 150 mg

Този продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Gedeon Richter Ltd.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary

Дата на последна редакция:

