


Информация за пациента. Моля, прочетете внимателно!



Еcobec® 250 µg / Екобек® 250 µg
(Beclometasone dipropionate)

Разтвор под налягане за инхалация

Състав

Лекарствено вещество:

Beclometasone dipropionate 250 µg в 1 доза.

Помощни вещества:

Етанол, хидрофлуороалкан 134а (HFA-134а).

Фармакотерапевтична група

Антиастматично средство, глюкокортикоид.

Действие

Лекарственото вещество на продукта Еcobec® 250 µg - beclometasone dipropionate – се отнася към групата на лекарствените продукти наречени кортикостероиди. Притежава противовъзпалителен ефект, който се проявява особено върху бронхите при инхалиране. Този ефект улеснява употребата на лекарството за лечение на бронхиална астма.

Ефектът на Еcobec® 250 µg се проявява 1 седмица след започване на лечението и затова не е подходящ за лечение на остра бронхиална астма.

Лекарството не повлиява функцията на надбъбречните жлези в препоръчаната дозировка.

Показания

Лечение и предотвратяване на пристъпите на тежка бронхиална астма.

Лекарството Еcobec® 250 µg 250 µg може да се използва само от възрастни.

Противопоказания

Лекарството не трябва да се използва при деца и при пациенти с установена свръхчувствителност към някоя от неговите съставки и особено към пропелентите.

Нежелани лекарствени реакции

Лекарството се понася обикновено добре като рядко могат да се наблюдават гадене, неприятен вкус в устата, виене на свят, оток, уртикария или други форми на обриви, кандидоза на устата и гърлото, главоболие или жълто оцветяване на кожата, които отзвучават при продължително лечение. В редки случаи могат да се наблюдават дрезгавост или дразнене на гърлото. С оглед да се намали появата на дрезгавост или кандидоза на устата се препоръчва след използването на инхалатора да се изплакне устата с вода.

Ако се наблюдават някакви нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции се посъветвайте с Вашия лекар.

По време на лечението с Еcobec® 250 µg може да се наблюдава остър пристъп на задух. В този случай прекратете употребата на лекарството и незабавно се посъветвайте с Вашия лекуващ лекар.

Лекарствени взаимодействия

Не са установени.



Дозировка

Дозата трябва да бъде определена винаги от лекар.

Обикновено дозата е 2 инхалации 2 пъти дневно (сутрин и вечер) или 1 инхалация 4 пъти дневно (през интервали от 4 часа).

Максималната дневна доза не трябва да надвишава 1000 µg (4 инхалации).

Употребявайте лекарството редовно в предписаната от лекаря доза.

Не спирайте приложението на лекарството освен по преценка на лекаря.

Ако забравите да вземете лекарството навреме, вземете предписаната доза когато си спомните и тогава продължете както преди.

Ако липсва подобрение или състоянието се влошава уведомете лекуващия лекар.

Приложение

Начина на употреба е даден в указанията, които са част от приложената листовка.

Обикновено лекарството се впръсква в устата едновременно с вдишването. Ако никога не сте използвали инхалатор се препоръчва да използвате т.3 и т.4 без да натискате надолу дъното на флакона така, че да се научите да координирате натискането на флакона с вдишването.

Преди първото прилагане или ако лекарството не е използвано продължително време е необходимо да сте сигурни, че натискането надолу на дъното на флакона ще предизвика освобождаване на аерозола.

Деца се нуждаят от съвета и помощта на възрастните. Препоръчва се дозата да се впръсква от друго лице, когато детето започне вдишването.

Специални предпазни мерки


Есобеc® 250 µg е предназначен за продължително лечение, а не за лечение на остри пристъпи на бронхиална астма. Необходимо е да се осигури редовно наблюдение по време на лечението с лекарството. Информирайте Вашия лекар, ако използвате кортикостероиди със системен ефект върху организма (системни кортикостероиди) и след това той ще определи по-нататъшната процедура на лечение.

След спиране прилагането на системни кортикостероиди и преминаване изцяло на лечение с Есобеc® 250 µg пациентите трябва да са особено внимателни, тъй като функцията на надбъбречната кора може все още да е нарушена и могат да се наблюдават някои реакции на свръхчувствителност (алергичен ринит, алергично възпаление на конюнктивата, екзема) или системни нарушения (умора, болки в ставите, слабост). Информирайте Вашия лекар, ако се появят такива нарушения. Необходимо е пациентите винаги да носят с тях предупредителна карта и да уведомяват лекаря, че се нуждаят от допълнително прилагане на системни кортикостероиди по време на стресови ситуации и спешни състояния като травми, влошаване на астмата поради инфекция и т.н.

Приложението при пациенти с белодробна туберкулоза, при бременност и кърмене може да става само ако е необходимо. В тези случаи Вие трябва да уведомите Вашия лекар.

След краткотрайна употреба на големи количества от лекарството не очаквайте веднага промяна в здравословното Ви състояние и не трябва също да се страхувате за появата на нежелани реакции от страна на лекарството.

Преди хирургическа намеса уведомете лекаря, че използвате Есобеc® 250 µg.



Съхранение

Да се съхранява при температура под 30°C. Да се пази от замръзване, пряка слънчева светлина и топлина. Аерозол! Флакон под налягане. Флаконът да не се пробива или изгаря дори когато е празен. Да се пазят очите.

Внимание

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен на опаковката.
Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Опаковка

Флакон под налягане с дозиращ пулверизиращ вентил и оптимайзер, съдържащ 200 дози в 1 опаковка.

Притежател на разрешението за употреба

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava, Czech Republic

Производител

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava, Czech Republic
Norton Waterford (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford, Ireland

Дата на последната редакция на текста

BG02/2005



Еcobec®
Екобек

Указания за употреба

Прочетете внимателно преди използването на инхалатора!

- 1) Отстранете защитната капачка от апликатора за уста и се уверете, че апликатора е чист, ако има прах и замърсяване ги отстранете от апликатора.
- 2) Хванете инхалатора с дъното нагоре, като поставите палеца си на дъното, а показалеца си върху горния край. Разклатете флакона добре като го движите нагоре и надолу.
- 3) Издишайте дълбоко за да изпразните белите си дробове и поставете апликатора добре между устните си. Трябва да се избягва издишването в апликатора за уста, тъй като издишваните пари може да кондензират и да го запушат.
- 4) Поемете бавно и дълбоко въздух. В началото на вдишването натиснете надолу дъното на флакона, който ще освободи 1 доза от лекарството.
- 5) След отстраняване на инхалатора от устата Ви, задръжте дишането си колкото е възможно по-дълго. Тогава издишайте бавно.
- 6) Ако трябва да инхалирате повече от 1 доза изчакайте поне 1 мин. и след това повторете схемата като започнете от т.2. Поставете капачката обратно върху инхалатора.
- 7) Отстранете аерозолната капачка от апликатора, отстранете защитната капачка и измийте пластмасовия апликатор с гореща вода. След изсушаване поставете защитната капачка.

Забележка:

Преди първото прилагане или ако лекарството не е използвано продължително време е необходимо да сте сигурни, че натискането на дъното на флакона надолу ще предизвика освобождаване на аерозол. Обикновено лекарството се впръсква в устата едновременно с вдишването. Отначало се препоръчва да се използват т.3 и т.4 без да се натиска надолу дъното на флакона.

Ако пациентът се затруднява в манипулирането с флакона с една ръка, той може да натисне дъното с двете си ръце.

При прилагането на лекарството на деца са необходими съвета и помощта на техните родители.

